

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 79 - Deux-Sèvres

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Effectifs sur la période 2009-2010

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	9285	4269	5016	4029	4657	240	359
	55-59 ans	8218	3765	4453	3319	3789	446	664
	60-64 ans	9188	4258	4930	3471	3868	787	1062
	65-69 ans	5541	2633	2908	2099	2236	534	672
	70-74 ans	6273	2876	3397	2254	2565	622	832
	50-74 ans	38505	17801	20704	15172	17115	2629	3589
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	321	153	168	145	161	8	7
	55-59 ans	339	162	177	148	157	14	20
	60-64 ans	362	196	166	166	142	30	24
	65-69 ans	250	123	127	104	112	19	15
	70-74 ans	325	139	186	117	162	22	24
	50-74 ans	1597	773	824	680	734	93	90
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	253	117	136	111	130	6	6
	55-59 ans	269	124	145	111	126	13	19
	60-64 ans	324	176	148	146	126	30	22
	65-69 ans	208	100	108	81	93	19	15
	70-74 ans	278	121	157	101	133	20	24
	50-74 ans	1332	638	694	550	608	88	86
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	68	36	32	34	31	2	1
	55-59 ans	70	38	32	37	31	1	1
	60-64 ans	38	20	18	20	16	0	2
	65-69 ans	42	23	19	23	19	0	0
	70-74 ans	47	18	29	16	29	2	0
	50-74 ans	265	135	130	130	126	5	4
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	9217	4233	4984	3995	4626	238	358
	55-59 ans	8148	3727	4421	3282	3758	445	663
	60-64 ans	9150	4238	4912	3451	3852	787	1060
	65-69 ans	5499	2610	2889	2076	2217	534	672
	70-74 ans	6226	2858	3368	2238	2536	620	832
	50-74 ans	38240	17666	20574	15042	16989	2624	3585
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	315	177	138	169	126	8	12
	55-59 ans	300	156	144	141	120	15	24
	60-64 ans	361	198	163	174	131	24	32
	65-69 ans	251	152	99	133	83	19	16
	70-74 ans	303	159	144	137	122	22	22
	50-74 ans	1530	842	688	754	582	88	106
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	306	174	132	166	120	8	12
	55-59 ans	295	155	140	140	116	15	24
	60-64 ans	351	192	159	168	128	24	31
	65-69 ans	242	145	97	126	82	19	15
	70-74 ans	292	154	138	133	117	21	21
	50-74 ans	1486	820	666	733	563	87	103
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	280	157	123	149	112	8	11
	55-59 ans	271	141	130	127	107	14	23
	60-64 ans	327	180	147	156	119	24	28
	65-69 ans	227	134	93	117	78	17	15
	70-74 ans	272	143	129	123	109	20	20
	50-74 ans	1377	755	622	672	525	83	97
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	254	142	112	135	101	7	11
	55-59 ans	235	119	116	106	94	13	22
	60-64 ans	296	164	132	142	105	22	27
	65-69 ans	199	120	79	103	67	17	12
	70-74 ans	234	123	111	109	94	14	17

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 79 - Deux-Sèvres

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	50-74 ans	1218	668	550	595	461	73	89
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)								
	50-54 ans	278	156	122	148	111	8	11
	55-59 ans	270	140	130	126	107	14	23
	60-64 ans	323	178	145	155	117	23	28
	65-69 ans	227	134	93	117	78	17	15
	70-74 ans	271	142	129	122	109	20	20
	50-74 ans	1369	750	619	668	522	82	97
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique								
	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	4	2	2	1	2	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	8	5	3	4	3	1	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	50-74 ans	5	2	3	2	2	0	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu								
	50-54 ans	279	157	122	149	111	8	11
	55-59 ans	270	141	129	127	106	14	23
	60-64 ans	324	178	146	155	118	23	28
	65-69 ans	226	134	92	117	77	17	15
	70-74 ans	270	143	127	123	107	20	20
	50-74 ans	1369	753	616	671	519	82	97
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)								
	50-54 ans	280	157	123	149	112	8	11
	55-59 ans	272	141	131	127	108	14	23
	60-64 ans	329	181	148	157	119	24	29
	65-69 ans	227	134	93	117	78	17	15
	70-74 ans	274	144	130	124	110	20	20
	50-74 ans	1382	757	625	674	527	83	98
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
	50-54 ans	133	62	71	59	64	3	7
	55-59 ans	132	56	76	48	58	8	18
	60-64 ans	130	49	81	38	63	11	18
	65-69 ans	68	25	43	22	37	3	6
	70-74 ans	124	49	75	41	61	8	14
	50-74 ans	587	241	346	208	283	33	63
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	18	11	7	11	6	0	1
	55-59 ans	13	8	5	7	5	1	0
	60-64 ans	13	8	5	5	4	3	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 79 - Deux-Sèvres

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	11	6	5	4	4	2	1
	70-74 ans	6	3	3	2	3	1	0
	50-74 ans	61	36	25	29	22	7	3
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	20	14	6	13	5	1	1
	55-59 ans	20	11	9	10	8	1	1
	60-64 ans	17	11	6	9	6	2	0
	65-69 ans	16	9	7	8	6	1	1
	70-74 ans	10	5	5	5	5	0	0
	50-74 ans	83	50	33	45	30	5	3
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	32	22	10	21	10	1	0
	55-59 ans	41	27	14	26	13	1	1
	60-64 ans	56	33	23	30	18	3	5
	65-69 ans	49	32	17	26	12	6	5
	70-74 ans	34	20	14	17	13	3	1
	50-74 ans	212	134	78	120	66	14	12
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	59	39	20	36	19	3	1
	55-59 ans	43	29	14	28	13	1	1
	60-64 ans	76	56	20	52	16	4	4
	65-69 ans	58	48	10	44	9	4	1
	70-74 ans	63	45	18	41	14	4	4
	50-74 ans	299	217	82	201	71	16	11
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	6	3	3	3	3	0	0
	55-59 ans	18	7	11	6	10	1	1
	60-64 ans	30	19	11	18	11	1	0
	65-69 ans	21	12	9	11	8	1	1
	70-74 ans	31	20	11	17	10	3	1
	50-74 ans	106	61	45	55	42	6	3
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	3	2	1	2	1	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	10	6	4	6	3	0	1
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	5	4	1	4	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	21	15	6	13	4	2	2
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	2	0	2	0	2	0	0
	70-74 ans	3	0	3	0	3	0	0
	50-74 ans	10	1	9	1	8	0	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	91	61	30	57	29	4	1
	55-59 ans	84	56	28	54	26	2	2
	60-64 ans	132	89	43	82	34	7	9
	65-69 ans	107	80	27	70	21	10	6
	70-74 ans	97	65	32	58	27	7	5
	50-74 ans	511	351	160	321	137	30	23
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	59	39	20	36	19	3	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 79 - Deux-Sèvres

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	43	29	14	28	13	1	1
	60-64 ans	76	56	20	52	16	4	4
	65-69 ans	58	48	10	44	9	4	1
	70-74 ans	63	45	18	41	14	4	4
	50-74 ans	299	217	82	201	71	16	11
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	6	3	3	3	3	0	0
	55-59 ans	18	7	11	6	10	1	1
	60-64 ans	30	19	11	18	11	1	0
	65-69 ans	21	12	9	11	8	1	1
	70-74 ans	31	20	11	17	10	3	1
	50-74 ans	106	61	45	55	42	6	3
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	6	3	3	3	3	0	0
	55-59 ans	18	7	11	6	10	1	1
	60-64 ans	29	18	11	17	11	1	0
	65-69 ans	20	11	9	10	8	1	1
	70-74 ans	30	19	11	16	10	3	1
	50-74 ans	103	58	45	52	42	6	3
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	9	4	5	3	4	1	1
	60-64 ans	17	10	7	10	7	0	0
	65-69 ans	11	6	5	5	4	1	1
	70-74 ans	16	12	4	10	3	2	1
	50-74 ans	57	34	23	30	20	4	3
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	9	3	6	3	6	0	0
	60-64 ans	12	8	4	7	4	1	0
	65-69 ans	9	5	4	5	4	0	0
	70-74 ans	14	7	7	6	7	1	0
	50-74 ans	46	24	22	22	22	2	0
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	6	3	3	3	3	0	0
	60-64 ans	8	6	2	6	2	0	0
	65-69 ans	9	5	4	5	4	0	0
	70-74 ans	9	5	4	4	4	1	0
	50-74 ans	33	19	14	18	14	1	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	0	3	0	3	0	0
	60-64 ans	4	2	2	1	2	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	5	2	3	2	3	0	0
	50-74 ans	13	5	8	4	8	1	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	2	0	0
	60-64 ans	4	4	0	4	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	2	1	0	0
	70-74 ans	5	2	3	1	3	1	0
	50-74 ans	15	9	6	8	6	1	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	4	2	2	2	2	0	0
	65-69 ans	4	2	2	2	2	0	0
	70-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
	50-74 ans	12	7	5	7	5	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 79 - Deux-Sèvres

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	1	0	0
	50-74 ans	4	1	3	1	3	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	2	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0	0
	55-59 ans	13	5	8	4	7	1	1	1
	60-64 ans	19	10	9	9	9	1	0	0
	65-69 ans	16	10	6	9	6	1	0	0
	70-74 ans	22	13	9	11	9	2	0	0
	50-74 ans	73	40	33	35	32	5	1	1
A40- Perdus de vue	50-54 ans	17	13	4	13	4	0	0	0
	55-59 ans	13	9	4	8	4	1	0	0
	60-64 ans	17	9	8	9	8	0	0	0
	65-69 ans	11	9	2	8	2	1	0	0
	70-74 ans	17	10	7	10	7	0	0	0
	50-74 ans	75	50	25	48	25	2	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 79 - Deux-Sèvres

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3,5	3,6	3,3	3,6	3,5	3,3	1,9	
	55-59 ans	4,1	4,3	4	4,5	4,1	3,1	3	
	60-64 ans	3,9	4,6	3,4	4,8	3,7	3,8	2,3	
	65-69 ans	4,5	4,7	4,4	5	5	3,6	2,2	
	70-74 ans	5,2	4,8	5,5	5,2	6,3	3,5	2,9	
	50-74 ans	4,1	4,3	4	4,5	4,3	3,5	2,5	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	0,7	0,8	0,6	0,8	0,7	0,8	0,3	
	55-59 ans	0,9	1	0,7	1,1	0,8	0,2	0,2	
	60-64 ans	0,4	0,5	0,4	0,6	0,4	0	0,2	
	65-69 ans	0,8	0,9	0,7	1,1	0,8	0	0	
	70-74 ans	0,7	0,6	0,9	0,7	1,1	0,3	0	
	50-74 ans	0,7	0,8	0,6	0,9	0,7	0,2	0,1	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	78,8	76,5	81	76,6	80,7	75	85,7	
	55-59 ans	79,4	76,5	81,9	75	80,3	92,9	95	
	60-64 ans	89,5	89,8	89,2	88	88,7	100	91,7	
	65-69 ans	83,2	81,3	85	77,9	83	100	100	
	70-74 ans	85,5	87,1	84,4	86,3	82,1	90,9	100	
	50-74 ans	83,4	82,5	84,2	80,9	82,8	94,6	95,6	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,4	4,2	2,8	4,2	2,7	3,4	3,4	
	55-59 ans	3,7	4,2	3,3	4,3	3,2	3,4	3,6	
	60-64 ans	3,9	4,7	3,3	5	3,4	3	3	
	65-69 ans	4,6	5,8	3,4	6,4	3,7	3,6	2,4	
	70-74 ans	4,9	5,6	4,3	6,1	4,8	3,5	2,6	
	50-74 ans	4	4,8	3,3	5	3,4	3,4	3	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	97,1	98,3	95,7	98,2	95,2	100	100	
	55-59 ans	98,3	99,4	97,2	99,3	96,7	100	100	
	60-64 ans	97,2	97	97,5	96,6	97,7	100	96,9	
	65-69 ans	96,4	95,4	98	94,7	98,8	100	93,8	
	70-74 ans	96,4	96,9	95,8	97,1	95,9	95,5	95,5	
	50-74 ans	97,1	97,4	96,8	97,2	96,7	98,9	97,2	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	91,5	90,2	93,2	89,8	93,3	100	91,7	
	55-59 ans	91,9	91	92,9	90,7	92,2	93,3	95,8	
	60-64 ans	93,2	93,8	92,5	92,9	93	100	90,3	
	65-69 ans	93,8	92,4	95,9	92,9	95,1	89,5	100	
	70-74 ans	93,2	92,9	93,5	92,5	93,2	95,2	95,2	
	50-74 ans	92,7	92,1	93,4	91,7	93,3	95,4	94,2	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	90,7	90,4	91,1	90,6	90,2	87,5	100	
	55-59 ans	86,7	84,4	89,2	83,5	87,9	92,9	95,7	
	60-64 ans	90,5	91,1	89,8	91	88,2	91,7	96,4	
	65-69 ans	87,7	89,6	84,9	88	85,9	100	80	
	70-74 ans	86	86	86	88,6	86,2	70	85	
	50-74 ans	88,5	88,5	88,4	88,5	87,8	88	91,8	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	1	1	
	55-59 ans	0	0	1	0	1	1	1	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	1	1	
	65-69 ans	0	0	0	0	0	1	1	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	1	0	
	50-74 ans	0	0	0	0	0	1	1	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	103	107	98	109	100	78	82	
	55-59 ans	105	111	99	105	105	158	74	
	60-64 ans	103	113	91	115	94	100	81	
	65-69 ans	96	99	91	102	94	79	78	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 79 - Deux-Sèvres

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	111	125	95	131	95	91	101
	50-74 ans	104	111	95	113	97	101	83
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	5,4	7,3	2,9	7,7	3,2	0	0
	55-59 ans	4,3	5,8	2,8	5,7	3,3	6,7	0
	60-64 ans	4,7	4,5	4,9	5,2	6,1	0	0
	65-69 ans	4,4	5,9	2	6	2,4	5,3	0
	70-74 ans	5,6	6,3	4,9	7,3	5,7	0	0
	50-74 ans	4,9	5,9	3,6	6,4	4,3	2,3	0
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,6	100	99,2	100	99,1	100	100
	55-59 ans	99,6	100	99,2	100	99,1	100	100
	60-64 ans	99,1	98,9	99,3	99,4	99,2	95,8	100
	65-69 ans	99,6	100	98,9	100	98,7	100	100
	70-74 ans	99,3	100	98,4	100	98,2	100	100
	50-74 ans	99,4	99,7	99	99,9	98,9	98,8	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	47,5	39,5	57,7	39,6	57,1	37,5	63,6
	55-59 ans	48,5	39,7	58	37,8	53,7	57,1	78,3
	60-64 ans	39,5	27,1	54,7	24,2	52,9	45,8	62,1
	65-69 ans	30	18,7	46,2	18,8	47,4	17,6	40
	70-74 ans	45,3	34	57,7	33,1	55,5	40	70
	50-74 ans	42,5	31,8	55,4	30,9	53,7	39,8	64,3
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,4	7	5,7	7,4	5,4	0	9,1
	55-59 ans	4,8	5,7	3,8	5,5	4,6	7,1	0
	60-64 ans	4	4,4	3,4	3,2	3,4	12,5	3,4
	65-69 ans	4,8	4,5	5,4	3,4	5,1	11,8	6,7
	70-74 ans	2,2	2,1	2,3	1,6	2,7	5	0
	50-74 ans	4,4	4,8	4	4,3	4,2	8,4	3,1
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	7,1	8,9	4,9	8,7	4,5	12,5	9,1
	55-59 ans	7,4	7,8	6,9	7,9	7,4	7,1	4,3
	60-64 ans	5,2	6,1	4,1	5,7	5	8,3	0
	65-69 ans	7	6,7	7,5	6,8	7,7	5,9	6,7
	70-74 ans	3,6	3,5	3,8	4	4,5	0	0
	50-74 ans	6	6,6	5,3	6,7	5,7	6	3,1
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11,4	14	8,1	14,1	8,9	12,5	0
	55-59 ans	15,1	19,1	10,7	20,5	12	7,1	4,3
	60-64 ans	17	18,2	15,5	19,1	15,1	12,5	17,2
	65-69 ans	21,6	23,9	18,3	22,2	15,4	35,3	33,3
	70-74 ans	12,4	13,9	10,8	13,7	11,8	15	5
	50-74 ans	15,3	17,7	12,5	17,8	12,5	16,9	12,2
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	21,1	24,8	16,3	24,2	17	37,5	9,1
	55-59 ans	15,8	20,6	10,7	22	12	7,1	4,3
	60-64 ans	23,1	30,9	13,5	33,1	13,4	16,7	13,8
	65-69 ans	25,6	35,8	10,8	37,6	11,5	23,5	6,7
	70-74 ans	23	31,3	13,8	33,1	12,7	20	20
	50-74 ans	21,6	28,7	13,1	29,8	13,5	19,3	11,2
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,1	1,9	2,4	2	2,7	0	0
	55-59 ans	6,6	5	8,4	4,7	9,3	7,1	4,3
	60-64 ans	9,1	10,5	7,4	11,5	9,2	4,2	0
	65-69 ans	9,3	9	9,7	9,4	10,3	5,9	6,7
	70-74 ans	11,3	13,9	8,5	13,7	9,1	15	5
	50-74 ans	7,7	8,1	7,2	8,2	8	7,2	3,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 79 - Deux-Sèvres

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,4	0,7	0	0,8	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,4	0,7	0	0,9	0	0	0
	70-74 ans	0,4	0	0,8	0	0,9	0	0
	50-74 ans	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0	0
	50-74 ans **	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3,6	3,8	3,3	4	2,7	0	9,1
	55-59 ans	1,1	1,4	0,8	0,8	0	7,1	4,3
	60-64 ans	1,5	2,2	0,7	2,5	0,8	0	0
	65-69 ans	0,4	0,7	0	0,9	0	0	0
	70-74 ans	0,7	1,4	0	0,8	0	5	0
	50-74 ans	1,5	2	1	1,9	0,8	2,4	2
	50-74 ans **	1,5	2	1	1,9	0,8	2,4	2
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,7	0	1,6	0	1,8	0	0
	55-59 ans	0,4	0	0,8	0	0,9	0	0
	60-64 ans	0,6	0,6	0,7	0,6	0	0	3,4
	65-69 ans	0,9	0	2,2	0	2,6	0	0
	70-74 ans	1,1	0	2,3	0	2,7	0	0
	50-74 ans	0,7	0,1	1,4	0,1	1,5	0	1
	50-74 ans **	0,7	0,1	1,4	0,1	1,5	0	1
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,9	14,4	6	14,3	6,3	16,8	2,8
	55-59 ans	10,3	15	6,3	16,5	6,9	4,5	3
	60-64 ans	14,4	21	8,8	23,8	8,8	8,9	8,5
	65-69 ans	19,5	30,7	9,3	33,7	9,5	18,7	8,9
	70-74 ans	15,6	22,7	9,5	25,9	10,6	11,3	6
	50-74 ans	13,4	19,9	7,8	21,3	8,1	11,4	6,4
	50-74 ans **	13,4	19,9	7,8	21,3	8,1	11,4	6,4
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,4	9,2	4	9	4,1	12,6	2,8
	55-59 ans	5,3	7,8	3,2	8,5	3,5	2,2	1,5
	60-64 ans	8,3	13,2	4,1	15,1	4,2	5,1	3,8
	65-69 ans	10,5	18,4	3,5	21,2	4,1	7,5	1,5
	70-74 ans	10,1	15,7	5,3	18,3	5,5	6,5	4,8
	50-74 ans	7,8	12,3	4	13,4	4,2	6,1	3,1
	50-74 ans **	7,8	12,3	4	13,4	4,2	6,1	3,1
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	0,7	0,6	0,8	0,6	0	0
	55-59 ans	2,2	1,9	2,5	1,8	2,7	2,2	1,5
	60-64 ans	3,3	4,5	2,2	5,2	2,9	1,3	0
	65-69 ans	3,8	4,6	3,1	5,3	3,6	1,9	1,5
	70-74 ans	5	7	3,3	7,6	3,9	4,8	1,2
	50-74 ans	2,8	3,5	2,2	3,7	2,5	2,3	0,8
	50-74 ans **	2,7	3,2	2,2	3,7	2,5	2,3	0,8
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7	0	0
	55-59 ans	50	57,1	45,5	50	40	100	100
	60-64 ans	58,6	55,6	63,6	58,8	63,6	0	0
	65-69 ans	55	54,5	55,6	50	50	100	100
	70-74 ans	53,3	63,2	36,4	62,5	30	66,7	100
	50-74 ans	55,3	58,6	51,1	57,7	47,6	66,7	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des