

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 60 - Oise

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Effectifs sur la période 2009-2010

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	13039	6010	7029	5591	6250	419	779
	55-59 ans	10964	5175	5789	4159	2903	1016	2886
	60-64 ans	11130	5119	6011	3700	2072	1419	3939
	65-69 ans	7290	3258	4032	2209	1162	1049	2870
	70-74 ans	7164	2941	4223	1011	1080	1930	3143
	50-74 ans	49587	22503	27084	16670	13467	5833	13617
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	568	247	321	231	291	16	30
	55-59 ans	529	198	331	151	199	47	132
	60-64 ans	625	264	361	190	155	74	206
	65-69 ans	426	170	256	123	96	47	160
	70-74 ans	445	160	285	72	85	88	200
	50-74 ans	2593	1039	1554	767	826	272	728
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	340	154	186	142	163	12	23
	55-59 ans	338	123	215	86	119	37	96
	60-64 ans	434	175	259	118	92	57	167
	65-69 ans	301	114	187	77	63	37	124
	70-74 ans	330	111	219	39	56	72	163
	50-74 ans	1743	677	1066	462	493	215	573
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	228	93	135	89	128	4	7
	55-59 ans	191	75	116	65	80	10	36
	60-64 ans	191	89	102	72	63	17	39
	65-69 ans	125	56	69	46	33	10	36
	70-74 ans	115	49	66	33	29	16	37
	50-74 ans	850	362	488	305	333	57	155
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	12811	5917	6894	5502	6122	415	772
	55-59 ans	10773	5100	5673	4094	2823	1006	2850
	60-64 ans	10939	5030	5909	3628	2009	1402	3900
	65-69 ans	7165	3202	3963	2163	1129	1039	2834
	70-74 ans	7049	2892	4157	978	1051	1914	3106
	50-74 ans	48737	22141	26596	16365	13134	5776	13462
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	354	201	153	187	125	14	28
	55-59 ans	362	215	147	179	69	36	78
	60-64 ans	383	205	178	153	65	52	113
	65-69 ans	266	134	132	93	38	41	94
	70-74 ans	265	127	138	43	45	84	93
	50-74 ans	1630	882	748	655	342	227	406
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	353	200	153	186	125	14	28
	55-59 ans	359	213	146	178	69	35	77
	60-64 ans	375	202	173	150	61	52	112
	65-69 ans	262	133	129	92	38	41	91
	70-74 ans	258	124	134	42	44	82	90
	50-74 ans	1607	872	735	648	337	224	398
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	301	171	130	158	102	13	28
	55-59 ans	314	182	132	151	61	31	71
	60-64 ans	341	177	164	126	58	51	106
	65-69 ans	228	115	113	80	30	35	83
	70-74 ans	225	110	115	36	35	74	80
	50-74 ans	1409	755	654	551	286	204	368
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	295	170	125	157	97	13	28
	55-59 ans	312	180	132	151	61	29	71
	60-64 ans	338	175	163	125	57	50	106
	65-69 ans	226	113	113	78	30	35	83
	70-74 ans	222	108	114	36	35	72	79

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 60 - Oise

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	50-74 ans	1393	746	647	547	280	199	367
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)								
	50-54 ans	298	171	127	158	99	13	28
	55-59 ans	312	181	131	151	61	30	70
	60-64 ans	340	177	163	126	57	51	106
	65-69 ans	227	114	113	79	30	35	83
	70-74 ans	224	109	115	36	35	73	80
	50-74 ans	1401	752	649	550	282	202	367
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique								
	50-54 ans	3	0	3	0	3	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	8	3	5	1	4	2	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	5	2	3	2	2	0	1
	65-69 ans	3	0	3	0	0	0	3
	70-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
	50-74 ans	14	6	8	3	3	3	5
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu								
	50-54 ans	301	171	130	158	102	13	28
	55-59 ans	314	182	132	151	61	31	71
	60-64 ans	341	177	164	126	58	51	106
	65-69 ans	228	115	113	80	30	35	83
	70-74 ans	225	110	115	36	35	74	80
	50-74 ans	1409	755	654	551	286	204	368
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)								
	50-54 ans	301	171	130	158	102	13	28
	55-59 ans	316	184	132	152	61	32	71
	60-64 ans	346	179	167	128	60	51	107
	65-69 ans	231	115	116	80	30	35	86
	70-74 ans	229	112	117	36	36	76	81
	50-74 ans	1423	761	662	554	289	207	373
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
	50-54 ans	159	77	82	71	62	6	20
	55-59 ans	148	67	81	56	33	11	48
	60-64 ans	167	64	103	42	40	22	63
	65-69 ans	107	50	57	29	15	21	42
	70-74 ans	103	45	58	13	15	32	43
	50-74 ans	684	303	381	211	165	92	216
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	33	22	11	19	8	3	3
	55-59 ans	38	20	18	14	10	6	8
	60-64 ans	37	23	14	17	3	6	11

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 60 - Oise

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	24	7	17	2	2	5	15
	70-74 ans	17	8	9	3	1	5	8
	50-74 ans	149	80	69	55	24	25	45
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	19	12	7	12	6	0	1
	55-59 ans	11	7	4	5	4	2	0
	60-64 ans	6	3	3	2	1	1	2
	65-69 ans	7	3	4	3	2	0	2
	70-74 ans	4	1	3	0	2	1	1
	50-74 ans	47	26	21	22	15	4	6
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	39	26	13	23	10	3	3
	55-59 ans	33	21	12	16	3	5	9
	60-64 ans	55	37	18	24	6	13	12
	65-69 ans	39	20	19	18	5	2	14
	70-74 ans	44	21	23	5	11	16	12
	50-74 ans	210	125	85	86	35	39	50
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	35	24	11	23	11	1	0
	55-59 ans	72	60	12	53	7	7	5
	60-64 ans	56	39	17	32	5	7	12
	65-69 ans	35	21	14	17	5	4	9
	70-74 ans	42	28	14	11	5	17	9
	50-74 ans	240	172	68	136	33	36	35
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	9	6	3	6	2	0	1
	55-59 ans	11	7	4	6	3	1	1
	60-64 ans	21	11	10	9	5	2	5
	65-69 ans	11	9	2	7	0	2	2
	70-74 ans	14	7	7	3	2	4	5
	50-74 ans	66	40	26	31	12	9	14
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	2	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	8	5	3	5	2	0	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	4	2	2	2	0	0	2
	65-69 ans	5	3	2	2	1	1	1
	70-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
	50-74 ans	19	10	9	8	3	2	6
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	74	50	24	46	21	4	3
	55-59 ans	105	81	24	69	10	12	14
	60-64 ans	111	76	35	56	11	20	24
	65-69 ans	74	41	33	35	10	6	23
	70-74 ans	86	49	37	16	16	33	21
	50-74 ans	450	297	153	222	68	75	85
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	35	24	11	23	11	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 60 - Oise

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	72	60	12	53	7	7	5
	60-64 ans	56	39	17	32	5	7	12
	65-69 ans	35	21	14	17	5	4	9
	70-74 ans	42	28	14	11	5	17	9
	50-74 ans	240	172	68	136	33	36	35
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	9	6	3	6	2	0	1
	55-59 ans	11	7	4	6	3	1	1
	60-64 ans	21	11	10	9	5	2	5
	65-69 ans	11	9	2	7	0	2	2
	70-74 ans	14	7	7	3	2	4	5
	50-74 ans	66	40	26	31	12	9	14
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	8	5	3	5	2	0	1
	55-59 ans	11	7	4	6	3	1	1
	60-64 ans	21	11	10	9	5	2	5
	65-69 ans	11	9	2	7	0	2	2
	70-74 ans	14	7	7	3	2	4	5
	50-74 ans	65	39	26	30	12	9	14
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	6	4	2	4	2	0	0
	55-59 ans	8	5	3	4	3	1	0
	60-64 ans	11	7	4	5	2	2	2
	65-69 ans	8	7	1	5	0	2	1
	70-74 ans	10	3	7	1	2	2	5
	50-74 ans	43	26	17	19	9	7	8
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	3	2	1	2	0	0	1
	60-64 ans	10	4	6	4	3	0	3
	65-69 ans	3	2	1	2	0	0	1
	70-74 ans	4	4	0	2	0	2	0
	50-74 ans	22	13	9	11	3	2	6
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	4	2	2	2	0	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
	50-74 ans	8	5	3	3	0	2	3
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	6	2	4	2	3	0	1
	65-69 ans	3	2	1	2	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	14	8	6	8	3	0	3
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	1	0	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 60 - Oise

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	1	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	7	4	3	4	2	0	1	1
	55-59 ans	7	5	2	4	1	1	1	1
	60-64 ans	19	9	10	7	5	2	5	5
	65-69 ans	9	7	2	5	0	2	2	2
	70-74 ans	12	6	6	3	1	3	5	5
	50-74 ans	54	31	23	23	9	8	14	14
A40- Perdus de vue	50-54 ans	31	18	13	18	13	0	0	3
	55-59 ans	28	22	6	21	3	1	3	3
	60-64 ans	15	12	3	12	1	0	2	2
	65-69 ans	12	9	3	7	2	2	1	1
	70-74 ans	13	4	9	4	4	0	5	5
	50-74 ans	99	65	34	62	23	3	11	11

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 60 - Oise

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,4	4,1	4,6	4,1	4,7	3,8	3,9	
	55-59 ans	4,8	3,8	5,7	3,6	6,9	4,6	4,6	
	60-64 ans	5,6	5,2	6	5,1	7,5	5,2	5,2	
	65-69 ans	5,8	5,2	6,3	5,6	8,3	4,5	5,6	
	70-74 ans	6,2	5,4	6,7	7,1	7,9	4,6	6,4	
	50-74 ans	5,2	4,6	5,7	4,6	6,1	4,7	5,3	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,7	1,5	1,9	1,6	2	1	0,9	
	55-59 ans	1,7	1,4	2	1,6	2,8	1	1,2	
	60-64 ans	1,7	1,7	1,7	1,9	3	1,2	1	
	65-69 ans	1,7	1,7	1,7	2,1	2,8	1	1,3	
	70-74 ans	1,6	1,7	1,6	3,3	2,7	0,8	1,2	
	50-74 ans	1,7	1,6	1,8	1,8	2,5	1	1,1	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	59,9	62,3	57,9	61,5	56	75	76,7	
	55-59 ans	63,9	62,1	65	57	59,8	78,7	72,7	
	60-64 ans	69,4	66,3	71,7	62,1	59,4	77	81,1	
	65-69 ans	70,7	67,1	73	62,6	65,6	78,7	77,5	
	70-74 ans	74,2	69,4	76,8	54,2	65,9	81,8	81,5	
	50-74 ans	67,2	65,2	68,6	60,2	59,7	79	78,7	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,8	3,4	2,2	3,4	2	3,4	3,6	
	55-59 ans	3,4	4,2	2,6	4,4	2,4	3,6	2,7	
	60-64 ans	3,5	4,1	3	4,2	3,2	3,7	2,9	
	65-69 ans	3,7	4,2	3,3	4,3	3,4	3,9	3,3	
	70-74 ans	3,8	4,4	3,3	4,4	4,3	4,4	3	
	50-74 ans	3,3	4	2,8	4	2,6	3,9	3	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,7	99,5	100	99,5	100	100	100	
	55-59 ans	99,2	99,1	99,3	99,4	100	97,2	98,7	
	60-64 ans	97,9	98,5	97,2	98	93,8	100	99,1	
	65-69 ans	98,5	99,3	97,7	98,9	100	100	96,8	
	70-74 ans	97,4	97,6	97,1	97,7	97,8	97,6	96,8	
	50-74 ans	98,6	98,9	98,3	98,9	98,5	98,7	98	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	85,3	85,5	85	84,9	81,6	92,9	100	
	55-59 ans	87,5	85,4	90,4	84,8	88,4	88,6	92,2	
	60-64 ans	90,9	87,6	94,8	84	95,1	98,1	94,6	
	65-69 ans	87	86,5	87,6	87	78,9	85,4	91,2	
	70-74 ans	87,2	88,7	85,8	85,7	79,5	90,2	88,9	
	50-74 ans	87,7	86,6	89	85	84,9	91,1	92,5	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98	99,4	96,2	99,4	95,1	100	100	
	55-59 ans	99,4	98,9	100	100	100	93,5	100	
	60-64 ans	99,1	98,9	99,4	99,2	98,3	98	100	
	65-69 ans	99,1	98,3	100	97,5	100	100	100	
	70-74 ans	98,7	98,2	99,1	100	100	97,3	98,8	
	50-74 ans	98,9	98,8	98,9	99,3	97,9	97,5	99,7	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2	2	2	2	2	2	2	
	55-59 ans	2	2	2	1	2	2	2	
	60-64 ans	2	2	2	1	2	2	2	
	65-69 ans	2	2	2	2	2	2	2	
	70-74 ans	2	2	2	2	2	2	2	
	50-74 ans	2	2	2	1	2	2	2	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	98	101	95	101	95	104	95	
	55-59 ans	92	90	96	93	118	71	78	
	60-64 ans	88	91	85	99	105	72	74	
	65-69 ans	81	81	80	81	91	79	77	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 60 - Oise

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	82	87	77	113	94	75	69
	50-74 ans	89	91	87	96	101	76	76
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	8,8	9	8,5	9,6	10,4	0	0
	55-59 ans	7,7	10,2	4,1	11,7	4,3	2,8	3,8
	60-64 ans	3,9	5,9	1,7	7,8	1,5	0	1,8
	65-69 ans	4,5	6,7	2,3	7,5	5,3	4,9	1,1
	70-74 ans	4,9	3,1	6,5	9,3	8,9	0	5,4
	50-74 ans	6,1	7,4	4,5	9,5	6,7	1,3	2,7
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100						
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	52,8	45	63,1	44,9	60,8	46,2	71,4
	55-59 ans	46,8	36,4	61,4	36,8	54,1	34,4	67,6
	60-64 ans	48,3	35,8	61,7	32,8	66,7	43,1	58,9
	65-69 ans	46,3	43,5	49,1	36,3	50	60	48,8
	70-74 ans	45	40,2	49,6	36,1	41,7	42,1	53,1
	50-74 ans	48,1	39,8	57,6	38,1	57,1	44,4	57,9
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	11	12,9	8,5	12	7,8	23,1	10,7
	55-59 ans	12	10,9	13,6	9,2	16,4	18,8	11,3
	60-64 ans	10,7	12,8	8,4	13,3	5	11,8	10,3
	65-69 ans	10,4	6,1	14,7	2,5	6,7	14,3	17,4
	70-74 ans	7,4	7,1	7,7	8,3	2,8	6,6	9,9
	50-74 ans	10,5	10,5	10,4	9,9	8,3	12,1	12,1
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	6,3	7	5,4	7,6	5,9	0	3,6
	55-59 ans	3,5	3,8	3	3,3	6,6	6,3	0
	60-64 ans	1,7	1,7	1,8	1,6	1,7	2	1,9
	65-69 ans	3	2,6	3,4	3,8	6,7	0	2,3
	70-74 ans	1,7	0,9	2,6	0	5,6	1,3	1,2
	50-74 ans	3,3	3,4	3,2	4	5,2	1,9	1,6
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13	15,2	10	14,6	9,8	23,1	10,7
	55-59 ans	10,4	11,4	9,1	10,5	4,9	15,6	12,7
	60-64 ans	15,9	20,7	10,8	18,8	10	25,5	11,2
	65-69 ans	16,9	17,4	16,4	22,5	16,7	5,7	16,3
	70-74 ans	19,2	18,8	19,7	13,9	30,6	21,1	14,8
	50-74 ans	14,8	16,4	12,8	15,5	12,1	18,8	13,4
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	11,6	14	8,5	14,6	10,8	7,7	0
	55-59 ans	22,8	32,6	9,1	34,9	11,5	21,9	7
	60-64 ans	16,2	21,8	10,2	25	8,3	13,7	11,2
	65-69 ans	15,2	18,3	12,1	21,3	16,7	11,4	10,5
	70-74 ans	18,3	25	12	30,6	13,9	22,4	11,1
	50-74 ans	16,9	22,6	10,3	24,5	11,4	17,4	9,4
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3	3,5	2,3	3,8	2	0	3,6
	55-59 ans	3,5	3,8	3	3,9	4,9	3,1	1,4
	60-64 ans	6,1	6,1	6	7	8,3	3,9	4,7
	65-69 ans	4,8	7,8	1,7	8,8	0	5,7	2,3
	70-74 ans	6,1	6,3	6	8,3	5,6	5,3	6,2
	50-74 ans	4,6	5,3	3,9	5,6	4,2	4,3	3,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 60 - Oise

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,3	1,2	1,5	1,3	2	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1,3	1,7	0,9	2,5	0	0	1,2
	70-74 ans	0,4	0,9	0	2,8	0	0	0
	50-74 ans	0,6	0,7	0,5	0,9	0,7	0	0,3
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1,2	0,8	1,3	1	0	0
	55-59 ans	0,9	1,1	0,8	1,3	1,6	0	0
	60-64 ans	1,2	1,1	1,2	1,6	0	0	1,9
	65-69 ans	2,2	2,6	1,7	2,5	3,3	2,9	1,2
	70-74 ans	1,7	0,9	2,6	0	0	1,3	3,7
	50-74 ans	1,3	1,3	1,4	1,4	1	1	1,6
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,8	8,5	3,5	8,4	3,4	9,6	3,9
	55-59 ans	9,7	15,9	4,2	16,9	3,5	11,9	4,9
	60-64 ans	10,1	15,1	5,9	15,4	5,5	14,3	6,2
	65-69 ans	10,3	12,8	8,3	16,2	8,9	5,8	8,1
	70-74 ans	12,2	16,9	8,9	16,4	15,2	17,2	6,8
	50-74 ans	9,2	13,4	5,8	13,6	5,2	13	6,3
	50-74 ans **	9,5	13,5	5,7
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,7	4,1	1,6	4,2	1,8	2,4	0
	55-59 ans	6,7	11,8	2,1	12,9	2,5	7	1,8
	60-64 ans	5,1	7,8	2,9	8,8	2,5	5	3,1
	65-69 ans	4,9	6,6	3,5	7,9	4,4	3,8	3,2
	70-74 ans	6	9,7	3,4	11,2	4,8	8,9	2,9
	50-74 ans	4,9	7,8	2,6	8,3	2,5	6,2	2,6
	50-74 ans **	5,1	7,9	2,6
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	1	0,4	1,1	0,3	0	1,3
	55-59 ans	1	1,4	0,7	1,5	1,1	1	0,4
	60-64 ans	1,9	2,2	1,7	2,5	2,5	1,4	1,3
	65-69 ans	1,5	2,8	0,5	3,2	0	1,9	0,7
	70-74 ans	2	2,4	1,7	3,1	1,9	2,1	1,6
	50-74 ans	1,4	1,8	1	1,9	0,9	1,6	1
	50-74 ans **	1,4	1,8	1
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	75	80	66,7	80	100	0	0
	55-59 ans	72,7	71,4	75	66,7	100	100	0
	60-64 ans	52,4	63,6	40	55,6	40	100	40
	65-69 ans	72,7	77,8	50	71,4	0	100	50
	70-74 ans	71,4	42,9	100	33,3	100	50	100
	50-74 ans	66,2	66,7	65,4	63,3	75	77,8	57,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des