

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 38 - Isère

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

**Effectifs sur la période 2009-2010**

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	29247	13632	15615	8681	9560	4951	6055
	55-59 ans	25620	11405	14215	2519	2692	8886	11523
	60-64 ans	25928	11529	14399	2146	1914	9383	12485
	65-69 ans	18419	8359	10060	1229	971	7130	9089
	70-74 ans	16959	7580	9379	1008	768	6572	8611
	<b>50-74 ans</b>	<b>116173</b>	<b>52505</b>	<b>63668</b>	<b>15583</b>	<b>15905</b>	<b>36922</b>	<b>47763</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	753	356	397	248	263	108	134
	55-59 ans	758	322	436	95	112	227	324
	60-64 ans	742	314	428	74	98	240	330
	65-69 ans	609	256	353	53	39	203	314
	70-74 ans	609	262	347	59	45	203	302
	<b>50-74 ans</b>	<b>3471</b>	<b>1510</b>	<b>1961</b>	<b>529</b>	<b>557</b>	<b>981</b>	<b>1404</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	599	290	309	193	190	97	119
	55-59 ans	630	274	356	66	80	208	276
	60-64 ans	595	260	335	53	65	207	270
	65-69 ans	502	208	294	31	20	177	274
	70-74 ans	494	207	287	35	29	172	258
	<b>50-74 ans</b>	<b>2820</b>	<b>1239</b>	<b>1581</b>	<b>378</b>	<b>384</b>	<b>861</b>	<b>1197</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	154	66	88	55	73	11	15
	55-59 ans	128	48	80	29	32	19	48
	60-64 ans	147	54	93	21	33	33	60
	65-69 ans	107	48	59	22	19	26	40
	70-74 ans	115	55	60	24	16	31	44
	<b>50-74 ans</b>	<b>651</b>	<b>271</b>	<b>380</b>	<b>151</b>	<b>173</b>	<b>120</b>	<b>207</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	29093	13566	15527	8626	9487	4940	6040
	55-59 ans	25492	11357	14135	2490	2660	8867	11475
	60-64 ans	25781	11475	14306	2125	1881	9350	12425
	65-69 ans	18312	8311	10001	1207	952	7104	9049
	70-74 ans	16844	7525	9319	984	752	6541	8567
	<b>50-74 ans</b>	<b>115522</b>	<b>52234</b>	<b>63288</b>	<b>15432</b>	<b>15732</b>	<b>36802</b>	<b>47556</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	609	314	295	205	169	109	126
	55-59 ans	640	331	309	78	63	253	246
	60-64 ans	697	360	337	67	52	293	285
	65-69 ans	501	259	242	52	33	207	209
	70-74 ans	503	241	262	47	30	194	232
	<b>50-74 ans</b>	<b>2950</b>	<b>1505</b>	<b>1445</b>	<b>449</b>	<b>347</b>	<b>1056</b>	<b>1098</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	592	301	291	195	168	106	123
	55-59 ans	629	326	303	77	62	249	241
	60-64 ans	673	351	322	66	50	285	272
	65-69 ans	479	252	227	51	31	201	196
	70-74 ans	481	232	249	45	27	187	222
	<b>50-74 ans</b>	<b>2854</b>	<b>1462</b>	<b>1392</b>	<b>434</b>	<b>338</b>	<b>1028</b>	<b>1054</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	533	273	260	173	144	100	116
	55-59 ans	582	300	282	65	55	235	227
	60-64 ans	619	320	299	57	46	263	253
	65-69 ans	449	237	212	46	30	191	182
	70-74 ans	418	203	215	37	16	166	199
	<b>50-74 ans</b>	<b>2601</b>	<b>1333</b>	<b>1268</b>	<b>378</b>	<b>291</b>	<b>955</b>	<b>977</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	523	268	255	169	142	99	113
	55-59 ans	569	295	274	65	53	230	221
	60-64 ans	602	314	288	57	45	257	243
	65-69 ans	434	232	202	44	27	188	175
	70-74 ans	399	192	207	32	16	160	191

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 38 - Isère

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	<b>50-74 ans</b>	<b>2527</b>	<b>1301</b>	<b>1226</b>	<b>367</b>	<b>283</b>	<b>934</b>	<b>943</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)								
	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	5	3	2	0	1	3	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)								
	50-54 ans	528	272	256	172	142	100	114
	55-59 ans	579	299	280	65	55	234	225
	60-64 ans	615	320	295	57	46	263	249
	65-69 ans	445	236	209	45	29	191	180
	70-74 ans	413	200	213	35	16	165	197
	<b>50-74 ans</b>	<b>2580</b>	<b>1327</b>	<b>1253</b>	<b>374</b>	<b>288</b>	<b>953</b>	<b>965</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique								
	50-54 ans	5	1	4	1	2	0	2
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	4	0	4	0	0	0	4
	65-69 ans	4	1	3	1	1	0	2
	70-74 ans	5	3	2	2	0	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>12</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)								
	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	4	1	3	0	1	1	2
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu								
	50-54 ans	532	272	260	172	144	100	116
	55-59 ans	580	300	280	65	54	235	226
	60-64 ans	618	320	298	57	45	263	253
	65-69 ans	448	237	211	46	29	191	182
	70-74 ans	418	203	215	37	16	166	199
	<b>50-74 ans</b>	<b>2596</b>	<b>1332</b>	<b>1264</b>	<b>377</b>	<b>288</b>	<b>955</b>	<b>976</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)								
	50-54 ans	534	273	261	173	145	100	116
	55-59 ans	584	302	282	65	55	237	227
	60-64 ans	621	320	301	57	46	263	255
	65-69 ans	453	238	215	46	31	192	184
	70-74 ans	421	204	217	37	16	167	201
	<b>50-74 ans</b>	<b>2613</b>	<b>1337</b>	<b>1276</b>	<b>378</b>	<b>293</b>	<b>959</b>	<b>983</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
	50-54 ans	335	154	181	95	99	59	82
	55-59 ans	332	144	188	28	34	116	154
	60-64 ans	328	147	181	25	22	122	159
	65-69 ans	243	107	136	21	22	86	114
	70-74 ans	205	87	118	17	9	70	109
	<b>50-74 ans</b>	<b>1443</b>	<b>639</b>	<b>804</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>453</b>	<b>618</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	53	29	24	18	12	11	12
	55-59 ans	58	37	21	5	5	32	16
	60-64 ans	50	27	23	1	6	26	17

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 38 - Isère

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	29	17	12	3	0	14	12
	70-74 ans	33	15	18	0	3	15	15
	<b>50-74 ans</b>	<b>223</b>	<b>125</b>	<b>98</b>	<b>27</b>	<b>26</b>	<b>98</b>	<b>72</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	48	30	18	20	11	10	7
	55-59 ans	67	52	15	14	4	38	11
	60-64 ans	70	36	34	8	6	28	28
	65-69 ans	60	31	29	6	6	25	23
	70-74 ans	58	27	31	5	2	22	29
	<b>50-74 ans</b>	<b>303</b>	<b>176</b>	<b>127</b>	<b>53</b>	<b>29</b>	<b>123</b>	<b>98</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	78	48	30	32	16	16	14
	55-59 ans	96	52	44	15	10	37	34
	60-64 ans	122	81	41	15	5	66	36
	65-69 ans	87	58	29	10	2	48	27
	70-74 ans	79	50	29	7	2	43	27
	<b>50-74 ans</b>	<b>462</b>	<b>289</b>	<b>173</b>	<b>79</b>	<b>35</b>	<b>210</b>	<b>138</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	14	8	6	6	5	2	1
	55-59 ans	26	15	11	3	1	12	10
	60-64 ans	45	25	20	8	6	17	14
	65-69 ans	33	25	8	6	0	19	8
	70-74 ans	41	24	17	8	0	16	17
	<b>50-74 ans</b>	<b>159</b>	<b>97</b>	<b>62</b>	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>66</b>	<b>50</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4	3	1	1	1	2	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	126	78	48	52	27	26	21
	55-59 ans	163	104	59	29	14	75	45
	60-64 ans	192	117	75	23	11	94	64
	65-69 ans	147	89	58	16	8	73	50
	70-74 ans	137	77	60	12	4	65	56
	<b>50-74 ans</b>	<b>765</b>	<b>465</b>	<b>300</b>	<b>132</b>	<b>64</b>	<b>333</b>	<b>236</b>
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	78	48	30	32	16	16	14

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 38 - Isère

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	96	52	44	15	10	37	34
	60-64 ans	122	81	41	15	5	66	36
	65-69 ans	87	58	29	10	2	48	27
	70-74 ans	79	50	29	7	2	43	27
	<b>50-74 ans</b>	<b>462</b>	<b>289</b>	<b>173</b>	<b>79</b>	<b>35</b>	<b>210</b>	<b>138</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	14	8	6	6	5	2	1
	55-59 ans	26	15	11	3	1	12	10
	60-64 ans	45	25	20	8	6	17	14
	65-69 ans	33	25	8	6	0	19	8
	70-74 ans	41	24	17	8	0	16	17
	<b>50-74 ans</b>	<b>159</b>	<b>97</b>	<b>62</b>	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>66</b>	<b>50</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	14	8	6	6	5	2	1
	55-59 ans	22	12	10	2	1	10	9
	60-64 ans	39	20	19	7	6	13	13
	65-69 ans	33	25	8	6	0	19	8
	70-74 ans	37	20	17	6	0	14	17
	<b>50-74 ans</b>	<b>145</b>	<b>85</b>	<b>60</b>	<b>27</b>	<b>12</b>	<b>58</b>	<b>48</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	14	8	6	6	5	2	1
	55-59 ans	19	11	8	2	1	9	7
	60-64 ans	38	19	19	6	6	13	13
	65-69 ans	32	24	8	6	0	18	8
	70-74 ans	35	20	15	6	0	14	15
	<b>50-74 ans</b>	<b>138</b>	<b>82</b>	<b>56</b>	<b>26</b>	<b>12</b>	<b>56</b>	<b>44</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	8	5	3	3	2	2	1
	55-59 ans	16	10	6	2	1	8	5
	60-64 ans	23	10	13	3	5	7	8
	65-69 ans	23	17	6	3	0	14	6
	70-74 ans	25	16	9	4	0	12	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>95</b>	<b>58</b>	<b>37</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>43</b>	<b>29</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	6	3	3	3	3	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	15	9	6	3	1	6	5
	65-69 ans	9	7	2	3	0	4	2
	70-74 ans	10	4	6	2	0	2	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>43</b>	<b>24</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>15</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	9	6	3	1	0	5	3
	60-64 ans	14	7	7	2	3	5	4
	65-69 ans	12	9	3	2	0	7	3
	70-74 ans	7	5	2	0	0	5	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>44</b>	<b>28</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>23</b>	<b>12</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	4	2	2	0	1	2	1
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	9	6	3	1	0	5	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>8</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 38 - Isère

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	5	3	2	1	0	2	2
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	6	3	3	2	0	1	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	2	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	13	7	6	5	5	2	1
	55-59 ans	22	12	10	2	1	10	9
	60-64 ans	38	20	18	7	5	13	13
	65-69 ans	31	23	8	6	0	17	8
	70-74 ans	33	18	15	5	0	13	15
	<b>50-74 ans</b>	<b>137</b>	<b>80</b>	<b>57</b>	<b>25</b>	<b>11</b>	<b>55</b>	<b>46</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	34	15	19	10	14	5	5
	55-59 ans	20	12	8	6	4	6	4
	60-64 ans	22	11	11	3	2	8	9
	65-69 ans	8	4	4	1	1	3	3
	70-74 ans	19	9	10	3	2	6	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>103</b>	<b>51</b>	<b>52</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>28</b>	<b>29</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 38 - Isère

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	2,6	2,6	2,5	2,9	2,8	2,2	2,2	
	55-59 ans	3	2,8	3,1	3,8	4,2	2,6	2,8	
	60-64 ans	2,9	2,7	3	3,4	5,1	2,6	2,6	
	65-69 ans	3,3	3,1	3,5	4,3	4	2,8	3,5	
	70-74 ans	3,6	3,5	3,7	5,9	5,9	3,1	3,5	
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2,9</b>	<b>3,1</b>	<b>3,4</b>	<b>3,5</b>	<b>2,7</b>	<b>2,9</b>	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	0,5	0,5	0,6	0,6	0,8	0,2	0,2	
	55-59 ans	0,5	0,4	0,6	1,2	1,2	0,2	0,4	
	60-64 ans	0,6	0,5	0,6	1	1,7	0,4	0,5	
	65-69 ans	0,6	0,6	0,6	1,8	2	0,4	0,4	
	70-74 ans	0,7	0,7	0,6	2,4	2,1	0,5	0,5	
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>	<b>1</b>	<b>1,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	79,5	81,5	77,8	77,8	72,2	89,8	88,8	
	55-59 ans	83,1	85,1	81,7	69,5	71,4	91,6	85,2	
	60-64 ans	80,2	82,8	78,3	71,6	66,3	86,3	81,8	
	65-69 ans	82,4	81,3	83,3	58,5	51,3	87,2	87,3	
	70-74 ans	81,1	79	82,7	59,3	64,4	84,7	85,4	
	<b>50-74 ans</b>	<b>81,2</b>	<b>82,1</b>	<b>80,6</b>	<b>71,5</b>	<b>68,9</b>	<b>87,8</b>	<b>85,3</b>	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,1	2,3	1,9	2,4	1,8	2,2	2,1	
	55-59 ans	2,5	2,9	2,2	3,1	2,4	2,9	2,1	
	60-64 ans	2,7	3,1	2,4	3,2	2,8	3,1	2,3	
	65-69 ans	2,7	3,1	2,4	4,3	3,5	2,9	2,3	
	70-74 ans	3	3,2	2,8	4,8	4	3	2,7	
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,6</b>	<b>2,9</b>	<b>2,3</b>	<b>2,9</b>	<b>2,2</b>	<b>2,9</b>	<b>2,3</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	97,2	95,9	98,6	95,1	99,4	97,2	97,6	
	55-59 ans	98,3	98,5	98,1	98,7	98,4	98,4	98	
	60-64 ans	96,6	97,5	95,5	98,5	96,2	97,3	95,4	
	65-69 ans	95,6	97,3	93,8	98,1	93,9	97,1	93,8	
	70-74 ans	95,6	96,3	95	95,7	90	96,4	95,7	
	<b>50-74 ans</b>	<b>96,7</b>	<b>97,1</b>	<b>96,3</b>	<b>96,7</b>	<b>97,4</b>	<b>97,3</b>	<b>96</b>	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	90	90,7	89,3	88,7	85,7	94,3	94,3	
	55-59 ans	92,5	92	93,1	84,4	88,7	94,4	94,2	
	60-64 ans	92	91,2	92,9	86,4	92	92,3	93	
	65-69 ans	93,7	94	93,4	90,2	96,8	95	92,9	
	70-74 ans	86,9	87,5	86,3	82,2	59,3	88,8	89,6	
	<b>50-74 ans</b>	<b>91,1</b>	<b>91,2</b>	<b>91,1</b>	<b>87,1</b>	<b>86,1</b>	<b>92,9</b>	<b>92,7</b>	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,1	98,2	98,1	97,7	98,6	99	97,4	
	55-59 ans	97,8	98,3	97,2	100	96,4	97,9	97,4	
	60-64 ans	97,3	98,1	96,3	100	97,8	97,7	96	
	65-69 ans	96,7	97,9	95,3	95,7	90	98,4	96,2	
	70-74 ans	95,5	94,6	96,3	86,5	100	96,4	96	
	<b>50-74 ans</b>	<b>97,2</b>	<b>97,6</b>	<b>96,7</b>	<b>97,1</b>	<b>97,3</b>	<b>97,8</b>	<b>96,5</b>	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2	2	2	2	2	2	2	
	55-59 ans	2	2	2	2	2	2	2	
	60-64 ans	2	2	2	2	2	1	2	
	65-69 ans	2	2	2	2	2	2	2	
	70-74 ans	2	2	2	2	2	2	2	
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	98	95	100	100	98	87	103	
	55-59 ans	88	88	88	89	95	88	86	
	60-64 ans	82	83	80	104	76	79	81	
	65-69 ans	87	94	80	108	88	90	79	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 38 - Isère

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	86	91	81	112	104	86	79
	<b>50-74 ans</b>	<b>88</b>	<b>90</b>	<b>86</b>	<b>101</b>	<b>93</b>	<b>86</b>	<b>84</b>
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	5,6	4,8	6,4	4,9	8,3	4,6	4
	55-59 ans	3,1	3,6	2,6	7,7	6,3	2,4	1,6
	60-64 ans	3,2	3,1	3,3	4,5	3,8	2,7	3,2
	65-69 ans	1,6	1,5	1,7	1,9	3	1,4	1,4
	70-74 ans	3,8	3,7	3,8	6,4	6,7	3,1	3,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,5</b>	<b>3,4</b>	<b>3,6</b>	<b>5,1</b>	<b>6,6</b>	<b>2,7</b>	<b>2,6</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,8	99,8	100	99,4	100	100	100
	55-59 ans	99,7	100	99,3	100	98,2	100	99,6
	60-64 ans	99,8	100	99,7	100	97,8	100	100
	65-69 ans	99,8	100	99,5	100	96,7	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,8</b>	<b>99,9</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>99,9</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	62,7	56,4	69,3	54,9	68,3	59	70,7
	55-59 ans	56,8	47,7	66,7	43,1	61,8	48,9	67,8
	60-64 ans	52,8	45,9	60,1	43,9	47,8	46,4	62,4
	65-69 ans	53,6	45	63,3	45,7	71	44,8	62
	70-74 ans	48,7	42,6	54,4	45,9	56,3	41,9	54,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>55,2</b>	<b>47,8</b>	<b>63</b>	<b>49,2</b>	<b>63,5</b>	<b>47,2</b>	<b>62,9</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	9,9	10,6	9,2	10,4	8,3	11	10,3
	55-59 ans	9,9	12,3	7,4	7,7	9,1	13,5	7
	60-64 ans	8,1	8,4	7,6	1,8	13	9,9	6,7
	65-69 ans	6,4	7,1	5,6	6,5	0	7,3	6,5
	70-74 ans	7,8	7,4	8,3	0	18,8	9	7,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,5</b>	<b>9,3</b>	<b>7,7</b>	<b>7,1</b>	<b>8,9</b>	<b>10,2</b>	<b>7,3</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,2	0,3	0	0	0	0,4	0
	60-64 ans	0,2	0	0,3	0	0	0	0,4
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,2	0	0,5	0	0	0	0,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	9	11	6,9	11,6	7,6	10	6
	55-59 ans	11,5	17,2	5,3	21,5	7,3	16	4,8
	60-64 ans	11,3	11,3	11,3	14	13	10,6	11
	65-69 ans	13,2	13	13,5	13	19,4	13	12,5
	70-74 ans	13,8	13,2	14,3	13,5	12,5	13,2	14,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>11,6</b>	<b>13,2</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>9,9</b>	<b>12,8</b>	<b>10</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	14,6	17,6	11,5	18,5	11	16	12,1
	55-59 ans	16,4	17,2	15,6	23,1	18,2	15,6	15
	60-64 ans	19,6	25,3	13,6	26,3	10,9	25,1	14,1
	65-69 ans	19,2	24,4	13,5	21,7	6,5	25	14,7
	70-74 ans	18,8	24,5	13,4	18,9	12,5	25,7	13,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>17,7</b>	<b>21,6</b>	<b>13,6</b>	<b>20,9</b>	<b>11,9</b>	<b>21,9</b>	<b>14</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,6	2,9	2,3	3,5	3,4	2	0,9
	55-59 ans	4,5	5	3,9	4,6	1,8	5,1	4,4
	60-64 ans	7,2	7,8	6,6	14	13	6,5	5,5
	65-69 ans	7,3	10,5	3,7	13	0	9,9	4,3
	70-74 ans	9,7	11,8	7,8	21,6	0	9,6	8,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,1</b>	<b>7,3</b>	<b>4,9</b>	<b>8,2</b>	<b>4,1</b>	<b>6,9</b>	<b>5,1</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 38 - Isère

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,2	0	0,4	0	0,7	0	0
	55-59 ans	0,2	0	0,4	0	0	0	0,4
	60-64 ans	0,3	0,6	0	0	0	0,8	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,7	0,5	0,9	0	0	0,6	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,7	1,1	0,4	0,6	0,7	2	0
	55-59 ans	0,2	0,3	0	0	0	0,4	0
	60-64 ans	0,2	0,3	0	0	0	0,4	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,2	0	0,5	0	0	0	0,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,2	0,4	0	0,6	0	0	0
	55-59 ans	0,3	0	0,7	0	1,8	0	0,4
	60-64 ans	0,3	0,3	0,3	0	2,2	0,4	0
	65-69 ans	0,2	0	0,5	0	3,2	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,3	5,7	3,1	6	2,8	5,3	3,5
	55-59 ans	6,4	9,2	4,2	11,6	5,3	8,5	3,9
	60-64 ans	7,4	10,2	5,2	10,8	5,8	10,1	5,2
	65-69 ans	8	10,7	5,8	13,3	8,4	10,3	5,5
	70-74 ans	8,1	10,2	6,4	12,2	5,3	9,9	6,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,6</b>	<b>8,9</b>	<b>4,7</b>	<b>8,6</b>	<b>4,1</b>	<b>9</b>	<b>5</b>
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	<b>50-74 ans **</b>	<b>6,7</b>	<b>8,9</b>	<b>4,7</b>	.	.	.	.
	50-54 ans	2,7	3,5	1,9	3,7	1,7	3,2	2,3
	55-59 ans	3,8	4,6	3,1	6	3,8	4,2	3
	60-64 ans	4,7	7,1	2,9	7,1	2,7	7,1	2,9
	65-69 ans	4,8	7	2,9	8,3	2,1	6,8	3
	70-74 ans	4,7	6,6	3,1	7,1	2,7	6,6	3,2
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>5,5</b>	<b>2,7</b>	<b>5,1</b>	<b>2,2</b>	<b>5,7</b>	<b>2,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>4,1</b>	<b>5,5</b>	<b>2,7</b>	.	.	.	.
	50-54 ans	0,5	0,6	0,4	0,7	0,5	0,4	0,2
	55-59 ans	1	1,3	0,8	1,2	0,4	1,4	0,9
	60-64 ans	1,7	2,2	1,4	3,8	3,2	1,8	1,1
	65-69 ans	1,8	3	0,8	5	0	2,7	0,9
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	70-74 ans	2,4	3,2	1,8	8,1	0	2,4	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,4</b>	<b>1,9</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,4</b>	<b>1,8</b>	<b>1</b>	.	.	.	.
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	13,6	8,3	20	0	0	10	22,2
	60-64 ans	2,6	5	0	14,3	0	0	0
65-69 ans	3	4	0	0	0	5,3	0	
70-74 ans	5,4	0	11,8	0	0	0	11,8	
<b>50-74 ans</b>	<b>4,8</b>	<b>3,5</b>	<b>6,7</b>	<b>3,7</b>	<b>0</b>	<b>3,4</b>	<b>8,3</b>	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des