

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Effectifs sur la période 2009-2010

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	15929	7327	8602	4304	4655	3023	3947
	55-59 ans	15999	6973	9026	1213	1383	5760	7643
	60-64 ans	16033	7267	8766	1114	1290	6153	7476
	65-69 ans	10789	4699	6090	600	711	4099	5379
	70-74 ans	9999	3967	6032	519	628	3448	5404
	50-74 ans	68749	30233	38516	7750	8667	22483	29849
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	899	418	481	260	276	158	205
	55-59 ans	918	409	509	97	98	312	411
	60-64 ans	903	431	472	95	85	336	387
	65-69 ans	714	315	399	62	62	253	337
	70-74 ans	726	290	436	45	50	245	386
	50-74 ans	4160	1863	2297	559	571	1304	1726
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	597	288	309	180	168	108	141
	55-59 ans	672	307	365	65	56	242	309
	60-64 ans	655	305	350	50	49	255	301
	65-69 ans	543	240	303	35	41	205	262
	70-74 ans	538	210	328	26	26	184	302
	50-74 ans	3005	1350	1655	356	340	994	1315
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	302	130	172	80	108	50	64
	55-59 ans	246	102	144	32	42	70	102
	60-64 ans	248	126	122	45	36	81	86
	65-69 ans	171	75	96	27	21	48	75
	70-74 ans	188	80	108	19	24	61	84
	50-74 ans	1155	513	642	203	231	310	411
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	15627	7197	8430	4224	4547	2973	3883
	55-59 ans	15753	6871	8882	1181	1341	5690	7541
	60-64 ans	15785	7141	8644	1069	1254	6072	7390
	65-69 ans	10618	4624	5994	573	690	4051	5304
	70-74 ans	9811	3887	5924	500	604	3387	5320
	50-74 ans	67594	29720	37874	7547	8436	22173	29438
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	347	168	179	101	99	67	80
	55-59 ans	403	210	193	57	34	153	159
	60-64 ans	424	228	196	34	44	194	152
	65-69 ans	301	155	146	21	26	134	120
	70-74 ans	320	146	174	22	17	124	157
	50-74 ans	1795	907	888	235	220	672	668
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	347	168	179	101	99	67	80
	55-59 ans	402	209	193	57	34	152	159
	60-64 ans	424	228	196	34	44	194	152
	65-69 ans	300	154	146	21	26	133	120
	70-74 ans	316	145	171	22	17	123	154
	50-74 ans	1789	904	885	235	220	669	665
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	310	148	162	86	86	62	76
	55-59 ans	350	183	167	45	26	138	141
	60-64 ans	379	200	179	30	40	170	139
	65-69 ans	271	139	132	18	23	121	109
	70-74 ans	271	124	147	18	15	106	132
	50-74 ans	1581	794	787	197	190	597	597
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	300	143	157	84	82	59	75
	55-59 ans	348	181	167	45	26	136	141
	60-64 ans	374	197	177	30	39	167	138
	65-69 ans	265	134	131	18	23	116	108
	70-74 ans	259	118	141	17	14	101	127

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	50-74 ans	1546	773	773	194	184	579	589
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)								
	50-54 ans	310	148	162	86	86	62	76
	55-59 ans	350	183	167	45	26	138	141
	60-64 ans	378	200	178	30	40	170	138
	65-69 ans	271	139	132	18	23	121	109
	70-74 ans	270	123	147	17	15	106	132
	50-74 ans	1579	793	786	196	190	597	596
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	5	1	4	0	0	1	4
	50-74 ans	7	3	4	0	0	3	4
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu								
	50-54 ans	310	148	162	86	86	62	76
	55-59 ans	350	183	167	45	26	138	141
	60-64 ans	379	200	179	30	40	170	139
	65-69 ans	271	139	132	18	23	121	109
	70-74 ans	270	123	147	18	15	105	132
	50-74 ans	1580	793	787	197	190	596	597
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)								
	50-54 ans	310	148	162	86	86	62	76
	55-59 ans	351	184	167	45	26	139	141
	60-64 ans	379	200	179	30	40	170	139
	65-69 ans	272	140	132	18	23	122	109
	70-74 ans	276	125	151	18	15	107	136
	50-74 ans	1588	797	791	197	190	600	601
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
	50-54 ans	151	58	93	36	49	22	44
	55-59 ans	169	75	94	20	16	55	78
	60-64 ans	162	69	93	12	20	57	73
	65-69 ans	105	40	65	4	14	36	51
	70-74 ans	102	35	67	6	6	29	61
	50-74 ans	689	277	412	78	105	199	307
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	44	21	23	13	12	8	11
	55-59 ans	62	33	29	11	4	22	25
	60-64 ans	55	31	24	3	4	28	20

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	32	15	17	2	3	13	14
	70-74 ans	28	13	15	2	1	11	11
	50-74 ans	221	113	108	31	24	82	84
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	4	3	1	2	0	1	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	9	5	4	2	0	3	4
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	48	31	17	14	11	17	6
	55-59 ans	55	26	29	3	5	23	24
	60-64 ans	65	46	19	5	5	41	14
	65-69 ans	47	29	18	5	1	24	17
	70-74 ans	51	26	25	1	4	25	21
	50-74 ans	266	158	108	28	26	130	82
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	46	27	19	17	10	10	9
	55-59 ans	50	38	12	9	1	29	11
	60-64 ans	67	36	31	6	9	30	22
	65-69 ans	64	41	23	6	2	35	21
	70-74 ans	68	35	33	8	4	27	29
	50-74 ans	295	177	118	46	26	131	92
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	13	5	8	2	4	3	4
	55-59 ans	12	10	2	2	0	8	2
	60-64 ans	19	12	7	4	1	8	6
	65-69 ans	21	13	8	1	3	12	5
	70-74 ans	19	12	7	1	0	11	7
	50-74 ans	84	52	32	10	8	42	24
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4	3	1	2	0	1	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	9	5	4	0	1	5	3
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	20	12	8	2	1	10	7
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	94	58	36	31	21	27	15
	55-59 ans	105	64	41	12	6	52	35
	60-64 ans	132	82	50	11	14	71	36
	65-69 ans	111	70	41	11	3	59	38
	70-74 ans	119	61	58	9	8	52	50
	50-74 ans	561	335	226	74	52	261	174
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	46	27	19	17	10	10	9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	50	38	12	9	1	29	11
	60-64 ans	67	36	31	6	9	30	22
	65-69 ans	64	41	23	6	2	35	21
	70-74 ans	68	35	33	8	4	27	29
	50-74 ans	295	177	118	46	26	131	92
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	13	5	8	2	4	3	4
	55-59 ans	12	10	2	2	0	8	2
	60-64 ans	19	12	7	4	1	8	6
	65-69 ans	21	13	8	1	3	12	5
	70-74 ans	19	12	7	1	0	11	7
	50-74 ans	84	52	32	10	8	42	24
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	13	5	8	2	4	3	4
	55-59 ans	12	10	2	2	0	8	2
	60-64 ans	19	12	7	4	1	8	6
	65-69 ans	19	11	8	1	3	10	5
	70-74 ans	16	10	6	1	0	9	6
	50-74 ans	79	48	31	10	8	38	23
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	6	2	4	0	0	2	4
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	12	5	7	2	4	3	3
	55-59 ans	11	9	2	1	0	8	2
	60-64 ans	19	12	7	4	1	8	6
	65-69 ans	16	9	7	1	3	8	4
	70-74 ans	14	10	4	1	0	9	4
	50-74 ans	72	45	27	9	8	36	19
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	7	3	4	1	3	2	1
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2
	60-64 ans	15	9	6	3	1	6	5
	65-69 ans	11	7	4	1	2	6	2
	70-74 ans	11	8	3	0	0	8	3
	50-74 ans	48	29	19	5	6	24	13
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	5	2	3	1	1	1	2
	55-59 ans	7	7	0	1	0	6	0
	60-64 ans	4	3	1	1	0	2	1
	65-69 ans	5	2	3	0	1	2	2
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	24	16	8	4	2	12	6
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	9	5	4	3	1	2	3
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	16	8	8	3	3	5	5
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	4	2	2	0	1	2	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	10	6	4	0	1	6	3
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	3	1	2	0	2	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1	1
	65-69 ans	5	4	1	1	0	3	1	1
	70-74 ans	6	4	2	0	0	4	2	2
	50-74 ans	17	11	6	1	2	10	4	4
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0	0
	50-74 ans	5	4	1	1	0	3	1	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	13	5	8	2	4	3	4	4
	55-59 ans	12	10	2	2	0	8	2	2
	60-64 ans	19	12	7	4	1	8	6	6
	65-69 ans	17	9	8	1	3	8	5	5
	70-74 ans	16	10	6	1	0	9	6	6
	50-74 ans	77	46	31	10	8	36	23	23
A40- Perdus de vue	50-54 ans	25	13	12	10	9	3	3	3
	55-59 ans	35	21	14	10	5	11	9	9
	60-64 ans	31	19	12	3	3	16	9	9
	65-69 ans	20	11	9	2	3	9	6	6
	70-74 ans	24	9	15	3	2	6	13	13
	50-74 ans	135	73	62	28	22	45	40	40

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,6	5,7	5,6	6	5,9	5,2	5,2	
	55-59 ans	5,7	5,9	5,6	8	7,1	5,4	5,4	
	60-64 ans	5,6	5,9	5,4	8,5	6,6	5,5	5,2	
	65-69 ans	6,6	6,7	6,6	10,3	8,7	6,2	6,3	
	70-74 ans	7,3	7,3	7,2	8,7	8	7,1	7,1	
	50-74 ans	6,1	6,2	6	7,2	6,6	5,8	5,8	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,9	1,8	2	1,9	2,3	1,7	1,6	
	55-59 ans	1,5	1,5	1,6	2,6	3	1,2	1,3	
	60-64 ans	1,5	1,7	1,4	4	2,8	1,3	1,2	
	65-69 ans	1,6	1,6	1,6	4,5	3	1,2	1,4	
	70-74 ans	1,9	2	1,8	3,7	3,8	1,8	1,6	
	50-74 ans	1,7	1,7	1,7	2,6	2,7	1,4	1,4	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	66,4	68,9	64,2	69,2	60,9	68,4	68,8	
	55-59 ans	73,2	75,1	71,7	67	57,1	77,6	75,2	
	60-64 ans	72,5	70,8	74,2	52,6	57,6	75,9	77,8	
	65-69 ans	76,1	76,2	75,9	56,5	66,1	81	77,7	
	70-74 ans	74,1	72,4	75,2	57,8	52	75,1	78,2	
	50-74 ans	72,2	72,5	72,1	63,7	59,5	76,2	76,2	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,2	2,3	2,1	2,4	2,2	2,3	2,1	
	55-59 ans	2,6	3,1	2,2	4,8	2,5	2,7	2,1	
	60-64 ans	2,7	3,2	2,3	3,2	3,5	3,2	2,1	
	65-69 ans	2,8	3,4	2,4	3,7	3,8	3,3	2,3	
	70-74 ans	3,3	3,8	2,9	4,4	2,8	3,7	3	
	50-74 ans	2,7	3,1	2,3	3,1	2,6	3	2,3	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	55-59 ans	99,8	99,5	100	100	100	99,3	100	
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	65-69 ans	99,7	99,4	100	100	100	99,3	100	
	70-74 ans	98,8	99,3	98,3	100	100	99,2	98,1	
	50-74 ans	99,7	99,7	99,7	100	100	99,6	99,6	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	89,3	88,1	90,5	85,1	86,9	92,5	95	
	55-59 ans	87,1	87,6	86,5	78,9	76,5	90,8	88,7	
	60-64 ans	89,4	87,7	91,3	88,2	90,9	87,6	91,4	
	65-69 ans	90,3	90,3	90,4	85,7	88,5	91	90,8	
	70-74 ans	85,8	85,5	86	81,8	88,2	86,2	85,7	
	50-74 ans	88,4	87,8	88,9	83,8	86,4	89,2	89,8	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,8	96,6	96,9	97,7	95,3	95,2	98,7	
	55-59 ans	99,4	98,9	100	100	100	98,6	100	
	60-64 ans	98,7	98,5	98,9	100	97,5	98,2	99,3	
	65-69 ans	97,8	96,4	99,2	100	100	95,9	99,1	
	70-74 ans	95,6	95,2	95,9	94,4	93,3	95,3	96,2	
	50-74 ans	97,8	97,4	98,2	98,5	96,8	97	98,7	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2	2	2	2	2	2	2	
	55-59 ans	2	2	2	2	2	2	2	
	60-64 ans	2	2	2	1	2	2	2	
	65-69 ans	2	2	2	2	1	2	2	
	70-74 ans	2	2	2	2	1	2	2	
	50-74 ans	2	2	2	2	2	2	2	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	90	84	96	76	79	95	115	
	55-59 ans	81	88	73	119	80	78	72	
	60-64 ans	73	78	68	85	71	77	66	
	65-69 ans	85	86	84	130	90	80	83	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	78	71	83	58	128	73	78
	50-74 ans	81	82	80	90	83	79	80
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	7,2	7,7	6,7	9,9	9,1	4,5	3,8
	55-59 ans	8,7	10	7,3	17,5	14,7	7,2	5,7
	60-64 ans	7,3	8,3	6,1	8,8	6,8	8,2	5,9
	65-69 ans	6,6	7,1	6,2	9,5	11,5	6,7	5
	70-74 ans	7,5	6,2	8,6	13,6	11,8	4,8	8,3
	50-74 ans	7,5	8	7	11,9	10	6,7	6
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	99,6	99,2	100	100	100	99,1	100
	50-74 ans	99,9	99,9	100	100	100	99,8	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	48,7	39,2	57,4	41,9	57	35,5	57,9
	55-59 ans	48,1	40,8	56,3	44,4	61,5	39,6	55,3
	60-64 ans	42,7	34,5	52	40	50	33,5	52,5
	65-69 ans	38,6	28,6	49,2	22,2	60,9	29,5	46,8
	70-74 ans	37	28	44,4	33,3	40	27,1	44,9
	50-74 ans	43,4	34,8	52,1	39,6	55,3	33,2	51,1
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	14,2	14,2	14,2	15,1	14	12,9	14,5
	55-59 ans	17,7	17,9	17,4	24,4	15,4	15,8	17,7
	60-64 ans	14,5	15,5	13,4	10	10	16,5	14,4
	65-69 ans	11,8	10,7	12,9	11,1	13	10,7	12,8
	70-74 ans	10,1	10,4	9,9	11,1	6,7	10,3	10,3
	50-74 ans	13,9	14,2	13,7	15,7	12,6	13,7	14
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,3	2	0,6	2,3	0	1,6	1,3
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,3	0,5	0	0	0	0,6	0
	65-69 ans	0,4	0	0,8	0	0	0	0,9
	70-74 ans	1,1	0,8	1,3	0	0	0,9	1,5
	50-74 ans	0,6	0,6	0,5	1	0	0,5	0,7
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15,5	20,9	10,5	16,3	12,8	27,4	7,9
	55-59 ans	15,7	14,1	17,4	6,7	19,2	16,5	17
	60-64 ans	17,2	23	10,6	16,7	12,5	24,1	10,1
	65-69 ans	17,3	20,7	13,6	27,8	4,3	19,7	15,6
	70-74 ans	18,5	20,8	16,6	5,6	26,7	23,4	15,4
	50-74 ans	16,8	19,8	13,7	14,2	13,7	21,7	13,6
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	14,8	18,2	11,7	19,8	11,6	16,1	11,8
	55-59 ans	14,2	20,7	7,2	20	3,8	20,9	7,8
	60-64 ans	17,7	18	17,3	20	22,5	17,6	15,8
	65-69 ans	23,5	29,3	17,4	33,3	8,7	28,7	19,3
	70-74 ans	24,6	28	21,9	44,4	26,7	25,2	21,3
	50-74 ans	18,6	22,2	14,9	23,4	13,7	21,8	15,3
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,2	3,4	4,9	2,3	4,7	4,8	5,3
	55-59 ans	3,4	5,4	1,2	4,4	0	5,8	1,4
	60-64 ans	5	6	3,9	13,3	2,5	4,7	4,3
	65-69 ans	7,7	9,3	6,1	5,6	13	9,8	4,6
	70-74 ans	6,9	9,6	4,6	5,6	0	10,3	5,1
	50-74 ans	5,3	6,5	4	5,1	4,2	7	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,6	1,1	0	0	0	1,4	0
	60-64 ans	0,3	0	0,6	0	0	0	0,7
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,4	0,8	0	0	0	0,9	0
	50-74 ans	0,3	0,4	0,1	0	0	0,5	0,2
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,3	2	0,6	2,3	0	1,6	1,3
	55-59 ans	0,3	0	0,6	0	0	0	0,7
	60-64 ans	2,4	2,5	2,2	0	2,5	2,9	2,2
	65-69 ans	0,7	1,4	0	0	0	1,6	0
	70-74 ans	1,4	1,6	1,3	0	0	1,9	1,5
	50-74 ans	1,3	1,5	1	1	0,5	1,7	1,2
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6	8,1	4,3	7,3	4,6	9,1	3,9
	55-59 ans	6,7	9,3	4,6	10,2	4,5	9,1	4,6
	60-64 ans	8,4	11,5	5,8	10,3	11,2	11,7	4,9
	65-69 ans	10,5	15,1	6,8	19,2	4,3	14,6	7,2
	70-74 ans	12,1	15,7	9,8	18	13,2	15,4	9,4
	50-74 ans	8,3	11,3	6	9,8	6,2	11,8	5,9
	50-74 ans **	8,4	11,2	5,9
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,9	3,8	2,3	4	2,2	3,4	2,3
	55-59 ans	3,2	5,5	1,4	7,6	0,7	5,1	1,5
	60-64 ans	4,2	5	3,6	5,6	7,2	4,9	3
	65-69 ans	6	8,9	3,8	10,5	2,9	8,6	4
	70-74 ans	6,9	9	5,6	16	6,6	8	5,5
	50-74 ans	4,4	6	3,1	6,1	3,1	5,9	3,1
	50-74 ans **	4,4	5,9	3,1
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,8	0,7	0,9	0,5	0,9	1	1
	55-59 ans	0,8	1,5	0,2	1,7	0	1,4	0,3
	60-64 ans	1,2	1,7	0,8	3,7	0,8	1,3	0,8
	65-69 ans	2	2,8	1,3	1,7	4,3	3	0,9
	70-74 ans	1,9	3,1	1,2	2	0	3,2	1,3
	50-74 ans	1,2	1,7	0,8	1,3	0,9	1,9	0,8
	50-74 ans **	1,3	1,7	0,8
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	7,7	0	12,5	0	0	0	25
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	15,8	18,2	12,5	0	0	20	20
	70-74 ans	12,5	0	33,3	0	0	0	33,3
	50-74 ans	7,6	4,2	12,9	0	0	5,3	17,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des