

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 89 - Yonne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Effectifs sur la période 2009-2010

| | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans | 8648 | 3708 | 4940 | 2118 | 2671 | 1590 | 2269 |
| | 55-59 ans | 9451 | 4116 | 5335 | 1045 | 1155 | 3071 | 4180 |
| | 60-64 ans | 9944 | 4546 | 5398 | 1080 | 1034 | 3466 | 4364 |
| | 65-69 ans | 6750 | 3035 | 3715 | 562 | 604 | 2473 | 3111 |
| | 70-74 ans | 6610 | 3000 | 3610 | 488 | 571 | 2512 | 3039 |
| | 50-74 ans | 41403 | 18405 | 22998 | 5293 | 6035 | 13112 | 16963 |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) | 50-54 ans | 266 | 112 | 154 | 60 | 87 | 52 | 67 |
| | 55-59 ans | 276 | 120 | 156 | 45 | 53 | 75 | 103 |
| | 60-64 ans | 352 | 155 | 197 | 44 | 44 | 111 | 153 |
| | 65-69 ans | 275 | 125 | 150 | 39 | 35 | 86 | 115 |
| | 70-74 ans | 253 | 126 | 127 | 29 | 28 | 97 | 99 |
| | 50-74 ans | 1422 | 638 | 784 | 217 | 247 | 421 | 537 |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 184 | 80 | 104 | 39 | 57 | 41 | 47 |
| | 55-59 ans | 204 | 81 | 123 | 19 | 35 | 62 | 88 |
| | 60-64 ans | 261 | 105 | 156 | 27 | 33 | 78 | 123 |
| | 65-69 ans | 199 | 87 | 112 | 23 | 18 | 64 | 94 |
| | 70-74 ans | 189 | 96 | 93 | 15 | 18 | 81 | 75 |
| | 50-74 ans | 1037 | 449 | 588 | 123 | 161 | 326 | 427 |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait | 50-54 ans | 82 | 32 | 50 | 21 | 30 | 11 | 20 |
| | 55-59 ans | 72 | 39 | 33 | 26 | 18 | 13 | 15 |
| | 60-64 ans | 91 | 50 | 41 | 17 | 11 | 33 | 30 |
| | 65-69 ans | 76 | 38 | 38 | 16 | 17 | 22 | 21 |
| | 70-74 ans | 64 | 30 | 34 | 14 | 10 | 16 | 24 |
| | 50-74 ans | 385 | 189 | 196 | 94 | 86 | 95 | 110 |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable) | 50-54 ans | 8566 | 3676 | 4890 | 2097 | 2641 | 1579 | 2249 |
| | 55-59 ans | 9379 | 4077 | 5302 | 1019 | 1137 | 3058 | 4165 |
| | 60-64 ans | 9853 | 4496 | 5357 | 1063 | 1023 | 3433 | 4334 |
| | 65-69 ans | 6674 | 2997 | 3677 | 546 | 587 | 2451 | 3090 |
| | 70-74 ans | 6546 | 2970 | 3576 | 474 | 561 | 2496 | 3015 |
| | 50-74 ans | 41018 | 18216 | 22802 | 5199 | 5949 | 13017 | 16853 |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif | 50-54 ans | 216 | 114 | 102 | 63 | 54 | 51 | 48 |
| | 55-59 ans | 259 | 144 | 115 | 31 | 25 | 113 | 90 |
| | 60-64 ans | 295 | 162 | 133 | 36 | 34 | 126 | 99 |
| | 65-69 ans | 227 | 124 | 103 | 25 | 17 | 99 | 86 |
| | 70-74 ans | 234 | 117 | 117 | 22 | 16 | 95 | 101 |
| | 50-74 ans | 1231 | 661 | 570 | 177 | 146 | 484 | 424 |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie | 50-54 ans | 209 | 111 | 98 | 62 | 52 | 49 | 46 |
| | 55-59 ans | 255 | 142 | 113 | 30 | 25 | 112 | 88 |
| | 60-64 ans | 281 | 152 | 129 | 32 | 33 | 120 | 96 |
| | 65-69 ans | 214 | 118 | 96 | 22 | 16 | 96 | 80 |
| | 70-74 ans | 227 | 114 | 113 | 21 | 16 | 93 | 97 |
| | 50-74 ans | 1186 | 637 | 549 | 167 | 142 | 470 | 407 |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie | 50-54 ans | 175 | 92 | 83 | 53 | 44 | 39 | 39 |
| | 55-59 ans | 221 | 123 | 98 | 23 | 24 | 100 | 74 |
| | 60-64 ans | 249 | 131 | 118 | 28 | 31 | 103 | 87 |
| | 65-69 ans | 197 | 106 | 91 | 20 | 15 | 86 | 76 |
| | 70-74 ans | 199 | 100 | 99 | 17 | 14 | 83 | 85 |
| | 50-74 ans | 1041 | 552 | 489 | 141 | 128 | 411 | 361 |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète | 50-54 ans | 154 | 78 | 76 | 44 | 41 | 34 | 35 |
| | 55-59 ans | 206 | 114 | 92 | 20 | 21 | 94 | 71 |
| | 60-64 ans | 219 | 115 | 104 | 24 | 28 | 91 | 76 |
| | 65-69 ans | 165 | 82 | 83 | 14 | 11 | 68 | 72 |
| | 70-74 ans | 170 | 83 | 87 | 10 | 12 | 73 | 75 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 89 - Yonne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

| | 50-74 ans | 914 | 472 | 442 | 112 | 113 | 360 | 329 |
|---|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie) | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens) | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 175 | 92 | 83 | 53 | 44 | 39 | 39 |
| | 55-59 ans | 220 | 123 | 97 | 23 | 23 | 100 | 74 |
| | 60-64 ans | 248 | 130 | 118 | 28 | 31 | 102 | 87 |
| | 65-69 ans | 195 | 106 | 89 | 20 | 13 | 86 | 76 |
| | 70-74 ans | 199 | 100 | 99 | 17 | 14 | 83 | 85 |
| | 50-74 ans | 1037 | 551 | 486 | 141 | 125 | 410 | 361 |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie) | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 170 | 87 | 83 | 52 | 44 | 35 | 39 |
| | 55-59 ans | 220 | 123 | 97 | 23 | 23 | 100 | 74 |
| | 60-64 ans | 249 | 131 | 118 | 28 | 31 | 103 | 87 |
| | 65-69 ans | 194 | 104 | 90 | 19 | 14 | 85 | 76 |
| | 70-74 ans | 199 | 100 | 99 | 17 | 14 | 83 | 85 |
| | 50-74 ans | 1032 | 545 | 487 | 139 | 126 | 406 | 361 |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 175 | 92 | 83 | 53 | 44 | 39 | 39 |
| | 55-59 ans | 222 | 124 | 98 | 23 | 24 | 101 | 74 |
| | 60-64 ans | 250 | 131 | 119 | 28 | 31 | 103 | 88 |
| | 65-69 ans | 197 | 106 | 91 | 20 | 15 | 86 | 76 |
| | 70-74 ans | 200 | 101 | 99 | 17 | 14 | 84 | 85 |
| | 50-74 ans | 1044 | 554 | 490 | 141 | 128 | 413 | 362 |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 77 | 32 | 45 | 18 | 23 | 14 | 22 |
| | 55-59 ans | 104 | 49 | 55 | 10 | 14 | 39 | 41 |
| | 60-64 ans | 99 | 40 | 59 | 9 | 14 | 31 | 45 |
| | 65-69 ans | 73 | 25 | 48 | 6 | 6 | 19 | 42 |
| | 70-74 ans | 98 | 42 | 56 | 11 | 9 | 31 | 47 |
| | 50-74 ans | 451 | 188 | 263 | 54 | 66 | 134 | 197 |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 17 | 8 | 9 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| | 55-59 ans | 18 | 10 | 8 | 1 | 0 | 9 | 8 |
| | 60-64 ans | 20 | 11 | 9 | 2 | 3 | 9 | 6 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 89 - Yonne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

| | | | | | | | | |
|---|------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| | 65-69 ans | 14 | 9 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 |
| | 70-74 ans | 11 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| | 50-74 ans | 80 | 43 | 37 | 10 | 12 | 33 | 25 |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm | 50-54 ans | 15 | 4 | 11 | 2 | 6 | 2 | 5 |
| | 55-59 ans | 19 | 14 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 |
| | 60-64 ans | 15 | 9 | 6 | 1 | 3 | 8 | 3 |
| | 65-69 ans | 14 | 9 | 5 | 1 | 0 | 8 | 5 |
| | 70-74 ans | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| | 50-74 ans | 70 | 39 | 31 | 6 | 9 | 33 | 22 |
| A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 20 | 17 | 3 | 7 | 1 | 10 | 2 |
| | 55-59 ans | 28 | 15 | 13 | 2 | 3 | 13 | 10 |
| | 60-64 ans | 43 | 31 | 12 | 7 | 2 | 24 | 10 |
| | 65-69 ans | 32 | 17 | 15 | 4 | 3 | 13 | 12 |
| | 70-74 ans | 22 | 11 | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 |
| | 50-74 ans | 145 | 91 | 54 | 21 | 9 | 70 | 45 |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 30 | 19 | 11 | 15 | 6 | 4 | 5 |
| | 55-59 ans | 40 | 28 | 12 | 8 | 3 | 20 | 9 |
| | 60-64 ans | 48 | 27 | 21 | 7 | 7 | 20 | 14 |
| | 65-69 ans | 44 | 32 | 12 | 4 | 1 | 28 | 11 |
| | 70-74 ans | 35 | 23 | 12 | 2 | 2 | 21 | 10 |
| | 50-74 ans | 197 | 129 | 68 | 36 | 19 | 93 | 49 |
| A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal | 50-54 ans | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| | 60-64 ans | 18 | 11 | 7 | 2 | 2 | 9 | 5 |
| | 65-69 ans | 13 | 8 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| | 70-74 ans | 17 | 10 | 7 | 2 | 2 | 8 | 5 |
| | 50-74 ans | 61 | 39 | 22 | 10 | 8 | 29 | 14 |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique) | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 8 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| | 55-59 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 60-64 ans | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| | 65-69 ans | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| | 70-74 ans | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| | 50-74 ans | 21 | 14 | 7 | 2 | 0 | 12 | 7 |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 11 | 8 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté | 50-54 ans | 50 | 36 | 14 | 22 | 7 | 14 | 7 |
| | 55-59 ans | 68 | 43 | 25 | 10 | 6 | 33 | 19 |
| | 60-64 ans | 91 | 58 | 33 | 14 | 9 | 44 | 24 |
| | 65-69 ans | 76 | 49 | 27 | 8 | 4 | 41 | 23 |
| | 70-74 ans | 57 | 34 | 23 | 3 | 2 | 31 | 21 |
| | 50-74 ans | 342 | 220 | 122 | 57 | 28 | 163 | 94 |
| A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté | 50-54 ans | 30 | 19 | 11 | 15 | 6 | 4 | 5 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 89 - Yonne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

| | | | | | | | | |
|--|------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 55-59 ans | 40 | 28 | 12 | 8 | 3 | 20 | 9 |
| | 60-64 ans | 48 | 27 | 21 | 7 | 7 | 20 | 14 |
| | 65-69 ans | 44 | 32 | 12 | 4 | 1 | 28 | 11 |
| | 70-74 ans | 35 | 23 | 12 | 2 | 2 | 21 | 10 |
| | 50-74 ans | 197 | 129 | 68 | 36 | 19 | 93 | 49 |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté | 50-54 ans | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| | 60-64 ans | 18 | 11 | 7 | 2 | 2 | 9 | 5 |
| | 65-69 ans | 13 | 8 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| | 70-74 ans | 17 | 10 | 7 | 2 | 2 | 8 | 5 |
| | 50-74 ans | 61 | 39 | 22 | 10 | 8 | 29 | 14 |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire) | 50-54 ans | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| | 60-64 ans | 16 | 10 | 6 | 1 | 2 | 9 | 4 |
| | 65-69 ans | 13 | 8 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| | 70-74 ans | 16 | 9 | 7 | 1 | 2 | 8 | 5 |
| | 50-74 ans | 57 | 37 | 20 | 8 | 7 | 29 | 13 |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu | 50-54 ans | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| | 60-64 ans | 14 | 8 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 |
| | 65-69 ans | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| | 70-74 ans | 16 | 9 | 7 | 1 | 2 | 8 | 5 |
| | 50-74 ans | 51 | 32 | 19 | 7 | 7 | 25 | 12 |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus) | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 65-69 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3 | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 89 - Yonne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 12 | 9 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 3 |
| A40- Perdus de vue | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 89 - Yonne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

| Indicateurs sur la période 2009-2010 | | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|--------|
| | | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%) | 50-54 ans | 3,1 | 3 | 3,1 | 2,8 | 3,3 | 3,3 | 3 | |
| | 55-59 ans | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 4,3 | 4,6 | 2,4 | 2,5 | |
| | 60-64 ans | 3,5 | 3,4 | 3,6 | 4,1 | 4,3 | 3,2 | 3,5 | |
| | 65-69 ans | 4,1 | 4,1 | 4 | 6,9 | 5,8 | 3,5 | 3,7 | |
| | 70-74 ans | 3,8 | 4,2 | 3,5 | 5,9 | 4,9 | 3,9 | 3,3 | |
| | 50-74 ans | 3,4 | 3,5 | 3,4 | 4,1 | 4,1 | 3,2 | 3,2 | |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%) | 50-54 ans | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1,1 | 0,7 | 0,9 | |
| | 55-59 ans | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 2,5 | 1,6 | 0,4 | 0,4 | |
| | 60-64 ans | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 1,6 | 1,1 | 1 | 0,7 | |
| | 65-69 ans | 1,1 | 1,3 | 1 | 2,8 | 2,8 | 0,9 | 0,7 | |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0,9 | 2,9 | 1,8 | 0,6 | 0,8 | |
| | 50-74 ans | 0,9 | 1 | 0,9 | 1,8 | 1,4 | 0,7 | 0,6 | |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 69,2 | 71,4 | 67,5 | 65 | 65,5 | 78,8 | 70,1 | |
| | 55-59 ans | 73,9 | 67,5 | 78,8 | 42,2 | 66 | 82,7 | 85,4 | |
| | 60-64 ans | 74,1 | 67,7 | 79,2 | 61,4 | 75 | 70,3 | 80,4 | |
| | 65-69 ans | 72,4 | 69,6 | 74,7 | 59 | 51,4 | 74,4 | 81,7 | |
| | 70-74 ans | 74,7 | 76,2 | 73,2 | 51,7 | 64,3 | 83,5 | 75,8 | |
| | 50-74 ans | 72,9 | 70,4 | 75 | 56,7 | 65,2 | 77,4 | 79,5 | |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%) | 50-54 ans | 2,5 | 3,1 | 2,1 | 3 | 2 | 3,2 | 2,1 | |
| | 55-59 ans | 2,8 | 3,5 | 2,2 | 3 | 2,2 | 3,7 | 2,2 | |
| | 60-64 ans | 3 | 3,6 | 2,5 | 3,4 | 3,3 | 3,7 | 2,3 | |
| | 65-69 ans | 3,4 | 4,1 | 2,8 | 4,6 | 2,9 | 4 | 2,8 | |
| | 70-74 ans | 3,6 | 3,9 | 3,3 | 4,6 | 2,9 | 3,8 | 3,3 | |
| | 50-74 ans | 3 | 3,6 | 2,5 | 3,4 | 2,5 | 3,7 | 2,5 | |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie | 50-54 ans | 96,8 | 97,4 | 96,1 | 98,4 | 96,3 | 96,1 | 95,8 | |
| | 55-59 ans | 98,5 | 98,6 | 98,3 | 96,8 | 100 | 99,1 | 97,8 | |
| | 60-64 ans | 95,3 | 93,8 | 97 | 88,9 | 97,1 | 95,2 | 97 | |
| | 65-69 ans | 94,3 | 95,2 | 93,2 | 88 | 94,1 | 97 | 93 | |
| | 70-74 ans | 97 | 97,4 | 96,6 | 95,5 | 100 | 97,9 | 96 | |
| | 50-74 ans | 96,3 | 96,4 | 96,3 | 94,4 | 97,3 | 97,1 | 96 | |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans | 83,7 | 82,9 | 84,7 | 85,5 | 84,6 | 79,6 | 84,8 | |
| | 55-59 ans | 86,7 | 86,6 | 86,7 | 76,7 | 96 | 89,3 | 84,1 | |
| | 60-64 ans | 88,6 | 86,2 | 91,5 | 87,5 | 93,9 | 85,8 | 90,6 | |
| | 65-69 ans | 92,1 | 89,8 | 94,8 | 90,9 | 93,8 | 89,6 | 95 | |
| | 70-74 ans | 87,7 | 87,7 | 87,6 | 81 | 87,5 | 89,2 | 87,6 | |
| | 50-74 ans | 87,8 | 86,7 | 89,1 | 84,4 | 90,1 | 87,4 | 88,7 | |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète | 50-54 ans | 88 | 84,8 | 91,6 | 83 | 93,2 | 87,2 | 89,7 | |
| | 55-59 ans | 93,2 | 92,7 | 93,9 | 87 | 87,5 | 94 | 95,9 | |
| | 60-64 ans | 88 | 87,8 | 88,1 | 85,7 | 90,3 | 88,3 | 87,4 | |
| | 65-69 ans | 83,8 | 77,4 | 91,2 | 70 | 73,3 | 79,1 | 94,7 | |
| | 70-74 ans | 85,4 | 83 | 87,9 | 58,8 | 85,7 | 88 | 88,2 | |
| | 50-74 ans | 87,8 | 85,5 | 90,4 | 79,4 | 88,3 | 87,6 | 91,1 | |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 74 | 81 | 65 | 77 | 69 | 87 | 61 | |
| | 55-59 ans | 67 | 71 | 62 | 69 | 68 | 71 | 60 | |
| | 60-64 ans | 68 | 68 | 67 | 72 | 65 | 67 | 67 | |
| | 65-69 ans | 81 | 79 | 83 | 105 | 74 | 73 | 85 | |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 89 - Yonne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

| | | | | | | | | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 70-74 ans | 91 | 94 | 89 | 110 | 159 | 90 | 78 |
| | 50-74 ans | 76 | 78 | 73 | 83 | 78 | 76 | 71 |
| C03- Pourcentage de perdus de vue | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 2,8 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 0,4 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0 | 0,2 | 0,2 |
| D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 97,1 | 94,6 | 100 | 98,1 | 100 | 89,7 | 100 |
| | 55-59 ans | 99,5 | 100 | 99 | 100 | 95,8 | 100 | 100 |
| | 60-64 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 65-69 ans | 98,5 | 98,1 | 98,9 | 95 | 93,3 | 98,8 | 100 |
| | 70-74 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 50-74 ans | 99,1 | 98,7 | 99,6 | 98,6 | 98,4 | 98,8 | 100 |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 44 | 34,8 | 54,2 | 34 | 52,3 | 35,9 | 56,4 |
| | 55-59 ans | 46,8 | 39,5 | 56,1 | 43,5 | 58,3 | 38,6 | 55,4 |
| | 60-64 ans | 39,6 | 30,5 | 49,6 | 32,1 | 45,2 | 30,1 | 51,1 |
| | 65-69 ans | 37,1 | 23,6 | 52,7 | 30 | 40 | 22,1 | 55,3 |
| | 70-74 ans | 49 | 41,6 | 56,6 | 64,7 | 64,3 | 36,9 | 55,3 |
| | 50-74 ans | 43,2 | 33,9 | 53,7 | 38,3 | 51,6 | 32,4 | 54,4 |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm | 50-54 ans | 9,7 | 8,7 | 10,8 | 9,4 | 11,4 | 7,7 | 10,3 |
| | 55-59 ans | 8,1 | 8,1 | 8,2 | 4,3 | 0 | 8,9 | 10,8 |
| | 60-64 ans | 8 | 8,4 | 7,6 | 7,1 | 9,7 | 8,7 | 6,8 |
| | 65-69 ans | 7,1 | 8,5 | 5,5 | 10 | 20 | 8,1 | 2,6 |
| | 70-74 ans | 5,5 | 5 | 6,1 | 0 | 7,1 | 6 | 5,9 |
| | 50-74 ans | 7,7 | 7,8 | 7,6 | 7,1 | 9,4 | 8 | 6,9 |
| D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm | 50-54 ans | 8,6 | 4,3 | 13,3 | 3,8 | 13,6 | 5,1 | 12,8 |
| | 55-59 ans | 8,6 | 11,3 | 5,1 | 4,3 | 0 | 12,9 | 6,8 |
| | 60-64 ans | 6 | 6,9 | 5 | 3,6 | 9,7 | 7,8 | 3,4 |
| | 65-69 ans | 7,1 | 8,5 | 5,5 | 5 | 0 | 9,3 | 6,6 |
| | 70-74 ans | 3,5 | 3 | 4 | 5,9 | 0 | 2,4 | 4,7 |
| | 50-74 ans | 6,7 | 7 | 6,3 | 4,3 | 7 | 8 | 6,1 |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 11,4 | 18,5 | 3,6 | 13,2 | 2,3 | 25,6 | 5,1 |
| | 55-59 ans | 12,6 | 12,1 | 13,3 | 8,7 | 12,5 | 12,9 | 13,5 |
| | 60-64 ans | 17,2 | 23,7 | 10,1 | 25 | 6,5 | 23,3 | 11,4 |
| | 65-69 ans | 16,2 | 16 | 16,5 | 20 | 20 | 15,1 | 15,8 |
| | 70-74 ans | 11 | 10,9 | 11,1 | 5,9 | 0 | 11,9 | 12,9 |
| | 50-74 ans | 13,9 | 16,4 | 11 | 14,9 | 7 | 16,9 | 12,4 |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 17,1 | 20,7 | 13,3 | 28,3 | 13,6 | 10,3 | 12,8 |
| | 55-59 ans | 18 | 22,6 | 12,2 | 34,8 | 12,5 | 19,8 | 12,2 |
| | 60-64 ans | 19,2 | 20,6 | 17,6 | 25 | 22,6 | 19,4 | 15,9 |
| | 65-69 ans | 22,3 | 30,2 | 13,2 | 20 | 6,7 | 32,6 | 14,5 |
| | 70-74 ans | 17,5 | 22,8 | 12,1 | 11,8 | 14,3 | 25 | 11,8 |
| | 50-74 ans | 18,9 | 23,3 | 13,9 | 25,5 | 14,8 | 22,5 | 13,5 |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer | 50-54 ans | 4 | 5,4 | 2,4 | 7,5 | 4,5 | 2,6 | 0 |
| | 55-59 ans | 2,7 | 4 | 1 | 4,3 | 4,2 | 4 | 0 |
| | 60-64 ans | 7,2 | 8,4 | 5,9 | 7,1 | 6,5 | 8,7 | 5,7 |
| | 65-69 ans | 6,6 | 7,5 | 5,5 | 5 | 6,7 | 8,1 | 5,3 |
| | 70-74 ans | 8,5 | 9,9 | 7,1 | 11,8 | 14,3 | 9,5 | 5,9 |
| | 50-74 ans | 5,8 | 7 | 4,5 | 7,1 | 6,3 | 7 | 3,9 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 89 - Yonne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

| | | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique) | 50-54 ans | 0,6 | 0 | 1,2 | 0 | 2,3 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1,4 | 0 | 3,1 | 0 | 8,3 | 0 | 1,4 |
| | 60-64 ans | 0,4 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 0,5 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,2 | 1,2 |
| | 50-74 ans | 0,8 | 0,5 | 1 | 0 | 2,3 | 0,7 | 0,6 |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 1,7 | 2,2 | 1,2 | 1,9 | 0 | 2,6 | 2,6 |
| | 55-59 ans | 0,9 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 0,8 | 3,4 | 0 | 0 | 1 | 4,5 |
| | 65-69 ans | 2 | 3,8 | 0 | 5 | 0 | 3,5 | 0 |
| | 70-74 ans | 3,5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2,4 |
| | 50-74 ans | 2 | 2,5 | 1,4 | 1,4 | 0 | 2,9 | 1,9 |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 2,9 | 5,4 | 0 | 1,9 | 0 | 10,3 | 0 |
| | 55-59 ans | 0,9 | 0,8 | 1 | 0 | 4,2 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 0,4 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 1,1 |
| | 65-69 ans | 1 | 0,9 | 1,1 | 5 | 6,7 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 |
| | 50-74 ans | 1,1 | 1,4 | 0,6 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 0,3 |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 5,8 | 9,8 | 2,9 | 10,5 | 2,7 | 8,9 | 3,1 |
| | 55-59 ans | 7,3 | 10,5 | 4,7 | 9,8 | 5,3 | 10,8 | 4,6 |
| | 60-64 ans | 9,2 | 12,9 | 6,2 | 13,2 | 8,8 | 12,8 | 5,5 |
| | 65-69 ans | 11,4 | 16,3 | 7,3 | 14,7 | 6,8 | 16,7 | 7,4 |
| | 70-74 ans | 8,7 | 11,4 | 6,4 | 6,3 | 3,6 | 12,4 | 7 |
| | 50-74 ans | 8,3 | 12,1 | 5,4 | 11 | 4,7 | 12,5 | 5,6 |
| | 50-74 ans ** | 8,4 | 11,8 | 5,2 | . | . | . | . |
| D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 3,5 | 5,2 | 2,2 | 7,2 | 2,3 | 2,5 | 2,2 |
| | 55-59 ans | 4,3 | 6,9 | 2,3 | 7,9 | 2,6 | 6,5 | 2,2 |
| | 60-64 ans | 4,9 | 6 | 3,9 | 6,6 | 6,8 | 5,8 | 3,2 |
| | 65-69 ans | 6,6 | 10,7 | 3,3 | 7,3 | 1,7 | 11,4 | 3,6 |
| | 70-74 ans | 5,3 | 7,7 | 3,4 | 4,2 | 3,6 | 8,4 | 3,3 |
| | 50-74 ans | 4,8 | 7,1 | 3 | 6,9 | 3,2 | 7,1 | 2,9 |
| | 50-74 ans ** | 4,8 | 6,9 | 2,9 | . | . | . | . |
| D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 0,8 | 1,4 | 0,4 | 1,9 | 0,8 | 0,6 | 0 |
| | 55-59 ans | 0,6 | 1,2 | 0,2 | 1 | 0,9 | 1,3 | 0 |
| | 60-64 ans | 1,8 | 2,4 | 1,3 | 1,9 | 2 | 2,6 | 1,2 |
| | 65-69 ans | 1,9 | 2,7 | 1,4 | 1,8 | 1,7 | 2,9 | 1,3 |
| | 70-74 ans | 2,6 | 3,4 | 2 | 4,2 | 3,6 | 3,2 | 1,7 |
| | 50-74 ans | 1,5 | 2,1 | 1 | 1,9 | 1,3 | 2,2 | 0,8 |
| | 50-74 ans ** | 1,5 | 2 | 0,9 | . | . | . | . |
| E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu | 50-54 ans | 83,3 | 80 | 100 | 75 | 100 | 100 | 0 |
| | 55-59 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | 60-64 ans | 87,5 | 80 | 100 | 100 | 100 | 77,8 | 100 |
| | 65-69 ans | 76,9 | 75 | 80 | 100 | 100 | 71,4 | 75 |
| | 70-74 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 50-74 ans | 89,5 | 86,5 | 95 | 87,5 | 100 | 86,2 | 92,3 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des