

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 21 - Côte d'Or

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Effectifs sur la période 2009-2010

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	14204	6483	7721	3472	3923	3011	3798
	55-59 ans	15425	6948	8477	935	902	6013	7575
	60-64 ans	15865	7110	8755	792	784	6318	7971
	65-69 ans	10996	5020	5976	422	436	4598	5540
	70-74 ans	10056	4353	5703	314	333	4039	5370
	50-74 ans	66546	29914	36632	5935	6378	23979	30254
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	743	367	376	217	207	150	169
	55-59 ans	868	373	495	70	74	303	421
	60-64 ans	978	434	544	71	67	363	477
	65-69 ans	689	313	376	44	40	269	336
	70-74 ans	636	268	368	29	33	239	335
	50-74 ans	3914	1755	2159	431	421	1324	1738
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	534	266	268	139	133	127	135
	55-59 ans	671	278	393	41	38	237	355
	60-64 ans	814	354	460	44	38	310	422
	65-69 ans	569	253	316	17	27	236	289
	70-74 ans	513	212	301	17	20	195	281
	50-74 ans	3101	1363	1738	258	256	1105	1482
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	209	101	108	78	74	23	34
	55-59 ans	197	95	102	29	36	66	66
	60-64 ans	164	80	84	27	29	53	55
	65-69 ans	120	60	60	27	13	33	47
	70-74 ans	123	56	67	12	13	44	54
	50-74 ans	813	392	421	173	165	219	256
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	13995	6382	7613	3394	3849	2988	3764
	55-59 ans	15228	6853	8375	906	866	5947	7509
	60-64 ans	15701	7030	8671	765	755	6265	7916
	65-69 ans	10876	4960	5916	395	423	4565	5493
	70-74 ans	9933	4297	5636	302	320	3995	5316
	50-74 ans	65733	29522	36211	5762	6213	23760	29998
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	325	171	154	92	69	79	85
	55-59 ans	351	205	146	37	18	168	128
	60-64 ans	430	214	216	34	25	180	191
	65-69 ans	307	167	140	28	9	139	131
	70-74 ans	280	150	130	19	12	131	118
	50-74 ans	1693	907	786	210	133	697	653
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	325	171	154	92	69	79	85
	55-59 ans	351	205	146	37	18	168	128
	60-64 ans	430	214	216	34	25	180	191
	65-69 ans	307	167	140	28	9	139	131
	70-74 ans	280	150	130	19	12	131	118
	50-74 ans	1693	907	786	210	133	697	653
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	280	146	134	79	56	67	78
	55-59 ans	303	178	125	34	17	144	108
	60-64 ans	363	177	186	23	18	154	168
	65-69 ans	262	141	121	23	6	118	115
	70-74 ans	244	134	110	16	8	118	102
	50-74 ans	1452	776	676	175	105	601	571
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	272	142	130	76	54	66	76
	55-59 ans	292	172	120	30	16	142	104
	60-64 ans	351	172	179	22	15	150	164
	65-69 ans	249	136	113	22	4	114	109
	70-74 ans	232	129	103	15	8	114	95

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 21 - Côte d'Or

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	50-74 ans	1396	751	645	165	97	586	548
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	1	1	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	5	3	2	2	1	1	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)								
	50-54 ans	279	146	133	79	56	67	77
	55-59 ans	299	177	122	34	17	143	105
	60-64 ans	359	174	185	23	18	151	167
	65-69 ans	258	141	117	23	5	118	112
	70-74 ans	239	131	108	16	8	115	100
	50-74 ans	1434	769	665	175	104	594	561
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique								
	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	4	1	3	0	0	1	3
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	4	0	4	0	1	0	3
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	50-74 ans	18	7	11	0	1	7	10
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu								
	50-54 ans	280	146	134	79	56	67	78
	55-59 ans	303	178	125	34	17	144	108
	60-64 ans	363	177	186	23	18	154	168
	65-69 ans	262	141	121	23	6	118	115
	70-74 ans	244	134	110	16	8	118	102
	50-74 ans	1452	776	676	175	105	601	571
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)								
	50-54 ans	280	146	134	79	56	67	78
	55-59 ans	303	178	125	34	17	144	108
	60-64 ans	363	177	186	23	18	154	168
	65-69 ans	262	141	121	23	6	118	115
	70-74 ans	244	134	110	16	8	118	102
	50-74 ans	1452	776	676	175	105	601	571
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
	50-54 ans	130	49	81	26	35	23	46
	55-59 ans	136	64	72	10	12	54	60
	60-64 ans	163	56	107	5	8	51	99
	65-69 ans	111	46	65	7	2	39	63
	70-74 ans	96	47	49	2	6	45	43
	50-74 ans	636	262	374	50	63	212	311
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	24	16	8	6	2	10	6
	55-59 ans	31	22	9	1	0	21	9
	60-64 ans	29	12	17	2	1	10	16

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 21 - Côte d'Or

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	25	13	12	3	0	10	12
	70-74 ans	14	5	9	0	0	5	9
	50-74 ans	123	68	55	12	3	56	52
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	24	10	14	6	4	4	10
	55-59 ans	11	7	4	0	0	7	4
	60-64 ans	14	10	4	0	1	10	3
	65-69 ans	10	5	5	1	0	4	5
	70-74 ans	13	7	6	1	1	6	5
	50-74 ans	72	39	33	8	6	31	27
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	41	29	12	15	5	14	7
	55-59 ans	48	33	15	5	1	28	14
	60-64 ans	66	42	24	4	2	38	22
	65-69 ans	50	32	18	3	1	29	17
	70-74 ans	43	31	12	4	0	27	12
	50-74 ans	248	167	81	31	9	136	72
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	39	31	8	18	5	13	3
	55-59 ans	40	28	12	7	3	21	9
	60-64 ans	66	45	21	9	3	36	18
	65-69 ans	39	30	9	6	0	24	9
	70-74 ans	45	26	19	6	1	20	18
	50-74 ans	229	160	69	46	12	114	57
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	13	8	5	6	3	2	2
	55-59 ans	16	12	4	6	1	6	3
	60-64 ans	17	8	9	0	3	8	6
	65-69 ans	16	9	7	3	1	6	6
	70-74 ans	20	13	7	2	0	11	7
	50-74 ans	82	50	32	17	8	33	24
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	9	3	6	2	2	1	4
	55-59 ans	21	12	9	5	0	7	9
	60-64 ans	8	4	4	3	0	1	4
	65-69 ans	11	6	5	0	2	6	3
	70-74 ans	13	5	8	1	0	4	8
	50-74 ans	62	30	32	11	4	19	28
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	80	60	20	33	10	27	10
	55-59 ans	88	61	27	12	4	49	23
	60-64 ans	132	87	45	13	5	74	40
	65-69 ans	89	62	27	9	1	53	26
	70-74 ans	88	57	31	10	1	47	30
	50-74 ans	477	327	150	77	21	250	129
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	39	31	8	18	5	13	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 21 - Côte d'Or

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	40	28	12	7	3	21	9
	60-64 ans	66	45	21	9	3	36	18
	65-69 ans	39	30	9	6	0	24	9
	70-74 ans	45	26	19	6	1	20	18
	50-74 ans	229	160	69	46	12	114	57
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	13	8	5	6	3	2	2
	55-59 ans	16	12	4	6	1	6	3
	60-64 ans	17	8	9	0	3	8	6
	65-69 ans	16	9	7	3	1	6	6
	70-74 ans	20	13	7	2	0	11	7
	50-74 ans	82	50	32	17	8	33	24
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	11	6	5	4	3	2	2
	55-59 ans	16	12	4	6	1	6	3
	60-64 ans	15	8	7	0	1	8	6
	65-69 ans	12	6	6	2	1	4	5
	70-74 ans	19	12	7	2	0	10	7
	50-74 ans	73	44	29	14	6	30	23
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	4	2	2	1	0	1	2
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	12	8	4	2	0	6	4
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	10	6	4	4	3	2	1
	55-59 ans	13	10	3	5	1	5	2
	60-64 ans	13	6	7	0	1	6	6
	65-69 ans	8	4	4	1	1	3	3
	70-74 ans	17	10	7	2	0	8	7
	50-74 ans	61	36	25	12	6	24	19
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	10	6	4	4	3	2	1
	55-59 ans	11	8	3	4	1	4	2
	60-64 ans	9	3	6	0	1	3	5
	65-69 ans	8	4	4	1	1	3	3
	70-74 ans	14	9	5	2	0	7	5
	50-74 ans	52	30	22	11	6	19	16
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	9	6	3	1	0	5	3
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	5	3	2	1	1	2	1
	55-59 ans	6	4	2	3	1	1	1
	60-64 ans	3	0	3	0	0	0	3
	65-69 ans	4	1	3	0	1	1	2
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	19	9	10	4	3	5	7
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	1	0	2	1
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	9	5	4	1	0	4	4
	50-74 ans	16	9	7	3	1	6	6
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 21 - Côte d'Or

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	0	1
	65-69 ans	2	2	0	0	0	0	2	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	0	2	0
	50-74 ans	9	6	3	2	2	4	1	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0	0
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	8	6	2	2	0	4	2	2
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	11	6	5	4	3	2	2	2
	55-59 ans	15	11	4	5	1	6	3	3
	60-64 ans	14	7	7	0	1	7	6	6
	65-69 ans	10	5	5	2	1	3	4	4
	70-74 ans	18	11	7	1	0	10	7	7
	50-74 ans	68	40	28	12	6	28	22	22
A40- Perdus de vue	50-54 ans	38	23	15	12	11	11	4	4
	55-59 ans	35	23	12	3	1	20	11	11
	60-64 ans	52	29	23	8	7	21	16	16
	65-69 ans	39	21	18	5	2	16	16	16
	70-74 ans	28	13	15	3	4	10	11	11
	50-74 ans	192	109	83	31	25	78	58	58

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 21 - Côte d'Or

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,2	5,7	4,9	6,3	5,3	5	4,4	
	55-59 ans	5,6	5,4	5,8	7,5	8,2	5	5,6	
	60-64 ans	6,2	6,1	6,2	9	8,5	5,7	6	
	65-69 ans	6,3	6,2	6,3	10,4	9,2	5,9	6,1	
	70-74 ans	6,3	6,2	6,5	9,2	9,9	5,9	6,2	
	50-74 ans	5,9	5,9	5,9	7,3	6,6	5,5	5,7	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,5	1,6	1,4	2,2	1,9	0,8	0,9	
	55-59 ans	1,3	1,4	1,2	3,1	4	1,1	0,9	
	60-64 ans	1	1,1	1	3,4	3,7	0,8	0,7	
	65-69 ans	1,1	1,2	1	6,4	3	0,7	0,8	
	70-74 ans	1,2	1,3	1,2	3,8	3,9	1,1	1	
	50-74 ans	1,2	1,3	1,1	2,9	2,6	0,9	0,8	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	71,9	72,5	71,3	64,1	64,3	84,7	79,9	
	55-59 ans	77,3	74,5	79,4	58,6	51,4	78,2	84,3	
	60-64 ans	83,2	81,6	84,6	62	56,7	85,4	88,5	
	65-69 ans	82,6	80,8	84	38,6	67,5	87,7	86	
	70-74 ans	80,7	79,1	81,8	58,6	60,6	81,6	83,9	
	50-74 ans	79,2	77,7	80,5	59,9	60,8	83,5	85,3	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,3	2,7	2	2,7	1,8	2,6	2,3	
	55-59 ans	2,3	3	1,7	4,1	2,1	2,8	1,7	
	60-64 ans	2,7	3	2,5	4,4	3,3	2,9	2,4	
	65-69 ans	2,8	3,4	2,4	7,1	2,1	3	2,4	
	70-74 ans	2,8	3,5	2,3	6,3	3,8	3,3	2,2	
	50-74 ans	2,6	3,1	2,2	3,6	2,1	2,9	2,2	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	86,2	85,4	87	85,9	81,2	84,8	91,8	
	55-59 ans	86,3	86,8	85,6	91,9	94,4	85,7	84,4	
	60-64 ans	84,4	82,7	86,1	67,6	72	85,6	88	
	65-69 ans	85,3	84,4	86,4	82,1	66,7	84,9	87,8	
	70-74 ans	87,1	89,3	84,6	84,2	66,7	90,1	86,4	
	50-74 ans	85,8	85,6	86	83,3	78,9	86,2	87,4	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,1	97,3	97	96,2	96,4	98,5	97,4	
	55-59 ans	96,4	96,6	96	88,2	94,1	98,6	96,3	
	60-64 ans	96,7	97,2	96,2	95,7	83,3	97,4	97,6	
	65-69 ans	95	96,5	93,4	95,7	66,7	96,6	94,8	
	70-74 ans	95,1	96,3	93,6	93,8	100	96,6	93,1	
	50-74 ans	96,1	96,8	95,4	94,3	92,4	97,5	96	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	75	76	74	76	68	75	78	
	55-59 ans	79	78	81	106	77	71	82	
	60-64 ans	75	78	73	68	59	79	75	
	65-69 ans	82	94	68	83	71	96	68	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 21 - Côte d'Or

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	77	73	82	93	49	70	84
	50-74 ans	77	79	75	83	67	78	77
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	11,7	13,5	9,7	13	15,9	13,9	4,7
	55-59 ans	10	11,2	8,2	8,1	5,6	11,9	8,6
	60-64 ans	12,1	13,6	10,6	23,5	28	11,7	8,4
	65-69 ans	12,7	12,6	12,9	17,9	22,2	11,5	12,2
	70-74 ans	10	8,7	11,5	15,8	33,3	7,6	9,3
	50-74 ans	11,3	12	10,6	14,8	18,8	11,2	8,9
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100						
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	46,4	33,6	60,4	32,9	62,5	34,3	59
	55-59 ans	44,9	36	57,6	29,4	70,6	37,5	55,6
	60-64 ans	44,9	31,6	57,5	21,7	44,4	33,1	58,9
	65-69 ans	42,4	32,6	53,7	30,4	33,3	33,1	54,8
	70-74 ans	39,3	35,1	44,5	12,5	75	38,1	42,2
	50-74 ans	43,8	33,8	55,3	28,6	60	35,3	54,5
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	8,6	11	6	7,6	3,6	14,9	7,7
	55-59 ans	10,2	12,4	7,2	2,9	0	14,6	8,3
	60-64 ans	8	6,8	9,1	8,7	5,6	6,5	9,5
	65-69 ans	9,5	9,2	9,9	13	0	8,5	10,4
	70-74 ans	5,7	3,7	8,2	0	0	4,2	8,8
	50-74 ans	8,5	8,8	8,1	6,9	2,9	9,3	9,1
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	8,6	6,8	10,4	7,6	7,1	6	12,8
	55-59 ans	3,6	3,9	3,2	0	0	4,9	3,7
	60-64 ans	3,9	5,6	2,2	0	5,6	6,5	1,8
	65-69 ans	3,8	3,5	4,1	4,3	0	3,4	4,3
	70-74 ans	5,3	5,2	5,5	6,3	12,5	5,1	4,9
	50-74 ans	5	5	4,9	4,6	5,7	5,2	4,7
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14,6	19,9	9	19	8,9	20,9	9
	55-59 ans	15,8	18,5	12	14,7	5,9	19,4	13
	60-64 ans	18,2	23,7	12,9	17,4	11,1	24,7	13,1
	65-69 ans	19,1	22,7	14,9	13	16,7	24,6	14,8
	70-74 ans	17,6	23,1	10,9	25	0	22,9	11,8
	50-74 ans	17,1	21,5	12	17,7	8,6	22,6	12,6
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	13,9	21,2	6	22,8	8,9	19,4	3,8
	55-59 ans	13,2	15,7	9,6	20,6	17,6	14,6	8,3
	60-64 ans	18,2	25,4	11,3	39,1	16,7	23,4	10,7
	65-69 ans	14,9	21,3	7,4	26,1	0	20,3	7,8
	70-74 ans	18,4	19,4	17,3	37,5	12,5	16,9	17,6
	50-74 ans	15,8	20,6	10,2	26,3	11,4	19	10
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,6	5,5	3,7	7,6	5,4	3	2,6
	55-59 ans	5,3	6,7	3,2	17,6	5,9	4,2	2,8
	60-64 ans	4,7	4,5	4,8	0	16,7	5,2	3,6
	65-69 ans	6,1	6,4	5,8	13	16,7	5,1	5,2
	70-74 ans	8,2	9,7	6,4	12,5	0	9,3	6,9
	50-74 ans	5,6	6,4	4,7	9,7	7,6	5,5	4,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 21 - Côte d'Or

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3,2	2,1	4,5	2,5	3,6	1,5	5,1
	55-59 ans	6,9	6,7	7,2	14,7	0	4,9	8,3
	60-64 ans	2,2	2,3	2,2	13	0	0,6	2,4
	65-69 ans	4,2	4,3	4,1	0	33,3	5,1	2,6
	70-74 ans	5,3	3,7	7,3	6,3	0	3,4	7,8
	50-74 ans	4,3	3,9	4,7	6,3	3,8	3,2	4,9
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,7	9,4	2,6	9,7	2,6	9	2,7
	55-59 ans	5,8	8,9	3,2	13,2	4,6	8,2	3,1
	60-64 ans	8,4	12,4	5,2	17	6,6	11,8	5,1
	65-69 ans	8,2	12,5	4,6	22,8	2,4	11,6	4,7
	70-74 ans	8,9	13,3	5,5	33,1	3,1	11,8	5,6
	50-74 ans	7,3	11,1	4,1	13,4	3,4	10,5	4,3
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-74 ans **	7,3	10,9	4
	50-54 ans	2,8	4,9	1,1	5,3	1,3	4,4	0,8
	55-59 ans	2,6	4,1	1,4	7,7	3,5	3,5	1,2
	60-64 ans	4,2	6,4	2,4	11,8	4	5,7	2,3
	65-69 ans	3,6	6	1,5	15,2	0	5,3	1,6
	70-74 ans	4,5	6,1	3,4	19,9	3,1	5	3,4
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-74 ans **	3,5	5,3	1,9
	50-54 ans	0,9	1,3	0,7	1,8	0,8	0,7	0,5
	55-59 ans	1,1	1,8	0,5	6,6	1,2	1	0,4
	60-64 ans	1,1	1,1	1	0	4	1,3	0,8
	65-69 ans	1,5	1,8	1,2	7,6	2,4	1,3	1,1
	70-74 ans	2	3	1,2	6,6	0	2,8	1,3
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-74 ans **	1,2	1,7	0,9	3	1,3	1,4	0,8
	50-54 ans	9,1	0	20	0	0	0	50
	55-59 ans	18,8	16,7	25	16,7	0	16,7	33,3
	60-64 ans	13,3	25	0	0	0	25	0
	65-69 ans	33,3	33,3	33,3	50	0	25	40
	70-74 ans	10,5	16,7	0	0	0	20	0
	50-74 ans	16,4	18,2	13,8	14,3	0	20	17,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des