

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 972 - Martinique

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

| Effectifs sur la période 2009-2010 | | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|------------|------------------------|--------|
| | | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans | 6663 | 2189 | 4474 | 2157 | 4372 | 32 | 102 | |
| | 55-59 ans | 6305 | 2101 | 4204 | 2067 | 4076 | 34 | 128 | |
| | 60-64 ans | 6780 | 2548 | 4232 | 2504 | 4139 | 44 | 93 | |
| | 65-69 ans | 5408 | 2112 | 3296 | 2018 | 3118 | 94 | 178 | |
| | 70-74 ans | 4079 | 1455 | 2624 | 1221 | 1966 | 234 | 658 | |
| | 50-74 ans | 29235 | 10405 | 18830 | 9967 | 17671 | 438 | 1159 | |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) | 50-54 ans | 875 | 306 | 569 | 306 | 566 | 0 | 3 | |
| | 55-59 ans | 888 | 311 | 577 | 307 | 569 | 4 | 8 | |
| | 60-64 ans | 1051 | 463 | 588 | 456 | 579 | 7 | 9 | |
| | 65-69 ans | 919 | 361 | 558 | 357 | 542 | 4 | 16 | |
| | 70-74 ans | 833 | 295 | 538 | 275 | 483 | 20 | 55 | |
| | 50-74 ans | 4566 | 1736 | 2830 | 1701 | 2739 | 35 | 91 | |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 539 | 180 | 359 | 180 | 358 | 0 | 1 | |
| | 55-59 ans | 562 | 190 | 372 | 188 | 371 | 2 | 1 | |
| | 60-64 ans | 666 | 293 | 373 | 291 | 367 | 2 | 6 | |
| | 65-69 ans | 527 | 226 | 301 | 224 | 295 | 2 | 6 | |
| | 70-74 ans | 427 | 142 | 285 | 127 | 250 | 15 | 35 | |
| | 50-74 ans | 2721 | 1031 | 1690 | 1010 | 1641 | 21 | 49 | |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait | 50-54 ans | 336 | 126 | 210 | 126 | 208 | 0 | 2 | |
| | 55-59 ans | 326 | 121 | 205 | 119 | 198 | 2 | 7 | |
| | 60-64 ans | 385 | 170 | 215 | 165 | 212 | 5 | 3 | |
| | 65-69 ans | 392 | 135 | 257 | 133 | 247 | 2 | 10 | |
| | 70-74 ans | 406 | 153 | 253 | 148 | 233 | 5 | 20 | |
| | 50-74 ans | 1845 | 705 | 1140 | 691 | 1098 | 14 | 42 | |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable) | 50-54 ans | 6327 | 2063 | 4264 | 2031 | 4164 | 32 | 100 | |
| | 55-59 ans | 5979 | 1980 | 3999 | 1948 | 3878 | 32 | 121 | |
| | 60-64 ans | 6395 | 2378 | 4017 | 2339 | 3927 | 39 | 90 | |
| | 65-69 ans | 5016 | 1977 | 3039 | 1885 | 2871 | 92 | 168 | |
| | 70-74 ans | 3673 | 1302 | 2371 | 1073 | 1733 | 229 | 638 | |
| | 50-74 ans | 27390 | 9700 | 17690 | 9276 | 16573 | 424 | 1117 | |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif | 50-54 ans | 114 | 45 | 69 | 43 | 68 | 2 | 1 | |
| | 55-59 ans | 118 | 53 | 65 | 52 | 62 | 1 | 3 | |
| | 60-64 ans | 127 | 64 | 63 | 63 | 60 | 1 | 3 | |
| | 65-69 ans | 136 | 51 | 85 | 49 | 83 | 2 | 2 | |
| | 70-74 ans | 79 | 35 | 44 | 30 | 32 | 5 | 12 | |
| | 50-74 ans | 574 | 248 | 326 | 237 | 305 | 11 | 21 | |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie | 50-54 ans | 113 | 45 | 68 | 43 | 67 | 2 | 1 | |
| | 55-59 ans | 117 | 52 | 65 | 51 | 62 | 1 | 3 | |
| | 60-64 ans | 125 | 62 | 63 | 62 | 60 | 0 | 3 | |
| | 65-69 ans | 134 | 49 | 85 | 47 | 83 | 2 | 2 | |
| | 70-74 ans | 77 | 34 | 43 | 29 | 31 | 5 | 12 | |
| | 50-74 ans | 566 | 242 | 324 | 232 | 303 | 10 | 21 | |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie | 50-54 ans | 98 | 37 | 61 | 36 | 60 | 1 | 1 | |
| | 55-59 ans | 102 | 44 | 58 | 43 | 55 | 1 | 3 | |
| | 60-64 ans | 109 | 51 | 58 | 51 | 55 | 0 | 3 | |
| | 65-69 ans | 119 | 42 | 77 | 41 | 75 | 1 | 2 | |
| | 70-74 ans | 67 | 30 | 37 | 26 | 26 | 4 | 11 | |
| | 50-74 ans | 495 | 204 | 291 | 197 | 271 | 7 | 20 | |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète | 50-54 ans | 72 | 27 | 45 | 27 | 45 | 0 | 0 | |
| | 55-59 ans | 81 | 36 | 45 | 35 | 43 | 1 | 2 | |
| | 60-64 ans | 82 | 42 | 40 | 42 | 37 | 0 | 3 | |
| | 65-69 ans | 83 | 30 | 53 | 29 | 53 | 1 | 0 | |
| | 70-74 ans | 40 | 16 | 24 | 14 | 17 | 2 | 7 | |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 972 - Martinique

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

| | | | | | | | | |
|---|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|
| | 50-74 ans | 358 | 151 | 207 | 147 | 195 | 4 | 12 |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens) | 50-54 ans | 97 | 36 | 61 | 35 | 60 | 1 | 1 |
| | 55-59 ans | 100 | 42 | 58 | 41 | 55 | 1 | 3 |
| | 60-64 ans | 106 | 51 | 55 | 51 | 52 | 0 | 3 |
| | 65-69 ans | 117 | 42 | 75 | 41 | 73 | 1 | 2 |
| | 70-74 ans | 65 | 28 | 37 | 25 | 26 | 3 | 11 |
| | 50-74 ans | 485 | 199 | 286 | 193 | 266 | 6 | 20 |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 10 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 97 | 36 | 61 | 35 | 60 | 1 | 1 |
| | 55-59 ans | 100 | 44 | 56 | 43 | 54 | 1 | 2 |
| | 60-64 ans | 109 | 51 | 58 | 51 | 55 | 0 | 3 |
| | 65-69 ans | 119 | 42 | 77 | 41 | 75 | 1 | 2 |
| | 70-74 ans | 67 | 30 | 37 | 26 | 26 | 4 | 11 |
| | 50-74 ans | 492 | 203 | 289 | 196 | 270 | 7 | 19 |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) | 50-54 ans | 98 | 37 | 61 | 36 | 60 | 1 | 1 |
| | 55-59 ans | 102 | 44 | 58 | 43 | 55 | 1 | 3 |
| | 60-64 ans | 109 | 51 | 58 | 51 | 55 | 0 | 3 |
| | 65-69 ans | 119 | 42 | 77 | 41 | 75 | 1 | 2 |
| | 70-74 ans | 67 | 30 | 37 | 26 | 26 | 4 | 11 |
| | 50-74 ans | 495 | 204 | 291 | 197 | 271 | 7 | 20 |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 69 | 21 | 48 | 21 | 47 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 71 | 26 | 45 | 26 | 44 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 73 | 28 | 45 | 28 | 42 | 0 | 3 |
| | 65-69 ans | 82 | 26 | 56 | 25 | 54 | 1 | 2 |
| | 70-74 ans | 42 | 17 | 25 | 13 | 16 | 4 | 9 |
| | 50-74 ans | 337 | 118 | 219 | 113 | 203 | 5 | 16 |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm | 50-54 ans | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 972 - Martinique

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

| | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| | 65-69 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 13 | 8 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 9 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 13 | 5 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 8 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 49 | 25 | 24 | 24 | 22 | 1 | 2 |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 13 | 8 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 8 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 14 | 6 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 45 | 26 | 19 | 26 | 18 | 0 | 1 |
| A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal | 50-54 ans | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 33 | 19 | 14 | 18 | 14 | 1 | 0 |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique) | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 13 | 8 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté | 50-54 ans | 18 | 11 | 7 | 10 | 7 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 19 | 9 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 17 | 12 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 27 | 11 | 16 | 11 | 16 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 13 | 8 | 5 | 8 | 3 | 0 | 2 |
| | 50-74 ans | 94 | 51 | 43 | 50 | 40 | 1 | 3 |
| A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté | 50-54 ans | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 972 - Martinique

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

| | | | | | | | | |
|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| | 55-59 ans | 13 | 8 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 8 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 14 | 6 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 45 | 26 | 19 | 26 | 18 | 0 | 1 |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté | 50-54 ans | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 33 | 19 | 14 | 18 | 14 | 1 | 0 |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire) | 50-54 ans | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 11 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 32 | 18 | 14 | 17 | 14 | 1 | 0 |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu | 50-54 ans | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 19 | 9 | 10 | 9 | 10 | 0 | 0 |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus) | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 13 | 9 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 12 | 9 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1 | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 972 - Martinique

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 15 | 10 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| A40- Perdus de vue | 50-54 ans | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 13 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 26 | 14 | 12 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 972 - Martinique

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

| Indicateurs sur la période 2009-2010 | | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|--------|
| | | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%) | 50-54 ans | 13,1 | 14 | 12,7 | 14,2 | 12,9 | 0 | 2,9 | |
| | 55-59 ans | 14,1 | 14,8 | 13,7 | 14,9 | 14 | 11,8 | 6,3 | |
| | 60-64 ans | 15,5 | 18,2 | 13,9 | 18,2 | 14 | 15,9 | 9,7 | |
| | 65-69 ans | 17 | 17,1 | 16,9 | 17,7 | 17,4 | 4,3 | 9 | |
| | 70-74 ans | 20,4 | 20,3 | 20,5 | 22,5 | 24,6 | 8,5 | 8,4 | |
| | 50-74 ans | 15,6 | 16,7 | 15 | 17,1 | 15,5 | 8 | 7,9 | |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%) | 50-54 ans | 5 | 5,8 | 4,7 | 5,8 | 4,8 | 0 | 2 | |
| | 55-59 ans | 5,2 | 5,8 | 4,9 | 5,8 | 4,9 | 5,9 | 5,5 | |
| | 60-64 ans | 5,7 | 6,7 | 5,1 | 6,6 | 5,1 | 11,4 | 3,2 | |
| | 65-69 ans | 7,2 | 6,4 | 7,8 | 6,6 | 7,9 | 2,1 | 5,6 | |
| | 70-74 ans | 10 | 10,5 | 9,6 | 12,1 | 11,9 | 2,1 | 3 | |
| | 50-74 ans | 6,3 | 6,8 | 6,1 | 6,9 | 6,2 | 3,2 | 3,6 | |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 61,6 | 58,8 | 63,1 | 58,8 | 63,3 | 0 | 33,3 | |
| | 55-59 ans | 63,3 | 61,1 | 64,5 | 61,2 | 65,2 | 50 | 12,5 | |
| | 60-64 ans | 63,4 | 63,3 | 63,4 | 63,8 | 63,4 | 28,6 | 66,7 | |
| | 65-69 ans | 57,3 | 62,6 | 53,9 | 62,7 | 54,4 | 50 | 37,5 | |
| | 70-74 ans | 51,3 | 48,1 | 53 | 46,2 | 51,8 | 75 | 63,6 | |
| | 50-74 ans | 59,6 | 59,4 | 59,7 | 59,4 | 59,9 | 60 | 53,8 | |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%) | 50-54 ans | 1,8 | 2,2 | 1,6 | 2,1 | 1,6 | 6,3 | 1 | |
| | 55-59 ans | 2 | 2,7 | 1,6 | 2,7 | 1,6 | 3,1 | 2,5 | |
| | 60-64 ans | 2 | 2,7 | 1,6 | 2,7 | 1,5 | 2,6 | 3,3 | |
| | 65-69 ans | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 2,6 | 2,9 | 2,2 | 1,2 | |
| | 70-74 ans | 2,2 | 2,7 | 1,9 | 2,8 | 1,8 | 2,2 | 1,9 | |
| | 50-74 ans | 2,1 | 2,6 | 1,8 | 2,6 | 1,8 | 2,6 | 1,9 | |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie | 50-54 ans | 99,1 | 100 | 98,6 | 100 | 98,5 | 100 | 100 | |
| | 55-59 ans | 99,2 | 98,1 | 100 | 98,1 | 100 | 100 | 100 | |
| | 60-64 ans | 98,4 | 96,9 | 100 | 98,4 | 100 | 0 | 100 | |
| | 65-69 ans | 98,5 | 96,1 | 100 | 95,9 | 100 | 100 | 100 | |
| | 70-74 ans | 97,5 | 97,1 | 97,7 | 96,7 | 96,9 | 100 | 100 | |
| | 50-74 ans | 98,6 | 97,6 | 99,4 | 97,9 | 99,3 | 90,9 | 100 | |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans | 86,7 | 82,2 | 89,7 | 83,7 | 89,6 | 50 | 100 | |
| | 55-59 ans | 87,2 | 84,6 | 89,2 | 84,3 | 88,7 | 100 | 100 | |
| | 60-64 ans | 87,2 | 82,3 | 92,1 | 82,3 | 91,7 | 0 | 100 | |
| | 65-69 ans | 88,8 | 85,7 | 90,6 | 87,2 | 90,4 | 50 | 100 | |
| | 70-74 ans | 87 | 88,2 | 86 | 89,7 | 83,9 | 80 | 91,7 | |
| | 50-74 ans | 87,5 | 84,3 | 89,8 | 84,9 | 89,4 | 70 | 95,2 | |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète | 50-54 ans | 73,5 | 73 | 73,8 | 75 | 75 | 0 | 0 | |
| | 55-59 ans | 79,4 | 81,8 | 77,6 | 81,4 | 78,2 | 100 | 66,7 | |
| | 60-64 ans | 75,2 | 82,4 | 69 | 82,4 | 67,3 | 0 | 100 | |
| | 65-69 ans | 69,7 | 71,4 | 68,8 | 70,7 | 70,7 | 100 | 0 | |
| | 70-74 ans | 59,7 | 53,3 | 64,9 | 53,8 | 65,4 | 50 | 63,6 | |
| | 50-74 ans | 72,3 | 74 | 71,1 | 74,6 | 72 | 57,1 | 60 | |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | 60-64 ans | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| | 65-69 ans | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| | 50-74 ans | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 108 | 126 | 97 | 127 | 96 | 74 | 132 | |
| | 55-59 ans | 94 | 96 | 92 | 97 | 94 | 64 | 71 | |
| | 60-64 ans | 106 | 110 | 102 | 110 | 103 | 0 | 95 | |
| | 65-69 ans | 132 | 142 | 127 | 143 | 127 | 85 | 122 | |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 972 - Martinique

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

| | | | | | | | | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | 70-74 ans | 164 | 149 | 176 | 154 | 210 | 102 | 96 |
| | 50-74 ans | 118 | 122 | 115 | 123 | 116 | 88 | 95 |
| C03- Pourcentage de perdus de vue | 50-54 ans | 1,8 | 4,4 | 0 | 4,7 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1,7 | 0 | 3,1 | 0 | 3,2 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 4,7 | 7,8 | 1,6 | 7,9 | 1,7 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 9,6 | 11,8 | 8,2 | 12,2 | 8,4 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 3,8 | 2,9 | 4,5 | 3,3 | 6,3 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 4,5 | 5,6 | 3,7 | 5,9 | 3,9 | 0 | 0 |
| D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 99 | 97,3 | 100 | 97,2 | 100 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 98 | 100 | 96,6 | 100 | 98,2 | 100 | 66,7 |
| | 60-64 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| | 65-69 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 70-74 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 50-74 ans | 99,4 | 99,5 | 99,3 | 99,5 | 99,6 | 100 | 95 |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 70,4 | 56,8 | 78,7 | 58,3 | 78,3 | 0 | 100 |
| | 55-59 ans | 69,6 | 59,1 | 77,6 | 60,5 | 80 | 0 | 33,3 |
| | 60-64 ans | 67 | 54,9 | 77,6 | 54,9 | 76,4 | 0 | 100 |
| | 65-69 ans | 68,9 | 61,9 | 72,7 | 61 | 72 | 100 | 100 |
| | 70-74 ans | 62,7 | 56,7 | 67,6 | 50 | 61,5 | 100 | 81,8 |
| | 50-74 ans | 68,1 | 57,8 | 75,3 | 57,4 | 74,9 | 71,4 | 80 |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm | 50-54 ans | 3,1 | 5,4 | 1,6 | 5,6 | 1,7 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2,9 | 6,8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0,9 | 0 | 1,7 | 0 | 1,8 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1,7 | 2,4 | 1,3 | 2,4 | 1,3 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1,5 | 0 | 2,7 | 0 | 3,8 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 2 | 2,9 | 1,4 | 3 | 1,5 | 0 | 0 |
| D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 2,3 | 0 | 2,3 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0,9 | 0 | 1,7 | 0 | 1,8 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0,8 | 0 | 1,3 | 0 | 1,3 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1,5 | 0 | 2,7 | 0 | 3,8 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0,8 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1,1 | 0 | 0 |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 13,3 | 21,6 | 8,2 | 19,4 | 8,3 | 100 | 0 |
| | 55-59 ans | 5,9 | 2,3 | 8,6 | 2,3 | 7,3 | 0 | 33,3 |
| | 60-64 ans | 8,3 | 11,8 | 5,2 | 11,8 | 5,5 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 10,9 | 11,9 | 10,4 | 12,2 | 10,7 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 11,9 | 16,7 | 8,1 | 19,2 | 7,7 | 0 | 9,1 |
| | 50-74 ans | 9,9 | 12,3 | 8,2 | 12,2 | 8,1 | 14,3 | 10 |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 5,1 | 8,1 | 3,3 | 8,3 | 3,3 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 12,7 | 18,2 | 8,6 | 18,6 | 9,1 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 7,3 | 11,8 | 3,4 | 11,8 | 3,6 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 11,8 | 14,3 | 10,4 | 14,6 | 10,7 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 7,5 | 10 | 5,4 | 11,5 | 3,8 | 0 | 9,1 |
| | 50-74 ans | 9,1 | 12,7 | 6,5 | 13,2 | 6,6 | 0 | 5 |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer | 50-54 ans | 5,1 | 5,4 | 4,9 | 5,6 | 5 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 3,9 | 9,1 | 0 | 7 | 0 | 100 | 0 |
| | 60-64 ans | 11 | 13,7 | 8,6 | 13,7 | 9,1 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 3,4 | 7,1 | 1,3 | 7,3 | 1,3 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 11,9 | 10 | 13,5 | 11,5 | 19,2 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 6,7 | 9,3 | 4,8 | 9,1 | 5,2 | 14,3 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 972 - Martinique

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

| | | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique) | 50-54 ans | 1 | 0 | 1,6 | 0 | 1,7 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0,2 | 0 | 0,3 | 0 | 0,4 | 0 | 0 |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 1 | 0 | 1,6 | 0 | 1,7 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 2,3 | 1,7 | 2,3 | 1,8 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 4,6 | 7,8 | 1,7 | 7,8 | 1,8 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,7 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 3 | 6,7 | 0 | 7,7 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 2,6 | 3,9 | 1,7 | 4,1 | 1,8 | 0 | 0 |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 1 | 2,7 | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 0 | 3,4 | 0 | 1,8 | 0 | 33,3 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0 | 5 |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 2,8 | 5,3 | 1,6 | 4,9 | 1,7 | 31,3 | 0 |
| | 55-59 ans | 3,2 | 4,5 | 2,5 | 4,6 | 2,3 | 0 | 8,3 |
| | 60-64 ans | 2,7 | 5 | 1,2 | 5,1 | 1,3 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 5,4 | 5,6 | 5,3 | 5,8 | 5,6 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 3,5 | 6,1 | 2,1 | 7,5 | 1,7 | 0 | 3,1 |
| | 50-74 ans | 3,4 | 5,3 | 2,4 | 5,4 | 2,4 | 2,4 | 2,7 |
| | 50-74 ans ** | 3,7 | 5,2 | 2,4 | . | . | . | . |
| D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 0,8 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2,2 | 4 | 1,3 | 4,1 | 1,3 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1,3 | 2,5 | 0,5 | 2,6 | 0,5 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 2,8 | 3 | 2,6 | 3,2 | 2,8 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1,4 | 2,3 | 0,8 | 2,8 | 0,6 | 0 | 1,6 |
| | 50-74 ans | 1,6 | 2,7 | 1,1 | 2,8 | 1,1 | 0 | 0,9 |
| | 50-74 ans ** | 1,8 | 2,7 | 1 | . | . | . | . |
| D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 0,8 | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0,7 | 2 | 0 | 1,5 | 0 | 31,3 | 0 |
| | 60-64 ans | 1,9 | 2,9 | 1,2 | 3 | 1,3 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0,8 | 1,5 | 0,3 | 1,6 | 0,3 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 2,8 | 2,9 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1,2 | 2 | 0,8 | 1,9 | 0,8 | 2,4 | 0 |
| | 50-74 ans ** | 1,3 | 1,9 | 0,8 | . | . | . | . |
| E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu | 50-54 ans | 80 | 50 | 100 | 50 | 100 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 75 | 75 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 45,5 | 50 | 40 | 50 | 40 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 25 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 75 | 66,7 | 80 | 66,7 | 80 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 59,4 | 50 | 71,4 | 52,9 | 71,4 | 0 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des