

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/13

Département : 33 - Gironde

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	25 105	11 857	13 248	7 340	8 172	4 517	5 076
	55-59 ans	20 614	9 154	11 460	2 057	2 393	7 097	9 067
	60-64 ans	22 968	10 231	12 737	2 028	2 300	8 203	10 437
	65-69 ans	21 747	9 802	11 945	1 603	1 834	8 199	10 111
	70-74 ans	15 645	7 102	8 543	841	1 089	6 261	7 454
	50-74 ans	106 079	48 146	57 933	13 869	15 788	34 277	42 145
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 433	684	749	432	485	252	264
	55-59 ans	1 189	552	637	167	164	385	473
	60-64 ans	1 339	586	753	139	180	447	573
	65-69 ans	1 209	522	687	116	156	406	531
	70-74 ans	1 030	427	603	69	100	358	503
	50-74 ans	6 200	2 771	3 429	923	1 085	1 848	2 344
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	913	431	482	250	286	181	196
	55-59 ans	798	360	438	85	87	275	351
	60-64 ans	954	430	524	81	103	349	421
	65-69 ans	813	340	473	56	84	284	389
	70-74 ans	691	290	401	34	52	256	349
	50-74 ans	4 169	1 851	2 318	506	612	1 345	1 706
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	520	253	267	182	199	71	68
	55-59 ans	391	192	199	82	77	110	122
	60-64 ans	385	156	229	58	77	98	152
	65-69 ans	396	182	214	60	72	122	142
	70-74 ans	339	137	202	35	48	102	154
	50-74 ans	2 031	920	1 111	417	473	503	638
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	24 585	11 604	12 981	7 158	7 973	4 446	5 008
	55-59 ans	20 223	8 962	11 261	1 975	2 316	6 987	8 945
	60-64 ans	22 583	10 075	12 508	1 970	2 223	8 105	10 285
	65-69 ans	21 351	9 620	11 731	1 543	1 762	8 077	9 969
	70-74 ans	15 306	6 965	8 341	806	1 041	6 159	7 300
	50-74 ans	104 048	47 226	56 822	13 452	15 315	33 774	41 507
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	319	189	130	113	93	76	37
	55-59 ans	294	166	128	48	30	118	98
	60-64 ans	365	183	182	45	47	138	135
	65-69 ans	357	177	180	39	31	138	149
	70-74 ans	264	140	124	22	17	118	107

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/13

Département : 33 - Gironde

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 599	855	744	267	218	588	526
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	312	186	126	112	90	74	36
	55-59 ans	284	160	124	46	28	114	96
	60-64 ans	351	177	174	41	46	136	128
	65-69 ans	339	170	169	37	30	133	139
	70-74 ans	253	134	119	21	16	113	103
	50-74 ans	1 539	827	712	257	210	570	502
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	280	167	113	101	78	66	35
	55-59 ans	252	136	116	37	27	99	89
	60-64 ans	321	164	157	35	38	129	119
	65-69 ans	308	158	150	35	25	123	125
	70-74 ans	225	115	110	17	16	98	94
	50-74 ans	1 386	740	646	225	184	515	462
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	238	142	96	85	64	57	32
	55-59 ans	222	121	101	33	21	88	80
	60-64 ans	276	143	133	28	32	115	101
	65-69 ans	273	145	128	34	16	111	112
	70-74 ans	198	108	90	17	14	91	76
	50-74 ans	1 207	659	548	197	147	462	401
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	3	2	1	0	1	2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6	3	3	0	2	3	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	278	167	111	101	76	66	35
	55-59 ans	251	135	116	37	27	98	89

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/13

Département : 33 - Gironde

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	317	163	154	35	37	128	117
	65-69 ans	304	158	146	35	24	123	122
	70-74 ans	219	113	106	17	15	96	91
	50-74 ans	1 369	736	633	225	179	511	454
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	4	1	3	0	1	1	2
	65-69 ans	4	0	4	0	1	0	3
	70-74 ans	6	2	4	0	1	2	3
	50-74 ans	17	4	13	0	5	4	8
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	279	166	113	101	78	65	35
	55-59 ans	250	135	115	37	26	98	89
	60-64 ans	319	163	156	35	37	128	119
	65-69 ans	305	158	147	35	24	123	123
	70-74 ans	220	113	107	17	16	96	91
	50-74 ans	1 373	735	638	225	181	510	457
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	280	167	113	101	78	66	35
	55-59 ans	252	136	116	37	27	99	89
	60-64 ans	321	164	157	35	38	129	119
	65-69 ans	309	158	151	35	25	123	126
	70-74 ans	225	115	110	17	16	98	94
	50-74 ans	1 387	740	647	225	184	515	463
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	168	91	77	52	51	39	26
	55-59 ans	126	64	62	13	13	51	49
	60-64 ans	152	70	82	16	18	54	64
	65-69 ans	124	54	70	12	11	42	59
	70-74 ans	104	37	67	6	8	31	59
	50-74 ans	674	316	358	99	101	217	257

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/13

Département : 33 - Gironde

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	15	8	7	6	3	2	4
	55-59 ans	15	11	4	4	0	7	4
	60-64 ans	13	7	6	1	0	6	6
	65-69 ans	11	6	5	1	2	5	3
	70-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
	50-74 ans	59	36	23	13	5	23	18
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	4	2	2	0	1	2	1
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	8	3	5	1	1	2	4
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	23	17	6	10	5	7	1
	55-59 ans	23	12	11	2	3	10	8
	60-64 ans	26	11	15	1	2	10	13
	65-69 ans	26	10	16	2	3	8	13
	70-74 ans	20	12	8	1	0	11	8
	50-74 ans	118	62	56	16	13	46	43
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	53	37	16	24	13	13	3
	55-59 ans	61	33	28	13	7	20	21
	60-64 ans	87	54	33	9	11	45	22
	65-69 ans	89	49	40	11	3	38	37
	70-74 ans	56	35	21	5	5	30	16
	50-74 ans	346	208	138	62	39	146	99
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	12	7	5	4	5	3	0
	55-59 ans	16	11	5	3	3	8	2
	60-64 ans	31	15	16	6	5	9	11
	65-69 ans	49	33	16	7	6	26	10
	70-74 ans	31	20	11	3	3	17	8
	50-74 ans	139	86	53	23	22	63	31

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/13

Département : 33 - Gironde

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	4	4	0	1	0	3	0
	50-74 ans	11	9	2	4	1	5	1
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	6	3	3	0	2	3	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	77	55	22	35	18	20	4
	55-59 ans	84	45	39	15	10	30	29
	60-64 ans	113	65	48	10	13	55	35
	65-69 ans	115	59	56	13	6	46	50
	70-74 ans	76	47	29	6	5	41	24
	50-74 ans	465	271	194	79	52	192	142
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	53	37	16	24	13	13	3
	55-59 ans	61	33	28	13	7	20	21
	60-64 ans	87	54	33	9	11	45	22
	65-69 ans	89	49	40	11	3	38	37
	70-74 ans	56	35	21	5	5	30	16
	50-74 ans	346	208	138	62	39	146	99

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/13

Département : 33 - Gironde

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	43	28	15	19	13	9	2
	55-59 ans	44	25	19	7	4	18	15
	60-64 ans	66	41	25	6	10	35	15
	65-69 ans	70	41	29	11	2	30	27
	70-74 ans	41	27	14	5	4	22	10
	50-74 ans	264	162	102	48	33	114	69
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	47	31	16	20	13	11	3
	55-59 ans	53	29	24	9	5	20	19
	60-64 ans	74	47	27	9	11	38	16
	65-69 ans	74	43	31	11	2	32	29
	70-74 ans	46	31	15	5	4	26	11
	50-74 ans	294	181	113	54	35	127	78
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	12	7	5	4	5	3	0
	55-59 ans	16	11	5	3	3	8	2
	60-64 ans	31	15	16	6	5	9	11
	65-69 ans	49	33	16	7	6	26	10
	70-74 ans	31	20	11	3	3	17	8
	50-74 ans	139	86	53	23	22	63	31
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	11	6	5	3	5	3	0
	55-59 ans	15	11	4	3	2	8	2
	60-64 ans	30	15	15	6	4	9	11
	65-69 ans	49	33	16	7	6	26	10
	70-74 ans	31	20	11	3	3	17	8
	50-74 ans	136	85	51	22	20	63	31
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	11	6	5	3	5	3	0
	55-59 ans	15	11	4	3	2	8	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/13

Département : 33 - Gironde

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	30	15	15	6	4	9	11
	65-69 ans	47	32	15	7	6	25	9
	70-74 ans	30	19	11	3	3	16	8
	50-74 ans	133	83	50	22	20	61	30
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	5	3	2	1	2	2	0
	55-59 ans	10	7	3	2	1	5	2
	60-64 ans	22	10	12	4	3	6	9
	65-69 ans	31	20	11	5	4	15	7
	70-74 ans	21	13	8	2	2	11	6
	50-74 ans	89	53	36	14	12	39	24
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	6	3	3	2	3	1	0
	55-59 ans	5	4	1	1	1	3	0
	60-64 ans	8	5	3	2	1	3	2
	65-69 ans	16	12	4	2	2	10	2
	70-74 ans	9	6	3	1	1	5	2
	50-74 ans	44	30	14	8	8	22	6
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	4	0	1	0	3	0
	60-64 ans	6	2	4	1	0	1	4
	65-69 ans	13	11	2	3	1	8	1
	70-74 ans	7	5	2	1	0	4	2
	50-74 ans	31	23	8	7	1	16	7
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	4	3	1	1	0	2	1
	60-64 ans	8	6	2	3	1	3	1
	65-69 ans	7	3	4	0	2	3	2
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	24	15	9	4	4	11	5
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	6	2	4	0	1	2	3
	65-69 ans	7	3	4	0	1	3	3
	70-74 ans	8	4	4	1	1	3	3
	50-74 ans	23	10	13	1	4	9	9
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/13

Département : 33 - Gironde

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	4	3	1	2	0	1	1
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	50-74 ans	11	5	6	2	3	3	3
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	11	6	5	3	5	3	0
	55-59 ans	15	11	4	3	2	8	2
	60-64 ans	30	15	15	6	4	9	11
	65-69 ans	46	31	15	7	6	24	9
	70-74 ans	30	19	11	3	3	16	8
	50-74 ans	132	82	50	22	20	60	30
A40- Perdus de vue	50-54 ans	10	7	3	5	3	2	0
	55-59 ans	6	6	0	5	0	1	0
	60-64 ans	9	2	7	1	5	1	2
	65-69 ans	7	2	5	0	2	2	3
	70-74 ans	8	6	2	3	0	3	2
	50-74 ans	40	23	17	14	10	9	7

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 33 - Gironde

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,7	5,8	5,7	5,9	5,9	5,6	5,2
	55-59 ans	5,8	6	5,6	8,1	6,9	5,4	5,2
	60-64 ans	5,8	5,7	5,9	6,9	7,8	5,4	5,5
	65-69 ans	5,6	5,3	5,8	7,2	8,5	5	5,3
	70-74 ans	6,6	6	7,1	8,2	9,2	5,7	6,7
	50-74 ans	5,8	5,8	5,9	6,7	6,9	5,4	5,6
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,1	2,1	2	2,5	2,4	1,6	1,3
	55-59 ans	1,9	2,1	1,7	4	3,2	1,5	1,3
	60-64 ans	1,7	1,5	1,8	2,9	3,3	1,2	1,5
	65-69 ans	1,8	1,9	1,8	3,7	3,9	1,5	1,4
	70-74 ans	2,2	1,9	2,4	4,2	4,4	1,6	2,1
	50-74 ans	1,9	1,9	1,9	3	3	1,5	1,5
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	63,7	63	64,4	57,9	59	71,8	74,2
	55-59 ans	67,1	65,2	68,8	50,9	53	71,4	74,2
	60-64 ans	71,2	73,4	69,6	58,3	57,2	78,1	73,5
	65-69 ans	67,2	65,1	68,9	48,3	53,8	70	73,3
	70-74 ans	67,1	67,9	66,5	49,3	52	71,5	69,4
	50-74 ans	67,2	66,8	67,6	54,8	56,4	72,8	72,8
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,3	1,6	1	1,6	1,2	1,7	0,7
	55-59 ans	1,5	1,9	1,1	2,4	1,3	1,7	1,1
	60-64 ans	1,6	1,8	1,5	2,3	2,1	1,7	1,3
	65-69 ans	1,7	1,8	1,5	2,5	1,8	1,7	1,5
	70-74 ans	1,7	2	1,5	2,7	1,6	1,9	1,5
	50-74 ans	1,5	1,8	1,3	2	1,4	1,7	1,3
50-74 ans **	1,5	1,8	1,3	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	97,8	98,4	96,9	99,1	96,8	97,4	97,3
	55-59 ans	96,6	96,4	96,9	95,8	93,3	96,6	98
	60-64 ans	96,2	96,7	95,6	91,1	97,9	98,6	94,8
	65-69 ans	95	96	93,9	94,9	96,8	96,4	93,3
	70-74 ans	95,8	95,7	96	95,5	94,1	95,8	96,3
	50-74 ans	96,2	96,7	95,7	96,3	96,3	96,9	95,4
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	89,7	89,8	89,7	90,2	86,7	89,2	97,2
	55-59 ans	88,7	85	93,5	80,4	96,4	86,8	92,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 33 - Gironde

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	91,5	92,7	90,2	85,4	82,6	94,9	93
	65-69 ans	90,9	92,9	88,8	94,6	83,3	92,5	89,9
	70-74 ans	88,9	85,8	92,4	81	100	86,7	91,3
	50-74 ans	90,1	89,5	90,7	87,5	87,6	90,4	92
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	85	85	85	84,2	82,1	86,4	91,4
	55-59 ans	88,1	89	87,1	89,2	77,8	88,9	89,9
	60-64 ans	86	87,2	84,7	80	84,2	89,1	84,9
	65-69 ans	88,6	91,8	85,3	97,1	64	90,2	89,6
	70-74 ans	88	93,9	81,8	100	87,5	92,9	80,9
	50-74 ans	87,1	89,1	84,8	87,6	79,9	89,7	86,8
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	89	92	85	104	92	73	70
	55-59 ans	81	81	80	81	93	81	77
	60-64 ans	85	95	75	83	90	99	70
	65-69 ans	82	85	80	102	119	80	72
	70-74 ans	76	67	85	70	81	66	86
	50-74 ans	83	85	81	94	94	81	75
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	58 (38-93)	58 (42-94)	58 (38-92)	60 (42-97)	60,5 (38-103)	55 (38-84)	53 (32-79)
	55-59 ans	58 (39-95)	57 (40,5-85,5)	59 (34-104)	55 (43-108)	55 (34-145)	59 (39-84)	59 (35-92)
	60-64 ans	57,5 (40-91)	63 (42-97)	55 (37-85)	65 (37-97)	64 (48-85)	61 (43-95)	50 (36-85)
	65-69 ans	57,5 (38-84)	58 (40-90)	56 (35-79)	73 (44-117)	75 (45-166)	56 (39-82)	55 (35-75)
	70-74 ans	54 (37-83)	52 (33-71)	58,5 (39-95)	41 (36-73)	53 (45-83)	52 (33-70)	59,5 (39-106)
	50-74 ans	57 (38-89)	57 (40-90)	57 (36,5-88)	60 (41-99)	61 (40-108)	56 (39-84)	55 (35-83,5)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	3,1	3,7	2,3	4,4	3,2	2,6	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 33 - Gironde

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	2	3,6	0	10,4	0	0,8	0
	60-64 ans	2,5	1,1	3,8	2,2	10,6	0,7	1,5
	65-69 ans	2	1,1	2,8	0	6,5	1,4	2
	70-74 ans	3	4,3	1,6	13,6	0	2,5	1,9
	50-74 ans	2,5	2,7	2,3	5,2	4,6	1,5	1,3
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,6	99,4	100	100	100	98,5	100
	55-59 ans	99,2	99,3	99,1	100	96,3	99	100
	60-64 ans	99,4	99,4	99,4	100	97,4	99,2	100
	65-69 ans	99	100	98	100	96	100	98,4
	70-74 ans	97,8	98,3	97,3	100	100	98	96,8
	50-74 ans	99,1	99,3	98,8	100	98,4	99	98,9
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	60	54,5	68,1	51,5	65,4	59,1	74,3
	55-59 ans	50	47,1	53,4	35,1	48,1	51,5	55,1
	60-64 ans	47,4	42,7	52,2	45,7	47,4	41,9	53,8
	65-69 ans	40,1	34,2	46,4	34,3	44	34,1	46,8
	70-74 ans	46,2	32,2	60,9	35,3	50	31,6	62,8
	50-74 ans	48,6	42,7	55,3	44	54,9	42,1	55,5
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,4	4,8	6,2	5,9	3,8	3	11,4
	55-59 ans	6	8,1	3,4	10,8	0	7,1	4,5
	60-64 ans	4	4,3	3,8	2,9	0	4,7	5
	65-69 ans	3,6	3,8	3,3	2,9	8	4,1	2,4
	70-74 ans	2,2	3,5	0,9	5,9	0	3,1	1,1
	50-74 ans	4,3	4,9	3,6	5,8	2,7	4,5	3,9
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,4	0,6	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0,4	0	0,9	0	0	0	1,1
	60-64 ans	1,2	1,2	1,3	0	2,6	1,6	0,8
	65-69 ans	0,6	0	1,3	0	0	0	1,6
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,6	0,4	0,8	0,4	0,5	0,4	0,9
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	8,2	10,2	5,3	9,9	6,4	10,6	2,9
	55-59 ans	9,1	8,8	9,5	5,4	11,1	10,1	9
	60-64 ans	8,1	6,7	9,6	2,9	5,3	7,8	10,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 33 - Gironde

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	8,4	6,3	10,6	5,7	12	6,5	10,3
	70-74 ans	8,9	10,4	7,3	5,9	0	11,2	8,5
	50-74 ans	8,5	8,4	8,7	7,1	7,1	8,9	9,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	18,9	22,2	14,2	23,8	16,7	19,7	8,6
	55-59 ans	24,2	24,3	24,1	35,1	25,9	20,2	23,6
	60-64 ans	27,1	32,9	21	25,7	28,9	34,9	18,5
	65-69 ans	28,8	31	26,5	31,4	12	30,9	29,4
	70-74 ans	24,9	30,4	19,1	29,4	31,3	30,6	17
	50-74 ans	24,9	28,1	21,3	27,6	21,2	28,3	21,4
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,3	4,2	4,4	4	6,4	4,5	0
	55-59 ans	6,3	8,1	4,3	8,1	11,1	8,1	2,2
	60-64 ans	9,7	9,1	10,2	17,1	13,2	7	9,2
	65-69 ans	15,9	20,9	10,6	20	24	21,1	7,9
	70-74 ans	13,8	17,4	10	17,6	18,8	17,3	8,5
	50-74 ans	10	11,6	8,2	10,2	12	12,2	6,7
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,1	1,2	0,9	2	1,3	0	0
	55-59 ans	0,4	0,7	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0,6	0,6	0,6	0	0	0,8	0,8
	65-69 ans	0,3	0,6	0	2,9	0	0	0
	70-74 ans	1,8	3,5	0	5,9	0	3,1	0
	50-74 ans	0,8	1,2	0,3	1,8	0,5	1	0,2
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,4	0,6	0	0	0	1,5	0
	55-59 ans	0,8	0,7	0,9	0	3,7	1	0
	60-64 ans	0,3	0	0,6	0	2,6	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 33 - Gironde

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0,9	0,9	0,9	0	0	1	1,1
	50-74 ans	0,4	0,4	0,5	0	1,1	0,6	0,2
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,1	4,7	1,7	4,9	2,3	4,5	0,8
	55-59 ans	4,2	5	3,5	7,6	4,3	4,3	3,2
	60-64 ans	5	6,5	3,8	5,1	5,8	6,8	3,4
	65-69 ans	5,4	6,1	4,8	8,4	3,4	5,7	5
	70-74 ans	5	6,7	3,5	7,4	4,8	6,7	3,3
	50-74 ans	4,5	5,7	3,4	5,9	3,4	5,7	3,4
	50-74 ans **	4,4	5,7	3,3	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,2	3,2	1,2	3,4	1,6	2,9	0,6
	55-59 ans	3	3,7	2,5	6,6	3	2,9	2,3
	60-64 ans	3,9	5,4	2,6	4,6	4,9	5,6	2,1
	65-69 ans	4,2	5,1	3,4	7,1	1,7	4,7	3,7
	70-74 ans	3,7	5	2,5	6,2	4,8	4,9	2,2
	50-74 ans	3,3	4,4	2,4	4,6	2,5	4,3	2,4
	50-74 ans **	3,3	4,3	2,4	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,7	2,4	1,2	2,7	1,6	2	0,4
	55-59 ans	2,2	2,8	1,7	3,5	1,7	2,6	1,7
	60-64 ans	2,9	4,1	2	3	4,5	4,3	1,5
	65-69 ans	3,3	4,3	2,5	7,1	1,1	3,7	2,7
	70-74 ans	2,7	3,9	1,7	6,2	3,8	3,6	1,4
	50-74 ans	2,5	3,4	1,8	3,6	2,2	3,4	1,7
	50-74 ans **	2,5	3,3	1,7	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,9	2,7	1,2	2,8	1,6	2,5	0,6
	55-59 ans	2,6	3,2	2,1	4,6	2,2	2,9	2,1
	60-64 ans	3,3	4,7	2,2	4,6	4,9	4,7	1,6
	65-69 ans	3,5	4,5	2,6	7,1	1,1	4	2,9
	70-74 ans	3	4,5	1,8	6,2	3,8	4,2	1,5
	50-74 ans	2,8	3,8	2	4	2,3	3,8	1,9
	50-74 ans **	2,8	3,7	1,9	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	0,6	0,4	0,6	0,6	0,7	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 33 - Gironde

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0,8	1,2	0,4	1,5	1,3	1,1	0,2
	60-64 ans	1,4	1,5	1,3	3	2,2	1,1	1,1
	65-69 ans	2,3	3,4	1,4	4,5	3,4	3,2	1
	70-74 ans	2	2,9	1,3	3,7	2,9	2,8	1,1
	50-74 ans	1,3	1,8	0,9	1,7	1,4	1,9	0,7
	50-74 ans **	1,3	1,7	0,9	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4,1	3	6,3	0	0	3,8	10
	70-74 ans	3,2	5	0	0	0	5,9	0
	50-74 ans	2,2	2,4	2	0	0	3,2	3,2

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)