

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

1/14

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	9 721	4 548	5 173	2 597	2 821	1 951	2 352
	55-59 ans	9 176	4 108	5 068	902	976	3 206	4 092
	60-64 ans	11 436	4 998	6 438	936	1 118	4 062	5 320
	65-69 ans	10 785	4 783	6 002	694	766	4 089	5 236
	70-74 ans	8 556	3 725	4 831	457	601	3 268	4 230
	50-74 ans	49 674	22 162	27 512	5 586	6 282	16 576	21 230
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	698	362	336	217	218	145	118
	55-59 ans	675	323	352	93	93	230	259
	60-64 ans	789	357	432	83	112	274	320
	65-69 ans	722	322	400	84	76	238	324
	70-74 ans	781	314	467	56	88	258	379
	50-74 ans	3 665	1 678	1 987	533	587	1 145	1 400
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	498	256	242	141	159	115	83
	55-59 ans	490	239	251	58	55	181	196
	60-64 ans	627	285	342	54	76	231	266
	65-69 ans	552	243	309	53	48	190	261
	70-74 ans	601	241	360	34	58	207	302
	50-74 ans	2 768	1 264	1 504	340	396	924	1 108
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	200	106	94	76	59	30	35
	55-59 ans	185	84	101	35	38	49	63
	60-64 ans	162	72	90	29	36	43	54
	65-69 ans	170	79	91	31	28	48	63
	70-74 ans	180	73	107	22	30	51	77
	50-74 ans	897	414	483	193	191	221	292
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	9 521	4 442	5 079	2 521	2 762	1 921	2 317
	55-59 ans	8 991	4 024	4 967	867	938	3 157	4 029
	60-64 ans	11 274	4 926	6 348	907	1 082	4 019	5 266
	65-69 ans	10 615	4 704	5 911	663	738	4 041	5 173
	70-74 ans	8 376	3 652	4 724	435	571	3 217	4 153
	50-74 ans	48 777	21 748	27 029	5 393	6 091	16 355	20 938
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	127	73	54	48	31	25	23
	55-59 ans	116	65	51	12	9	53	42
	60-64 ans	159	104	55	20	10	84	45
	65-69 ans	154	79	75	19	12	60	63

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/14

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	134	75	59	11	17	64	42
	50-74 ans	690	396	294	110	79	286	215
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	125	72	53	47	31	25	22
	55-59 ans	113	62	51	12	9	50	42
	60-64 ans	153	100	53	19	10	81	43
	65-69 ans	149	75	74	19	12	56	62
	70-74 ans	129	74	55	11	15	63	40
	50-74 ans	669	383	286	108	77	275	209
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	109	64	45	40	28	24	17
	55-59 ans	104	57	47	11	7	46	40
	60-64 ans	145	94	51	19	9	75	42
	65-69 ans	138	70	68	16	11	54	57
	70-74 ans	120	72	48	10	13	62	35
	50-74 ans	616	357	259	96	68	261	191
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	103	60	43	38	27	22	16
	55-59 ans	96	52	44	10	6	42	38
	60-64 ans	132	84	48	17	9	67	39
	65-69 ans	128	64	64	14	9	50	55
	70-74 ans	107	67	40	10	12	57	28
	50-74 ans	566	327	239	89	63	238	176
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	50-74 ans	6	5	1	2	0	3	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/14

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	108	63	45	39	28	24	17
	55-59 ans	104	57	47	11	7	46	40
	60-64 ans	142	92	50	19	9	73	41
	65-69 ans	134	67	67	15	10	52	57
	70-74 ans	115	70	45	10	13	60	32
	50-74 ans	603	349	254	94	67	255	187
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	4	3	1	1	1	2	0
	70-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
	50-74 ans	13	8	5	2	1	6	4
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	109	64	45	40	28	24	17
	55-59 ans	103	57	46	11	7	46	39
	60-64 ans	144	93	51	19	9	74	42
	65-69 ans	138	70	68	16	11	54	57
	70-74 ans	119	71	48	10	13	61	35
	50-74 ans	613	355	258	96	68	259	190
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	109	64	45	40	28	24	17
	55-59 ans	104	57	47	11	7	46	40
	60-64 ans	145	94	51	19	9	75	42
	65-69 ans	139	70	69	16	11	54	58
	70-74 ans	120	72	48	10	13	62	35
	50-74 ans	617	357	260	96	68	261	192
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	46	25	21	16	13	9	8
	55-59 ans	45	20	25	2	3	18	22

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/14

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	58	33	25	7	3	26	22
	65-69 ans	51	15	36	3	2	12	34
	70-74 ans	40	19	21	3	6	16	15
	50-74 ans	240	112	128	31	27	81	101
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	4	3	1	2	0	1	1
	55-59 ans	8	5	3	1	0	4	3
	60-64 ans	6	2	4	0	1	2	3
	65-69 ans	11	5	6	0	0	5	6
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	50-74 ans	31	15	16	3	2	12	14
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	14	9	5	6	3	3	2
	55-59 ans	15	8	7	2	1	6	6
	60-64 ans	24	18	6	4	0	14	6
	65-69 ans	20	13	7	0	2	13	5
	70-74 ans	17	11	6	4	1	7	5
	50-74 ans	90	59	31	16	7	43	24
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	21	15	6	9	4	6	2
	55-59 ans	25	19	6	4	1	15	5
	60-64 ans	30	25	5	4	1	21	4
	65-69 ans	29	19	10	8	4	11	6
	70-74 ans	38	27	11	2	3	25	8
	50-74 ans	143	105	38	27	13	78	25
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	13	6	7	3	6	3	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/14

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	5	3	2	2	1	1	1
	60-64 ans	19	13	6	3	1	10	5
	65-69 ans	24	16	8	5	2	11	6
	70-74 ans	16	11	5	1	2	10	3
	50-74 ans	77	49	28	14	12	35	16
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	5	1	4	0	1	1	3
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	11	3	8	0	2	3	6
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	5	4	1	3	1	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	6	3	3	1	2	2	1
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	6	3	3	0	0	3	3
	50-74 ans	20	11	9	4	4	7	5
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	35	24	11	15	7	9	4
	55-59 ans	40	27	13	6	2	21	11
	60-64 ans	54	43	11	8	1	35	10
	65-69 ans	49	32	17	8	6	24	11
	70-74 ans	55	38	17	6	4	32	13
	50-74 ans	233	164	69	43	20	121	49
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	21	15	6	9	4	6	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/14

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	25	19	6	4	1	15	5
	60-64 ans	30	25	5	4	1	21	4
	65-69 ans	29	19	10	8	4	11	6
	70-74 ans	38	27	11	2	3	25	8
	50-74 ans	143	105	38	27	13	78	25
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	18	15	3	9	2	6	1
	55-59 ans	19	16	3	4	1	12	2
	60-64 ans	26	22	4	4	1	18	3
	65-69 ans	25	16	9	7	3	9	6
	70-74 ans	28	18	10	2	3	16	7
	50-74 ans	116	87	29	26	10	61	19
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	18	15	3	9	2	6	1
	55-59 ans	20	17	3	4	1	13	2
	60-64 ans	28	24	4	4	1	20	3
	65-69 ans	26	16	10	7	3	9	7
	70-74 ans	32	22	10	2	3	20	7
	50-74 ans	124	94	30	26	10	68	20
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	13	6	7	3	6	3	1
	55-59 ans	5	3	2	2	1	1	1
	60-64 ans	20	13	7	3	1	10	6
	65-69 ans	24	16	8	5	2	11	6
	70-74 ans	16	11	5	1	2	10	3
	50-74 ans	78	49	29	14	12	35	17
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	12	5	7	2	6	3	1
	55-59 ans	4	2	2	1	1	1	1
	60-64 ans	17	11	6	3	1	8	5
	65-69 ans	22	16	6	5	1	11	5
	70-74 ans	15	10	5	1	2	9	3
	50-74 ans	70	44	26	12	11	32	15
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/14

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	3	2	1	0	1	2	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	6	5	1	0	1	5	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	12	5	7	2	6	3	1
	55-59 ans	4	2	2	1	1	1	1
	60-64 ans	15	9	6	3	1	6	5
	65-69 ans	19	14	5	5	0	9	5
	70-74 ans	14	9	5	1	2	8	3
	50-74 ans	64	39	25	12	10	27	15
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	10	4	6	2	5	2	1
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	12	7	5	2	1	5	4
	65-69 ans	19	14	5	5	0	9	5
	70-74 ans	13	8	5	1	2	7	3
	50-74 ans	57	34	23	10	9	24	14
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	7	5	2	2	1	3	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	4	4	0	1	0	3	0
	65-69 ans	10	6	4	0	0	6	4
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	18	11	7	1	1	10	6
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	6	3	3	1	0	2	3
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
	50-74 ans	17	11	6	4	1	7	5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/14

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	4	2	2	1	2	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	3	3	0	2	0	1	0
	70-74 ans	7	3	4	0	2	3	2
	50-74 ans	16	8	8	3	6	5	2
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	3	3	0	2	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6	4	2	2	1	2	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	12	5	7	2	6	3	1
	55-59 ans	4	2	2	1	1	1	1
	60-64 ans	17	11	6	3	1	8	5
	65-69 ans	22	16	6	5	1	11	5
	70-74 ans	15	10	5	1	2	9	3
	50-74 ans	70	44	26	12	11	32	15
A40- Perdus de vue	50-54 ans	14	7	7	6	2	1	5
	55-59 ans	7	4	3	1	2	3	1
	60-64 ans	3	2	1	0	1	2	0
	65-69 ans	8	3	5	1	1	2	4
	70-74 ans	6	0	6	0	2	0	4
	50-74 ans	38	16	22	8	8	8	14

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,2	8	6,5	8,4	7,7	7,4	5
	55-59 ans	7,4	7,9	6,9	10,3	9,5	7,2	6,3
	60-64 ans	6,9	7,1	6,7	8,9	10	6,7	6
	65-69 ans	6,7	6,7	6,7	12,1	9,9	5,8	6,2
	70-74 ans	9,1	8,4	9,7	12,3	14,6	7,9	9
	50-74 ans	7,4	7,6	7,2	9,5	9,3	6,9	6,6
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,1	2,3	1,8	2,9	2,1	1,5	1,5
	55-59 ans	2	2	2	3,9	3,9	1,5	1,5
	60-64 ans	1,4	1,4	1,4	3,1	3,2	1,1	1
	65-69 ans	1,6	1,7	1,5	4,5	3,7	1,2	1,2
	70-74 ans	2,1	2	2,2	4,8	5	1,6	1,8
	50-74 ans	1,8	1,9	1,8	3,5	3	1,3	1,4
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	71,3	70,7	72	65	72,9	79,3	70,3
	55-59 ans	72,6	74	71,3	62,4	59,1	78,7	75,7
	60-64 ans	79,5	79,8	79,2	65,1	67,9	84,3	83,1
	65-69 ans	76,5	75,5	77,3	63,1	63,2	79,8	80,6
	70-74 ans	77	76,8	77,1	60,7	65,9	80,2	79,7
	50-74 ans	75,5	75,3	75,7	63,8	67,5	80,7	79,1
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,3	1,6	1,1	1,9	1,1	1,3	1
	55-59 ans	1,3	1,6	1	1,4	1	1,7	1
	60-64 ans	1,4	2,1	0,9	2,2	0,9	2,1	0,9
	65-69 ans	1,5	1,7	1,3	2,9	1,6	1,5	1,2
	70-74 ans	1,6	2,1	1,2	2,5	3	2	1
	50-74 ans	1,4	1,8	1,1	2	1,3	1,7	1
50-74 ans **	1,4	1,8	1,1	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,4	98,6	98,1	97,9	100	100	95,7
	55-59 ans	97,4	95,4	100	100	100	94,3	100
	60-64 ans	96,2	96,2	96,4	95	100	96,4	95,6
	65-69 ans	96,8	94,9	98,7	100	100	93,3	98,4
	70-74 ans	96,3	98,7	93,2	100	88,2	98,4	95,2
	50-74 ans	97	96,7	97,3	98,2	97,5	96,2	97,2
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	87,2	88,9	84,9	85,1	90,3	96	77,3
	55-59 ans	92	91,9	92,2	91,7	77,8	92	95,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	94,8	94	96,2	100	90	92,6	97,7
	65-69 ans	92,6	93,3	91,9	84,2	91,7	96,4	91,9
	70-74 ans	93	97,3	87,3	90,9	86,7	98,4	87,5
	50-74 ans	92,1	93,2	90,6	88,9	88,3	94,9	91,4
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	94,5	93,8	95,6	95	96,4	91,7	94,1
	55-59 ans	92,3	91,2	93,6	90,9	85,7	91,3	95
	60-64 ans	91	89,4	94,1	89,5	100	89,3	92,9
	65-69 ans	92,8	91,4	94,1	87,5	81,8	92,6	96,5
	70-74 ans	89,2	93,1	83,3	100	92,3	91,9	80
	50-74 ans	91,9	91,6	92,3	92,7	92,6	91,2	92,1
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	0	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	1	1	1	0	1	1	1
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-1)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	79	82	74	91	88	67	51
	55-59 ans	81	74	90	64	170	76	75
	60-64 ans	90	97	76	137	56	87	80
	65-69 ans	74	70	78	79	66	67	81
	70-74 ans	86	81	93	54	97	86	92
	50-74 ans	82	82	82	91	90	79	79
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	61 (43-85)	64 (44,5-87,5)	52 (38-76)	64,5 (47-103)	59,5 (45-93,5)	62,5 (44,5-77)	43 (35-65)
	55-59 ans	58 (41,5-80)	58 (43-80)	58 (39-80)	62 (42-75)	67 (42-305)	58 (43-87)	55,5 (38,5-73,5)
	60-64 ans	63 (45-93)	63,5 (44-92)	61 (45-94)	64 (43-113)	58 (32-79)	63 (44-92)	61,5 (49-94)
	65-69 ans	56 (39-80)	54 (39-72)	56 (38,5-95,5)	54,5 (39-83)	49 (28-120)	54 (39-72)	62 (43-94)
	70-74 ans	58 (42,5-78,5)	59,5 (44,5-75,5)	54 (39,5-82,5)	54 (45-61)	49 (39-66)	61,5 (44-86)	62 (42-87)
	50-74 ans	60 (43-85)	61 (44-83)	57 (40-87)	60,5 (43-89,5)	53 (39-84,5)	61 (44-82)	59 (41-87)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	11	9,6	13	12,5	6,5	4	21,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	6	6,2	5,9	8,3	22,2	5,7	2,4
	60-64 ans	1,9	1,9	1,8	0	10	2,4	0
	65-69 ans	5,2	3,8	6,7	5,3	8,3	3,3	6,3
	70-74 ans	4,5	0	10,2	0	11,8	0	9,5
	50-74 ans	5,5	4	7,5	7,3	10,1	2,8	6,5
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99	100	97,9	100	100	100	97,5
	60-64 ans	99,3	98,9	100	100	100	98,7	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	99,2	98,6	100	100	100	98,4	100
	50-74 ans	99,5	99,4	99,6	100	100	99,2	99,5
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	42,2	39,1	46,7	40	46,4	37,5	47,1
	55-59 ans	43,3	35,1	53,2	18,2	42,9	39,1	55
	60-64 ans	40	35,1	49	36,8	33,3	34,7	52,4
	65-69 ans	36,7	21,4	52,2	18,8	18,2	22,2	58,6
	70-74 ans	33,3	26,4	43,8	30	46,2	25,8	42,9
	50-74 ans	38,9	31,4	49,2	32,3	39,7	31	52,6
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	3,7	4,7	2,2	5	0	4,2	5,9
	55-59 ans	7,7	8,8	6,4	9,1	0	8,7	7,5
	60-64 ans	4,1	2,1	7,8	0	11,1	2,7	7,1
	65-69 ans	7,9	7,1	8,7	0	0	9,3	10,3
	70-74 ans	1,7	0	4,2	0	7,7	0	2,9
	50-74 ans	5	4,2	6,2	3,1	2,9	4,6	7,3
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,9	1,6	0	2,5	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,2	0,3	0	1	0	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,8	14,1	11,1	15	10,7	12,5	11,8
	55-59 ans	14,4	14	14,9	18,2	14,3	13	15
	60-64 ans	16,6	19,1	11,8	21,1	0	18,7	14,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	14,4	18,6	10,1	0	18,2	24,1	8,6
	70-74 ans	14,2	15,3	12,5	40	7,7	11,3	14,3
	50-74 ans	14,6	16,5	11,9	16,7	10,3	16,5	12,5
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	19,3	23,4	13,3	22,5	14,3	25	11,8
	55-59 ans	24	33,3	12,8	36,4	14,3	32,6	12,5
	60-64 ans	20,7	26,6	9,8	21,1	11,1	28	9,5
	65-69 ans	20,9	27,1	14,5	50	36,4	20,4	10,3
	70-74 ans	31,7	37,5	22,9	20	23,1	40,3	22,9
	50-74 ans	23,2	29,4	14,6	28,1	19,1	29,9	13
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	11,9	9,4	15,6	7,5	21,4	12,5	5,9
	55-59 ans	4,8	5,3	4,3	18,2	14,3	2,2	2,5
	60-64 ans	13,1	13,8	11,8	15,8	11,1	13,3	11,9
	65-69 ans	17,3	22,9	11,6	31,3	18,2	20,4	10,3
	70-74 ans	13,3	15,3	10,4	10	15,4	16,1	8,6
	50-74 ans	12,5	13,7	10,8	14,6	17,6	13,4	8,3
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	4,6	1,6	8,9	0	3,6	4,2	17,6
	55-59 ans	2,9	1,8	4,3	0	14,3	2,2	2,5
	60-64 ans	0,7	0	2	0	0	0	2,4
	65-69 ans	1,4	1,4	1,4	0	0	1,9	1,7
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1,8	0,8	3,1	0	2,9	1,1	3,1
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4,6	6,3	2,2	7,5	3,6	4,2	0
	55-59 ans	1,9	1,8	2,1	0	0	2,2	2,5
	60-64 ans	4,1	3,2	5,9	5,3	22,2	2,7	2,4
	65-69 ans	0,7	0	1,4	0	9,1	0	0
	70-74 ans	5	4,2	6,3	0	0	4,8	8,6
	50-74 ans	3,2	3,1	3,5	4,2	5,9	2,7	2,6
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	2,1	0	0	0	2,5
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0,8	1,4	0	0	0	1,6	0
	50-74 ans	0,3	0,3	0,4	0	0	0,4	0,5
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,7	5,4	2,2	6	2,5	4,7	1,7
	55-59 ans	4,4	6,7	2,6	6,9	2,1	6,7	2,7
	60-64 ans	4,8	8,7	1,7	8,8	0,9	8,7	1,9
	65-69 ans	4,6	6,8	2,9	12,1	8,1	5,9	2,1
	70-74 ans	6,6	10,4	3,6	13,8	7	9,9	3,1
	50-74 ans	4,8	7,5	2,6	8	3,3	7,4	2,3
	50-74 ans **	4,8	7,3	2,5	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,2	3,4	1,2	3,6	1,4	3,1	0,9
	55-59 ans	2,8	4,7	1,2	4,6	1,1	4,8	1,2
	60-64 ans	2,7	5,1	0,8	4,4	0,9	5,2	0,8
	65-69 ans	2,7	4	1,7	12,1	5,4	2,7	1,2
	70-74 ans	4,5	7,4	2,3	4,6	5,3	7,8	1,9
	50-74 ans	2,9	4,8	1,4	5	2,1	4,8	1,2
	50-74 ans **	3	4,7	1,4	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,9	3,4	0,6	3,6	0,7	3,1	0,4
	55-59 ans	2,1	4	0,6	4,6	1,1	3,8	0,5
	60-64 ans	2,3	4,5	0,6	4,4	0,9	4,5	0,6
	65-69 ans	2,4	3,4	1,5	10,6	4,1	2,2	1,2
	70-74 ans	3,3	4,9	2,1	4,6	5,3	5	1,7
	50-74 ans	2,4	4	1,1	4,8	1,6	3,7	0,9
	50-74 ans **	2,4	4	1	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,9	3,4	0,6	3,6	0,7	3,1	0,4
	55-59 ans	2,2	4,2	0,6	4,6	1,1	4,1	0,5
	60-64 ans	2,5	4,9	0,6	4,4	0,9	5	0,6
	65-69 ans	2,4	3,4	1,7	10,6	4,1	2,2	1,4
	70-74 ans	3,8	6	2,1	4,6	5,3	6,2	1,7
	50-74 ans	2,5	4,3	1,1	4,8	1,6	4,2	1
	50-74 ans **	2,6	4,3	1	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,4	1,4	1,4	1,2	2,2	1,6	0,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0,6	0,7	0,4	2,3	1,1	0,3	0,2
	60-64 ans	1,8	2,6	1,1	3,3	0,9	2,5	1,1
	65-69 ans	2,3	3,4	1,4	7,5	2,7	2,7	1,2
	70-74 ans	1,9	3	1,1	2,3	3,5	3,1	0,7
	50-74 ans	1,6	2,3	1,1	2,6	2	2,1	0,8
	50-74 ans **	1,5	2	1	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	11,8	18,2	0	0	0	25	0
	65-69 ans	13,6	12,5	16,7	0	100	18,2	0
	70-74 ans	6,7	10	0	0	0	11,1	0
	50-74 ans	8,6	11,4	3,8	0	9,1	15,6	0

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)