

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/13

Département : 95 - Val d'Oise

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	17 509	8 131	9 378	4 906	5 540	3 225	3 838
	55-59 ans	15 194	6 588	8 606	1 536	1 889	5 052	6 717
	60-64 ans	14 497	6 501	7 996	1 255	1 645	5 246	6 351
	65-69 ans	12 035	5 521	6 514	988	1 087	4 533	5 427
	70-74 ans	7 630	3 390	4 240	540	729	2 850	3 511
	50-74 ans	66 865	30 131	36 734	9 225	10 890	20 906	25 844
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 411	690	721	464	479	226	242
	55-59 ans	1 262	555	707	181	202	374	505
	60-64 ans	1 178	520	658	156	193	364	465
	65-69 ans	889	395	494	119	127	276	367
	70-74 ans	658	308	350	86	84	222	266
	50-74 ans	5 398	2 468	2 930	1 006	1 085	1 462	1 845
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	768	381	387	224	228	157	159
	55-59 ans	776	343	433	88	93	255	340
	60-64 ans	784	352	432	85	99	267	333
	65-69 ans	562	249	313	48	52	201	261
	70-74 ans	408	198	210	44	40	154	170
	50-74 ans	3 298	1 523	1 775	489	512	1 034	1 263
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	643	309	334	240	251	69	83
	55-59 ans	486	212	274	93	109	119	165
	60-64 ans	394	168	226	71	94	97	132
	65-69 ans	327	146	181	71	75	75	106
	70-74 ans	250	110	140	42	44	68	96
	50-74 ans	2 100	945	1 155	517	573	428	582
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	16 866	7 822	9 044	4 666	5 289	3 156	3 755
	55-59 ans	14 708	6 376	8 332	1 443	1 780	4 933	6 552
	60-64 ans	14 103	6 333	7 770	1 184	1 551	5 149	6 219
	65-69 ans	11 708	5 375	6 333	917	1 012	4 458	5 321
	70-74 ans	7 380	3 280	4 100	498	685	2 782	3 415
	50-74 ans	64 765	29 186	35 579	8 708	10 317	20 478	25 262
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	347	175	172	112	102	63	70
	55-59 ans	322	148	174	35	41	113	133
	60-64 ans	361	181	180	40	47	141	133
	65-69 ans	288	155	133	29	25	126	108
	70-74 ans	207	92	115	19	23	73	92

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/13

Département : 95 - Val d'Oise

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 525	751	774	235	238	516	536
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	340	171	169	110	99	61	70
	55-59 ans	315	146	169	35	39	111	130
	60-64 ans	348	171	177	34	47	137	130
	65-69 ans	281	151	130	28	25	123	105
	70-74 ans	198	90	108	18	21	72	87
	50-74 ans	1 482	729	753	225	231	504	522
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	294	145	149	91	84	54	65
	55-59 ans	279	128	151	27	33	101	118
	60-64 ans	306	148	158	28	35	120	123
	65-69 ans	253	130	123	22	24	108	99
	70-74 ans	179	86	93	17	18	69	75
	50-74 ans	1 311	637	674	185	194	452	480
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	241	118	123	76	71	42	52
	55-59 ans	235	107	128	24	28	83	100
	60-64 ans	250	130	120	23	26	107	94
	65-69 ans	203	100	103	16	21	84	82
	70-74 ans	152	72	80	14	16	58	64
	50-74 ans	1 081	527	554	153	162	374	392
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	293	145	148	91	84	54	64
	55-59 ans	276	128	148	27	32	101	116

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/13

Département : 95 - Val d'Oise

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	302	146	156	28	35	118	121
	65-69 ans	252	129	123	22	24	107	99
	70-74 ans	179	86	93	17	18	69	75
	50-74 ans	1 302	634	668	185	193	449	475
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	3	0	3	0	1	0	2
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	9	3	6	0	1	3	5
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	4	3	1	0	0	3	1
	55-59 ans	5	1	4	1	1	0	3
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	5	4	1	0	0	4	1
	70-74 ans	4	1	3	0	1	1	2
	50-74 ans	20	11	9	2	2	9	7
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	282	137	145	88	82	49	63
	55-59 ans	272	126	146	26	31	100	115
	60-64 ans	301	146	155	28	35	118	120
	65-69 ans	249	126	123	22	24	104	99
	70-74 ans	177	85	92	17	17	68	75
	50-74 ans	1 281	620	661	181	189	439	472
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	298	148	150	91	84	57	66
	55-59 ans	284	129	155	28	34	101	121
	60-64 ans	308	150	158	29	35	121	123
	65-69 ans	258	134	124	22	24	112	100
	70-74 ans	183	87	96	17	19	70	77
	50-74 ans	1 331	648	683	187	196	461	487
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	180	70	110	43	63	27	47
	55-59 ans	139	48	91	10	19	38	72
	60-64 ans	160	67	93	12	20	55	73
	65-69 ans	123	52	71	10	12	42	59
	70-74 ans	83	41	42	11	11	30	31
	50-74 ans	685	278	407	86	125	192	282

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/13

Département : 95 - Val d'Oise

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	10	8	2	5	2	3	0
	55-59 ans	20	7	13	1	3	6	10
	60-64 ans	15	9	6	1	2	8	4
	65-69 ans	12	4	8	0	2	4	6
	70-74 ans	10	2	8	0	3	2	5
	50-74 ans	67	30	37	7	12	23	25
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	44	27	17	17	6	10	11
	55-59 ans	40	17	23	3	4	14	19
	60-64 ans	52	25	27	3	5	22	22
	65-69 ans	50	33	17	5	2	28	15
	70-74 ans	39	15	24	2	3	13	21
	50-74 ans	225	117	108	30	20	87	88
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	25	17	8	11	5	6	3
	55-59 ans	42	30	12	10	4	20	8
	60-64 ans	41	30	11	7	5	23	6
	65-69 ans	36	20	16	4	6	16	10
	70-74 ans	27	18	9	0	0	18	9
	50-74 ans	171	115	56	32	20	83	36
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	8	6	2	6	2	0	0
	55-59 ans	12	11	1	1	0	10	1
	60-64 ans	13	8	5	3	2	5	3
	65-69 ans	16	10	6	1	2	9	4
	70-74 ans	13	6	7	3	0	3	7
	50-74 ans	62	41	21	14	6	27	15

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/13

Département : 95 - Val d'Oise

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	4	2	2	2	1	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	7	3	4	2	2	1	2
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	7	4	3	2	2	2	1
	55-59 ans	11	6	5	1	1	5	4
	60-64 ans	11	5	6	2	0	3	6
	65-69 ans	9	7	2	2	0	5	2
	70-74 ans	5	1	4	0	1	1	3
	50-74 ans	43	23	20	7	4	16	16
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	12	8	4	3	2	5	2
	55-59 ans	6	2	4	1	1	1	3
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
	50-74 ans	27	16	11	5	4	11	7
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	70	44	26	28	12	16	14
	55-59 ans	84	48	36	13	9	35	27
	60-64 ans	94	55	39	10	10	45	29
	65-69 ans	87	54	33	10	8	44	25
	70-74 ans	66	33	33	2	3	31	30
	50-74 ans	401	234	167	63	42	171	125
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	25	17	8	11	5	6	3
	55-59 ans	42	30	12	10	4	20	8
	60-64 ans	41	30	11	7	5	23	6
	65-69 ans	36	20	16	4	6	16	10
	70-74 ans	27	18	9	0	0	18	9
	50-74 ans	171	115	56	32	20	83	36

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/13

Département : 95 - Val d'Oise

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	18	13	5	10	4	3	1
	55-59 ans	35	25	10	9	4	16	6
	60-64 ans	35	27	8	7	4	20	4
	65-69 ans	26	15	11	2	5	13	6
	70-74 ans	23	16	7	0	0	16	7
	50-74 ans	137	96	41	28	17	68	24
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	24	18	6	14	5	4	1
	55-59 ans	40	29	11	10	4	19	7
	60-64 ans	40	29	11	7	4	22	7
	65-69 ans	33	20	13	3	5	17	8
	70-74 ans	31	20	11	2	0	18	11
	50-74 ans	168	116	52	36	18	80	34
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	8	6	2	6	2	0	0
	55-59 ans	12	11	1	1	0	10	1
	60-64 ans	13	8	5	3	2	5	3
	65-69 ans	16	10	6	1	2	9	4
	70-74 ans	13	6	7	3	0	3	7
	50-74 ans	62	41	21	14	6	27	15
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	8	6	2	6	2	0	0
	55-59 ans	12	11	1	1	0	10	1
	60-64 ans	12	8	4	3	2	5	2
	65-69 ans	15	9	6	1	2	8	4
	70-74 ans	12	6	6	3	0	3	6
	50-74 ans	59	40	19	14	6	26	13
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	6	5	1	0	0	5	1
	60-64 ans	4	2	2	2	1	0	1
	65-69 ans	4	2	2	0	1	2	1
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	22	14	8	5	3	9	5
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	6	6	0	1	0	5	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/13

Département : 95 - Val d'Oise

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	8	6	2	1	1	5	1
	65-69 ans	11	7	4	1	1	6	3
	70-74 ans	8	4	4	3	0	1	4
	50-74 ans	37	26	11	9	3	17	8
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	6	6	0	1	0	5	0
	60-64 ans	5	4	1	1	1	3	0
	65-69 ans	8	6	2	1	0	5	2
	70-74 ans	8	4	4	3	0	1	4
	50-74 ans	30	22	8	8	2	14	6
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	7	4	3	1	1	3	2
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	4	3	1	1	1	2	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	50-74 ans	14	10	4	4	2	6	2
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	4	2	2	2	0	0	2
	50-74 ans	9	6	3	3	0	3	3
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

Département : 95 - Val d'Oise

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	7	5	2	5	2	0	0
	55-59 ans	10	9	1	1	0	8	1
	60-64 ans	11	7	4	2	2	5	2
	65-69 ans	11	6	5	1	1	5	4
	70-74 ans	10	5	5	3	0	2	5
	50-74 ans	49	32	17	12	5	20	12
A40- Perdus de vue	50-54 ans	30	18	12	16	9	2	3
	55-59 ans	22	12	10	6	5	6	5
	60-64 ans	26	16	10	5	7	11	3
	65-69 ans	13	9	4	3	1	6	3
	70-74 ans	6	2	4	1	1	1	3
	50-74 ans	97	57	40	31	23	26	17

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 95 - Val d'Oise

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,1	8,5	7,7	9,5	8,6	7	6,3
	55-59 ans	8,3	8,4	8,2	11,8	10,7	7,4	7,5
	60-64 ans	8,1	8	8,2	12,4	11,7	6,9	7,3
	65-69 ans	7,4	7,2	7,6	12	11,7	6,1	6,8
	70-74 ans	8,6	9,1	8,3	15,9	11,5	7,8	7,6
	50-74 ans	8,1	8,2	8	10,9	10	7	7,1
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3,7	3,8	3,6	4,9	4,5	2,1	2,2
	55-59 ans	3,2	3,2	3,2	6,1	5,8	2,4	2,5
	60-64 ans	2,7	2,6	2,8	5,7	5,7	1,8	2,1
	65-69 ans	2,7	2,6	2,8	7,2	6,9	1,7	2
	70-74 ans	3,3	3,2	3,3	7,8	6	2,4	2,7
	50-74 ans	3,1	3,1	3,1	5,6	5,3	2	2,3
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	54,4	55,2	53,7	48,3	47,6	69,5	65,7
	55-59 ans	61,5	61,8	61,2	48,6	46	68,2	67,3
	60-64 ans	66,6	67,7	65,7	54,5	51,3	73,4	71,6
	65-69 ans	63,2	63	63,4	40,3	40,9	72,8	71,1
	70-74 ans	62	64,3	60	51,2	47,6	69,4	63,9
	50-74 ans	61,1	61,7	60,6	48,6	47,2	70,7	68,5
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,1	2,2	1,9	2,4	1,9	2	1,9
	55-59 ans	2,2	2,3	2,1	2,4	2,3	2,3	2
	60-64 ans	2,6	2,9	2,3	3,4	3	2,7	2,1
	65-69 ans	2,5	2,9	2,1	3,2	2,5	2,8	2
	70-74 ans	2,8	2,8	2,8	3,8	3,4	2,6	2,7
	50-74 ans	2,4	2,6	2,2	2,7	2,3	2,5	2,1
50-74 ans **	2,4	2,6	2,2	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98	97,7	98,3	98,2	97,1	96,8	100
	55-59 ans	97,8	98,6	97,1	100	95,1	98,2	97,7
	60-64 ans	96,4	94,5	98,3	85	100	97,2	97,7
	65-69 ans	97,6	97,4	97,7	96,6	100	97,6	97,2
	70-74 ans	95,7	97,8	93,9	94,7	91,3	98,6	94,6
	50-74 ans	97,2	97,1	97,3	95,7	97,1	97,7	97,4
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	86,5	84,8	88,2	82,7	84,8	88,5	92,9
	55-59 ans	88,6	87,7	89,3	77,1	84,6	91	90,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 95 - Val d'Oise

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	87,9	86,5	89,3	82,4	74,5	87,6	94,6
	65-69 ans	90	86,1	94,6	78,6	96	87,8	94,3
	70-74 ans	90,4	95,6	86,1	94,4	85,7	95,8	86,2
	50-74 ans	88,5	87,4	89,5	82,2	84	89,7	92
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	82	81,4	82,6	83,5	84,5	77,8	80
	55-59 ans	84,2	83,6	84,8	88,9	84,8	82,2	84,7
	60-64 ans	81,7	87,8	75,9	82,1	74,3	89,2	76,4
	65-69 ans	80,2	76,9	83,7	72,7	87,5	77,8	82,8
	70-74 ans	84,9	83,7	86	82,4	88,9	84,1	85,3
	50-74 ans	82,5	82,7	82,2	82,7	83,5	82,7	81,7
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2	3	2	2	3	3	2
	55-59 ans	2	3	2	3	3	2	2
	60-64 ans	2	2	2	3	3	2	2
	65-69 ans	2	2	2	3	3	2	2
	70-74 ans	2	3	2	3	3	2	2
	50-74 ans	2	3	2	3	3	2	2
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)
	55-59 ans	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)
	60-64 ans	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)
	65-69 ans	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)
	70-74 ans	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)
	50-74 ans	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	79	77	82	83	82	67	82
	55-59 ans	78	77	80	59	99	82	74
	60-64 ans	74	71	76	91	81	67	75
	65-69 ans	81	72	91	66	116	73	85
	70-74 ans	84	94	75	124	74	87	75
	50-74 ans	79	77	81	82	88	75	78
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	60 (39-89)	60 (39-79)	58 (37-99)	64 (41-90)	55 (37-97)	50 (37-71)	63 (41-100)
	55-59 ans	56 (36,5-88)	57 (38-92)	56 (35-87)	54 (37-67)	56 (36-138)	60 (38-98)	56 (35-80)
	60-64 ans	55 (36-84)	52 (37-81)	56 (36-86)	62,5 (43,5-110,5)	70 (36-88)	52 (35-76)	54 (35-84)
	65-69 ans	52,5 (36,5-94,5)	51 (35,5-88,5)	54 (37,5-101)	48 (31-77)	69 (40,5-104)	52 (36-89)	52 (35-99,5)
	70-74 ans	58 (41-82)	59 (41-88)	57,5 (41-78)	77 (56-141)	55 (41-73)	52 (38,5-82)	57,5 (41,5-82)
	50-74 ans	56 (38-88)	56 (38-85)	57 (37-89)	61 (42-93)	58 (38-97)	53 (37-84)	56 (36-87)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 95 - Val d'Oise

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	8,6	10,3	7	14,3	8,8	3,2	4,3
	55-59 ans	6,8	8,1	5,7	17,1	12,2	5,3	3,8
	60-64 ans	7,2	8,8	5,6	12,5	14,9	7,8	2,3
	65-69 ans	4,5	5,8	3	10,3	4	4,8	2,8
	70-74 ans	2,9	2,2	3,5	5,3	4,3	1,4	3,3
	50-74 ans	6,4	7,6	5,2	13,2	9,7	5	3,2
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	95,9	94,5	97,3	96,7	97,6	90,7	96,9
	55-59 ans	97,5	98,4	96,7	96,3	93,9	99	97,5
	60-64 ans	98,4	98,6	98,1	100	100	98,3	97,6
	65-69 ans	98,4	96,9	100	100	100	96,3	100
	70-74 ans	98,9	98,8	98,9	100	94,4	98,6	100
	50-74 ans	97,7	97,3	98,1	97,8	97,4	97,1	98,3
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	60,4	47,3	73,3	47,3	75	47,4	71,2
	55-59 ans	48,9	37,2	58,7	35,7	55,9	37,6	59,5
	60-64 ans	51,9	44,7	58,9	41,4	57,1	45,5	59,3
	65-69 ans	47,7	38,8	57,3	45,5	50	37,5	59
	70-74 ans	45,4	47,1	43,8	64,7	57,9	42,9	40,3
	50-74 ans	51,5	42,9	59,6	46	63,8	41,6	57,9
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	3,4	5,4	1,3	5,5	2,4	5,3	0
	55-59 ans	7	5,4	8,4	3,6	8,8	5,9	8,3
	60-64 ans	4,9	6	3,8	3,4	5,7	6,6	3,3
	65-69 ans	4,7	3	6,5	0	8,3	3,6	6
	70-74 ans	5,5	2,3	8,3	0	15,8	2,9	6,5
	50-74 ans	5	4,6	5,4	3,7	6,1	5	5,1
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14,8	18,2	11,3	18,7	7,1	17,5	16,7
	55-59 ans	14,1	13,2	14,8	10,7	11,8	13,9	15,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 95 - Val d'Oise

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	16,9	16,7	17,1	10,3	14,3	18,2	17,9
	65-69 ans	19,4	24,6	13,7	22,7	8,3	25	15
	70-74 ans	21,3	17,2	25	11,8	15,8	18,6	27,3
	50-74 ans	16,9	18,1	15,8	16	10,2	18,9	18,1
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	8,4	11,5	5,3	12,1	6	10,5	4,5
	55-59 ans	14,8	23,3	7,7	35,7	11,8	19,8	6,6
	60-64 ans	13,3	20	7	24,1	14,3	19	4,9
	65-69 ans	14	14,9	12,9	18,2	25	14,3	10
	70-74 ans	14,8	20,7	9,4	0	0	25,7	11,7
	50-74 ans	12,8	17,7	8,2	17,1	10,2	18	7,4
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,7	4,1	1,3	6,6	2,4	0	0
	55-59 ans	4,2	8,5	0,6	3,6	0	9,9	0,8
	60-64 ans	4,2	5,3	3,2	10,3	5,7	4,1	2,4
	65-69 ans	6,2	7,5	4,8	4,5	8,3	8	4
	70-74 ans	7,1	6,9	7,3	17,6	0	4,3	9,1
	50-74 ans	4,7	6,3	3,1	7,5	3,1	5,9	3,1
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,3	1,4	1,3	2,2	1,2	0	1,5
	55-59 ans	0,4	0	0,6	0	2,9	0	0
	60-64 ans	0,3	0	0,6	0	0	0	0,8
	65-69 ans	0,4	0,7	0	0	0	0,9	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,5	0,5	0,6	1,1	1	0,2	0,4
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,3	2,7	2	2,2	2,4	3,5	1,5
	55-59 ans	3,9	4,7	3,2	3,6	2,9	5	3,3
	60-64 ans	3,6	3,3	3,8	6,9	0	2,5	4,9
	65-69 ans	3,5	5,2	1,6	9,1	0	4,5	2
	70-74 ans	2,7	1,1	4,2	0	5,3	1,4	3,9
	50-74 ans	3,2	3,5	2,9	3,7	2	3,5	3,3
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	4	5,4	2,7	3,3	2,4	8,8	3
	55-59 ans	2,1	1,6	2,6	3,6	2,9	1	2,5
	60-64 ans	1	0,7	1,3	0	0	0,8	1,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 95 - Val d'Oise

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1,2	2,2	0	0	0	2,7	0
	70-74 ans	1,6	2,3	1	5,9	5,3	1,4	0
	50-74 ans	2	2,5	1,6	2,7	2	2,4	1,4
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,2	5,6	2,9	6	2,3	5,1	3,7
	55-59 ans	5,7	7,5	4,3	9	5,1	7,1	4,1
	60-64 ans	6,7	8,7	5	8,4	6,4	8,7	4,7
	65-69 ans	7,4	10	5,2	10,9	7,9	9,9	4,7
	70-74 ans	8,9	10,1	8	4	4,4	11,1	8,8
	50-74 ans	6,2	8	4,7	7,2	4,1	8,4	4,9
	50-74 ans **	6,3	8	4,8	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,5	2,2	0,9	2,4	0,9	1,9	0,8
	55-59 ans	2,9	4,7	1,4	6,9	2,2	4,1	1,2
	60-64 ans	2,9	4,7	1,4	5,9	3,2	4,5	1
	65-69 ans	3,1	3,7	2,5	4,4	5,9	3,6	1,9
	70-74 ans	3,7	5,5	2,2	0	0	6,5	2,6
	50-74 ans	2,6	3,9	1,6	3,7	1,9	4,1	1,4
	50-74 ans **	2,8	4	1,6	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,1	1,7	0,6	2,1	0,8	1	0,3
	55-59 ans	2,4	3,9	1,2	6,2	2,2	3,2	0,9
	60-64 ans	2,5	4,3	1	5,9	2,6	3,9	0,6
	65-69 ans	2,2	2,8	1,7	2,2	4,9	2,9	1,1
	70-74 ans	3,1	4,9	1,7	0	0	5,8	2
	50-74 ans	2,1	3,3	1,2	3,2	1,6	3,3	1
	50-74 ans **	2,2	3,4	1,2	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,4	2,3	0,7	3	0,9	1,3	0,3
	55-59 ans	2,7	4,5	1,3	6,9	2,2	3,9	1,1
	60-64 ans	2,8	4,6	1,4	5,9	2,6	4,3	1,1
	65-69 ans	2,8	3,7	2,1	3,3	4,9	3,8	1,5
	70-74 ans	4,2	6,1	2,7	4	0	6,5	3,2
	50-74 ans	2,6	4	1,5	4,1	1,7	3,9	1,3
	50-74 ans **	2,7	4,1	1,5	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 95 - Val d'Oise

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	0,8	0,2	1,3	0,4	0	0
	55-59 ans	0,8	1,7	0,1	0,7	0	2	0,2
	60-64 ans	0,9	1,3	0,6	2,5	1,3	1	0,5
	65-69 ans	1,4	1,9	0,9	1,1	2	2	0,8
	70-74 ans	1,8	1,8	1,7	6	0	1,1	2
	50-74 ans	1	1,4	0,6	1,6	0,6	1,3	0,6
	50-74 ans **	1	1,4	0,6	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	50	50	50	50	50	0	0
	55-59 ans	50	45,5	100	0	0	50	100
	60-64 ans	33,3	25	50	66,7	50	0	50
	65-69 ans	26,7	22,2	33,3	0	50	25	25
	70-74 ans	33,3	33,3	33,3	0	0	66,7	33,3
	50-74 ans	37,3	35	42,1	35,7	50	34,6	38,5

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)