

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région : 44 - Région: ALSACE\_CHAMPAGNE\_ARDENNE\_LORRAINE

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 4-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A30- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome	50-54 ans	55	35	20	27	11	8	9
	55-59 ans	90	59	31	16	2	43	29
	60-64 ans	162	98	64	22	17	76	47
	65-69 ans	150	101	49	16	11	85	38
	70-74 ans	177	111	66	15	9	96	57
	<b>50-74 ans</b>	<b>634</b>	<b>404</b>	<b>230</b>	<b>96</b>	<b>50</b>	<b>308</b>	<b>180</b>
A31- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade inconnu	50-54 ans	11	6	5	4	2	2	3
	55-59 ans	9	4	5	3	1	1	4
	60-64 ans	18	15	3	4	1	11	2
	65-69 ans	28	20	8	5	2	15	6
	70-74 ans	29	19	10	4	0	15	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>95</b>	<b>64</b>	<b>31</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>44</b>	<b>25</b>
A32- Nombre de personnes ayant un adénocarcinome de stade TNM connu (stade inconnus exclus)	50-54 ans	44	29	15	23	9	6	6
	55-59 ans	81	55	26	13	1	42	25
	60-64 ans	144	83	61	18	16	65	45
	65-69 ans	122	81	41	11	9	70	32
	70-74 ans	148	92	56	11	9	81	47
	<b>50-74 ans</b>	<b>539</b>	<b>340</b>	<b>199</b>	<b>76</b>	<b>44</b>	<b>264</b>	<b>155</b>
A33- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome invasif	50-54 ans	25	17	8	12	5	5	3
	55-59 ans	57	36	21	10	1	26	20
	60-64 ans	109	59	50	16	16	43	34
	65-69 ans	92	63	29	8	7	55	22
	70-74 ans	111	66	45	6	6	60	39
	<b>50-74 ans</b>	<b>394</b>	<b>241</b>	<b>153</b>	<b>52</b>	<b>35</b>	<b>189</b>	<b>118</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	19	12	7	11	4	1	3
	55-59 ans	24	19	5	3	0	16	5
	60-64 ans	35	24	11	2	0	22	11
	65-69 ans	30	18	12	3	2	15	10
	70-74 ans	37	26	11	5	3	21	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>145</b>	<b>99</b>	<b>46</b>	<b>24</b>	<b>9</b>	<b>75</b>	<b>37</b>
A35- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 1	50-54 ans	15	10	5	6	2	4	3
	55-59 ans	23	16	7	2	0	14	7
	60-64 ans	42	30	12	5	5	25	7

Tableau 4-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	41	29	12	2	4	27	8
	70-74 ans	32	20	12	1	2	19	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>153</b>	<b>105</b>	<b>48</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>89</b>	<b>35</b>
A36- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 2	50-54 ans	6	4	2	4	2	0	0
	55-59 ans	11	6	5	3	0	3	5
	60-64 ans	34	14	20	6	6	8	14
	65-69 ans	16	13	3	3	1	10	2
	70-74 ans	28	16	12	1	2	15	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>95</b>	<b>53</b>	<b>42</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>36</b>	<b>31</b>
A37- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 3	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	17	9	8	3	0	6	8
	60-64 ans	19	11	8	2	1	9	7
	65-69 ans	24	15	9	3	0	12	9
	70-74 ans	34	19	15	3	1	16	14
	<b>50-74 ans</b>	<b>97</b>	<b>56</b>	<b>41</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>44</b>	<b>38</b>
A38- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	6	5	1	2	1	3	0
	60-64 ans	14	4	10	3	4	1	6
	65-69 ans	11	6	5	0	2	6	3
	70-74 ans	17	11	6	1	1	10	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>49</b>	<b>27</b>	<b>22</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>14</b>

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 4-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome du côlon de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	20	17,1	25	14,8	18,2	25	33,3
	55-59 ans	10	6,8	16,1	18,8	50	2,3	13,8
	60-64 ans	11,1	15,3	4,7	18,2	5,9	14,5	4,3
	65-69 ans	18,7	19,8	16,3	31,3	18,2	17,6	15,8
	70-74 ans	16,4	17,1	15,2	26,7	0	15,6	17,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>15,8</b>	<b>13,5</b>	<b>20,8</b>	<b>12</b>	<b>14,3</b>	<b>13,9</b>
E02- Pourcentage de personnes présentant un carcinome in situ du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	43,2	41,4	46,7	47,8	44,4	16,7	50
	55-59 ans	29,6	34,5	19,2	23,1	0	38,1	20
	60-64 ans	24,3	28,9	18	11,1	0	33,8	24,4
	65-69 ans	24,6	22,2	29,3	27,3	22,2	21,4	31,3
	70-74 ans	25	28,3	19,6	45,5	33,3	25,9	17
	<b>50-74 ans</b>	<b>26,9</b>	<b>29,1</b>	<b>23,1</b>	<b>31,6</b>	<b>20,5</b>	<b>28,4</b>	<b>23,9</b>
E03- Pourcentage de personnes présentant un cancer invasif du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	56,8	58,6	53,3	52,2	55,6	83,3	50
	55-59 ans	70,4	65,5	80,8	76,9	100	61,9	80
	60-64 ans	75,7	71,1	82	88,9	100	66,2	75,6
	65-69 ans	75,4	77,8	70,7	72,7	77,8	78,6	68,8
	70-74 ans	75	71,7	80,4	54,5	66,7	74,1	83
	<b>50-74 ans</b>	<b>73,1</b>	<b>70,9</b>	<b>76,9</b>	<b>68,4</b>	<b>79,5</b>	<b>71,6</b>	<b>76,1</b>
E04- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 1 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	60	58,8	62,5	50	40	80	100
	55-59 ans	40,4	44,4	33,3	20	0	53,8	35
	60-64 ans	38,5	50,8	24	31,3	31,3	58,1	20,6
	65-69 ans	44,6	46	41,4	25	57,1	49,1	36,4
	70-74 ans	28,8	30,3	26,7	16,7	33,3	31,7	25,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>38,8</b>	<b>43,6</b>	<b>31,4</b>	<b>30,8</b>	<b>37,1</b>	<b>47,1</b>	<b>29,7</b>
E05- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 2 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	24	23,5	25	33,3	40	0	0
	55-59 ans	19,3	16,7	23,8	30	0	11,5	25
	60-64 ans	31,2	23,7	40	37,5	37,5	18,6	41,2

Tableau 4-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	17,4	20,6	10,3	37,5	14,3	18,2	9,1
	70-74 ans	25,2	24,2	26,7	16,7	33,3	25	25,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>24,1</b>	<b>22</b>	<b>27,5</b>	<b>32,7</b>	<b>31,4</b>	<b>19</b>	<b>26,3</b>
E06- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 3 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	12	11,8	12,5	8,3	20	20	0
	55-59 ans	29,8	25	38,1	30	0	23,1	40
	60-64 ans	17,4	18,6	16	12,5	6,3	20,9	20,6
	65-69 ans	26,1	23,8	31	37,5	0	21,8	40,9
	70-74 ans	30,6	28,8	33,3	50	16,7	26,7	35,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>24,6</b>	<b>23,2</b>	<b>26,8</b>	<b>23,1</b>	<b>8,6</b>	<b>23,3</b>	<b>32,2</b>
E07- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 4 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	4	5,9	0	8,3	0	0	0
	55-59 ans	10,5	13,9	4,8	20	100	11,5	0
	60-64 ans	12,8	6,8	20	18,8	25	2,3	17,6
	65-69 ans	12	9,5	17,2	0	28,6	10,9	13,6
	70-74 ans	15,3	16,7	13,3	16,7	16,7	16,7	12,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>12,4</b>	<b>11,2</b>	<b>14,4</b>	<b>13,5</b>	<b>22,9</b>	<b>10,6</b>	<b>11,9</b>

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\* A l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire