

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013
Code région: 27 - Région: BOURGONE_FRANCHE_COMTE
Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	57 068	25 751	31 317	14 700	17 191	11 051	14 126
	55-59 ans	60 103	26 665	33 438	4 089	4 499	22 576	28 939
	60-64 ans	70 817	32 081	38 736	4 437	4 427	27 644	34 309
	65-69 ans	57 524	26 356	31 168	2 955	2 857	23 401	28 311
	70-74 ans	43 493	19 609	23 884	1 786	1 858	17 823	22 026
	50-74 ans	289 005	130 462	158 543	27 967	30 832	102 495	127 711
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	2 667	1 242	1 425	815	852	427	573
	55-59 ans	2 911	1 274	1 637	331	368	943	1 269
	60-64 ans	3 242	1 454	1 788	341	312	1 113	1 476
	65-69 ans	2 847	1 277	1 570	224	220	1 053	1 350
	70-74 ans	2 463	1 082	1 381	170	182	912	1 199
	50-74 ans	14 130	6 329	7 801	1 881	1 934	4 448	5 867
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1 972	907	1 065	565	599	342	466
	55-59 ans	2 251	997	1 254	225	248	772	1 006
	60-64 ans	2 540	1 126	1 414	219	221	907	1 193
	65-69 ans	2 240	1 007	1 233	159	140	848	1 093
	70-74 ans	1 953	873	1 080	122	127	751	953
	50-74 ans	10 956	4 910	6 046	1 290	1 335	3 620	4 711
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	695	335	360	250	253	85	107
	55-59 ans	660	277	383	106	120	171	263
	60-64 ans	702	328	374	122	91	206	283
	65-69 ans	607	270	337	65	80	205	257
	70-74 ans	510	209	301	48	55	161	246
	50-74 ans	3 174	1 419	1 755	591	599	828	1 156
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	56 373	25 416	30 957	14 450	16 938	10 966	14 019
	55-59 ans	59 443	26 388	33 055	3 983	4 379	22 405	28 676
	60-64 ans	70 115	31 753	38 362	4 315	4 336	27 438	34 026
	65-69 ans	56 917	26 086	30 831	2 890	2 777	23 196	28 054
	70-74 ans	42 983	19 400	23 583	1 738	1 803	17 662	21 780
	50-74 ans	285 831	129 043	156 788	27 376	30 233	101 667	126 555
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	1 180	612	568	350	334	262	234
	55-59 ans	1 341	733	608	148	88	585	520
	60-64 ans	1 718	907	811	157	102	750	709

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 27 - Région: BOURGONE_FRANCHE_COMTE

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

	65-69 ans	1 453	736	717	99	84	637	633
	70-74 ans	1 249	639	610	90	56	549	554
	50-74 ans	6 941	3 627	3 314	844	664	2 783	2 650
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	1 172	611	561	350	331	261	230
	55-59 ans	1 329	728	601	147	87	581	514
	60-64 ans	1 700	899	801	156	100	743	701
	65-69 ans	1 430	723	707	99	83	624	624
	70-74 ans	1 222	624	598	90	53	534	545
	50-74 ans	6 853	3 585	3 268	842	654	2 743	2 614
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	975	505	470	278	267	227	203
	55-59 ans	1 135	626	509	117	59	509	450
	60-64 ans	1 470	767	703	113	83	654	620
	65-69 ans	1 238	621	617	81	68	540	549
	70-74 ans	1 056	529	527	72	42	457	485
	50-74 ans	5 874	3 048	2 826	661	519	2 387	2 307
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	903	467	436	263	247	204	189
	55-59 ans	1 049	575	474	102	52	473	422
	60-64 ans	1 343	702	641	93	72	609	569
	65-69 ans	1 106	558	548	71	54	487	494
	70-74 ans	936	479	457	59	31	420	426
	50-74 ans	5 337	2 781	2 556	588	456	2 193	2 100
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	967	500	467	275	265	225	202
	55-59 ans	1 129	624	505	117	59	507	446
	60-64 ans	1 459	764	695	112	82	652	613
	65-69 ans	1 224	615	609	81	66	534	543

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 27 - Région: BOURGONE_FRANCHE_COMTE

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

	70-74 ans	1 044	526	518	70	42	456	476
	50-74 ans	5 823	3 029	2 794	655	514	2 374	2 280
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	8	5	3	3	2	2	1
	55-59 ans	6	2	4	0	0	2	4
	60-64 ans	11	3	8	1	1	2	7
	65-69 ans	14	6	8	0	2	6	6
	70-74 ans	12	3	9	2	0	1	9
	50-74 ans	51	19	32	6	5	13	27
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	6	2	4	2	1	0	3
	55-59 ans	3	0	3	0	1	0	2
	60-64 ans	4	3	1	1	0	2	1
	65-69 ans	5	4	1	0	0	4	1
	70-74 ans	10	4	6	1	2	3	4
	50-74 ans	28	13	15	4	4	9	11

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 27 - Région: BOURGONE_FRANCHE_COMTE

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,7	4,8	4,6	5,5	5,0	3,9	4,1
	55-59 ans	4,8	4,8	4,9	8,1	8,2	4,2	4,4
	60-64 ans	4,6	4,5	4,6	7,7	7,0	4,0	4,3
	65-69 ans	4,9	4,8	5,0	7,6	7,7	4,5	4,8
	70-74 ans	5,7	5,5	5,8	9,5	9,8	5,1	5,4
	50-74 ans	4,9	4,9	4,9	6,7	6,3	4,3	4,6
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,2	1,3	1,1	1,7	1,5	0,8	0,8
	55-59 ans	1,1	1,0	1,1	2,6	2,7	0,8	0,9
	60-64 ans	1,0	1,0	1,0	2,7	2,1	0,7	0,8
	65-69 ans	1,1	1,0	1,1	2,2	2,8	0,9	0,9
	70-74 ans	1,2	1,1	1,3	2,7	3,0	0,9	1,1
	50-74 ans	1,1	1,1	1,1	2,1	1,9	0,8	0,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	73,9	73,0	74,7	69,3	70,3	80,1	81,3
	55-59 ans	77,3	78,3	76,6	68,0	67,4	81,9	79,3
	60-64 ans	78,3	77,4	79,1	64,2	70,8	81,5	80,8
	65-69 ans	78,7	78,9	78,5	71,0	63,6	80,5	81,0
	70-74 ans	79,3	80,7	78,2	71,8	69,8	82,3	79,5
	50-74 ans	77,5	77,6	77,5	68,6	69,0	81,4	80,3
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,1	2,4	1,8	2,4	2,0	2,4	1,7
	55-59 ans	2,3	2,8	1,8	3,7	2,0	2,6	1,8
	60-64 ans	2,5	2,9	2,1	3,6	2,4	2,7	2,1
	65-69 ans	2,6	2,8	2,3	3,4	3,0	2,7	2,3
	70-74 ans	2,9	3,3	2,6	5,2	3,1	3,1	2,5
	50-74 ans	2,4	2,8	2,1	3,1	2,2	2,7	2,1
50-74 ans **	2,4	2,8	2,1	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,3	99,8	98,8	100,0	99,1	99,6	98,3
	55-59 ans	99,1	99,3	98,8	99,3	98,9	99,3	98,8
	60-64 ans	99,0	99,1	98,8	99,4	98,0	99,1	98,9
	65-69 ans	98,4	98,2	98,6	100,0	98,8	98,0	98,6
	70-74 ans	97,8	97,7	98,0	100,0	94,6	97,3	98,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 27 - Région: BOURGONE_FRANCHE_COMTE

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

	50-74 ans	98,7	98,8	98,6	99,8	98,5	98,6	98,6
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)								
	50-54 ans	83,2	82,7	83,8	79,4	80,7	87,0	88,3
	55-59 ans	85,4	86,0	84,7	79,6	67,8	87,6	87,5
	60-64 ans	86,5	85,3	87,8	72,4	83,0	88,0	88,4
	65-69 ans	86,6	85,9	87,3	81,8	81,9	86,5	88,0
	70-74 ans	86,4	84,8	88,1	80,0	79,2	85,6	89,0
	50-74 ans	85,7	85,0	86,5	78,5	79,4	87,0	88,3
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète								
	50-54 ans	92,6	92,5	92,8	94,6	92,5	89,9	93,1
	55-59 ans	92,4	91,9	93,1	87,2	88,1	92,9	93,8
	60-64 ans	91,4	91,5	91,2	82,3	86,7	93,1	91,8
	65-69 ans	89,3	89,9	88,8	87,7	79,4	90,2	90,0
	70-74 ans	88,6	90,5	86,7	81,9	73,8	91,9	87,8
	50-74 ans	90,9	91,2	90,4	89,0	87,9	91,9	91,0

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)