

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	947	488	459	288	281	200	178
	55-59 ans	915	450	465	95	85	355	380
	60-64 ans	1 160	610	550	118	89	492	461
	65-69 ans	1 078	499	579	79	64	420	515
	70-74 ans	909	454	455	68	44	386	411
	50-74 ans	5 009	2 501	2 508	648	563	1 853	1 945
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	952	491	461	290	282	201	179
	55-59 ans	922	452	470	95	85	357	385
	60-64 ans	1 167	613	554	119	90	494	464
	65-69 ans	1 087	502	585	80	65	422	520
	70-74 ans	924	462	462	68	45	394	417
	50-74 ans	5 052	2 520	2 532	652	567	1 868	1 965
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	514	212	302	117	185	95	117
	55-59 ans	403	147	256	21	46	126	210
	60-64 ans	502	204	298	41	37	163	261
	65-69 ans	428	151	277	21	34	130	243
	70-74 ans	362	145	217	15	21	130	196
	50-74 ans	2 209	859	1 350	215	323	644	1 027
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	97	53	44	32	27	21	17
	55-59 ans	109	55	54	8	8	47	46
	60-64 ans	102	59	43	11	6	48	37
	65-69 ans	89	39	50	4	6	35	44
	70-74 ans	60	30	30	5	3	25	27
	50-74 ans	457	236	221	60	50	176	171
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	6	3	3	3	2	0	1
	55-59 ans	9	4	5	1	1	3	4
	60-64 ans	9	5	4	2	2	3	2
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	4	4	0	0	0	4	0
	50-74 ans	31	19	12	6	5	13	7
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	98	62	36	35	21	27	15
	55-59 ans	135	76	59	15	10	61	49
	60-64 ans	180	106	74	13	14	93	60
	65-69 ans	176	89	87	10	11	79	76
	70-74 ans	183	106	77	17	3	89	74

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	772	439	333	90	59	349	274
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux)	50-54 ans	148	100	48	66	32	34	16
	55-59 ans	147	98	49	24	12	74	37
	60-64 ans	222	145	77	32	17	113	60
	65-69 ans	197	116	81	18	8	98	73
	70-74 ans	151	84	67	15	6	69	61
	50-74 ans	865	543	322	155	75	388	247
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	37	28	9	19	7	9	2
	55-59 ans	63	45	18	17	3	28	15
	60-64 ans	88	57	31	16	8	41	23
	65-69 ans	110	65	45	20	3	45	42
	70-74 ans	93	56	37	12	6	44	31
	50-74 ans	391	251	140	84	27	167	113
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	37	24	13	11	5	13	8
	55-59 ans	43	22	21	6	4	16	17
	60-64 ans	51	31	20	2	6	29	14
	65-69 ans	54	23	31	3	3	20	28
	70-74 ans	52	28	24	4	2	24	22
	50-74 ans	237	128	109	26	20	102	89
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	9	7	2	6	2	1	0
	55-59 ans	8	4	4	3	0	1	4
	60-64 ans	11	5	6	1	0	4	6
	65-69 ans	19	10	9	2	0	8	9
	70-74 ans	15	7	8	0	4	7	4
	50-74 ans	62	33	29	12	6	21	23
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	4	2	2	1	0	1	2
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	14	6	8	1	0	5	8
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	246	162	84	101	53	61	31
	55-59 ans	282	174	108	39	22	135	86

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	402	251	151	45	31	206	120
	65-69 ans	373	205	168	28	19	177	149
	70-74 ans	334	190	144	32	9	158	135
	50-74 ans	1 637	982	655	245	134	737	521
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	148	100	48	66	32	34	16
	55-59 ans	147	98	49	24	12	74	37
	60-64 ans	222	145	77	32	17	113	60
	65-69 ans	197	116	81	18	8	98	73
	70-74 ans	151	84	67	15	6	69	61
	50-74 ans	865	543	322	155	75	388	247
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	119	80	39	52	28	28	11
	55-59 ans	124	85	39	22	11	63	28
	60-64 ans	190	122	68	28	14	94	54
	65-69 ans	160	95	65	15	7	80	58
	70-74 ans	125	68	57	14	6	54	51
	50-74 ans	718	450	268	131	66	319	202
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	142	97	45	65	31	32	14
	55-59 ans	142	99	43	26	11	73	32
	60-64 ans	225	145	80	31	18	114	62
	65-69 ans	198	120	78	19	8	101	70
	70-74 ans	149	84	65	15	6	69	59
	50-74 ans	856	545	311	156	74	389	237
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	37	28	9	19	7	9	2
	55-59 ans	63	45	18	17	3	28	15
	60-64 ans	88	57	31	16	8	41	23
	65-69 ans	110	65	45	20	3	45	42
	70-74 ans	93	56	37	12	6	44	31
	50-74 ans	391	251	140	84	27	167	113

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 53 - Région : BRETAGNE

Date de réalisation du présent document = 22/04/2016

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,7	99,8	99,6	100,0	99,6	99,5	99,4
	55-59 ans	99,6	99,8	99,4	100,0	100,0	99,7	99,2
	60-64 ans	99,7	99,8	99,6	100,0	100,0	99,8	99,6
	65-69 ans	99,4	99,6	99,3	98,8	100,0	99,8	99,2
	70-74 ans	99,1	99,6	98,7	100,0	97,8	99,5	98,8
	50-74 ans	99,5	99,7	99,3	99,8	99,6	99,7	99,2
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	54,0	43,2	65,5	40,3	65,6	47,3	65,4
	55-59 ans	43,7	32,5	54,5	22,1	54,1	35,3	54,5
	60-64 ans	43,0	33,3	53,8	34,5	41,1	33,0	56,3
	65-69 ans	39,4	30,1	47,4	26,3	52,3	30,8	46,7
	70-74 ans	39,2	31,4	47,0	22,1	46,7	33,0	47,0
	50-74 ans	43,7	34,1	53,3	33,0	57,0	34,5	52,3
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	10,2	10,8	9,5	11,0	9,6	10,4	9,5
	55-59 ans	11,8	12,2	11,5	8,4	9,4	13,2	11,9
	60-64 ans	8,7	9,6	7,8	9,2	6,7	9,7	8,0
	65-69 ans	8,2	7,8	8,5	5,0	9,2	8,3	8,5
	70-74 ans	6,5	6,5	6,5	7,4	6,7	6,3	6,5
	50-74 ans	9,0	9,4	8,7	9,2	8,8	9,4	8,7
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,6	0,6	0,7	1,0	0,7	0,0	0,6
	55-59 ans	1,0	0,9	1,1	1,1	1,2	0,8	1,0
	60-64 ans	0,8	0,8	0,7	1,7	2,2	0,6	0,4
	65-69 ans	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
	70-74 ans	0,4	0,9	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
	50-74 ans	0,6	0,8	0,5	0,9	0,9	0,7	0,4
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10,3	12,6	7,8	12,1	7,4	13,4	8,4
	55-59 ans	14,6	16,8	12,6	15,8	11,8	17,1	12,7
	60-64 ans	15,4	17,3	13,4	10,9	15,6	18,8	12,9
	65-69 ans	16,2	17,7	14,9	12,5	16,9	18,7	14,6
	70-74 ans	19,8	22,9	16,7	25,0	6,7	22,6	17,7
	50-74 ans	15,3	17,4	13,2	13,8	10,4	18,7	13,9

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	15,5	20,4	10,4	22,8	11,3	16,9	8,9
	55-59 ans	15,9	21,7	10,4	25,3	14,1	20,7	9,6
	60-64 ans	19,0	23,7	13,9	26,9	18,9	22,9	12,9
	65-69 ans	18,1	23,1	13,8	22,5	12,3	23,2	14,0
	70-74 ans	16,3	18,2	14,5	22,1	13,3	17,5	14,6
	50-74 ans	17,1	21,5	12,7	23,8	13,2	20,8	12,6
	D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,9	5,7	2,0	6,6	2,5	4,5
55-59 ans		6,8	10,0	3,8	17,9	3,5	7,8	3,9
60-64 ans		7,5	9,3	5,6	13,4	8,9	8,3	5,0
65-69 ans		10,1	12,9	7,7	25,0	4,6	10,7	8,1
70-74 ans		10,1	12,1	8,0	17,6	13,3	11,2	7,4
50-74 ans		7,7	10,0	5,5	12,9	4,8	8,9	5,8
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)		50-54 ans	3,9	4,9	2,8	3,8	1,8	6,5
	55-59 ans	4,7	4,9	4,5	6,3	4,7	4,5	4,4
	60-64 ans	4,4	5,1	3,6	1,7	6,7	5,9	3,0
	65-69 ans	5,0	4,6	5,3	3,8	4,6	4,7	5,4
	70-74 ans	5,6	6,1	5,2	5,9	4,4	6,1	5,3
	50-74 ans	4,7	5,1	4,3	4,0	3,5	5,5	4,5
	D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,9	1,4	0,4	2,1	0,7	0,5
55-59 ans		0,9	0,9	0,9	3,2	0,0	0,3	1,0
60-64 ans		0,9	0,8	1,1	0,8	0,0	0,8	1,3
65-69 ans		1,7	2,0	1,5	2,5	0,0	1,9	1,7
70-74 ans		1,6	1,5	1,7	0,0	8,9	1,8	1,0
50-74 ans		1,2	1,3	1,1	1,8	1,1	1,1	1,2
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu		50-54 ans	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,5
	55-59 ans	0,3	0,2	0,4	0,0	0,0	0,3	0,5
	60-64 ans	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
	65-69 ans	0,4	0,4	0,3	1,3	0,0	0,2	0,4
	70-74 ans	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,5	0,5
	50-74 ans	0,3	0,2	0,3	0,2	0,0	0,3	0,4

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,2	5,9	2,7	6,5	3,0	5,2	2,2
	55-59 ans	5,3	7,2	3,7	10,5	5,1	6,6	3,4
	60-64 ans	6,4	9,0	4,4	11,5	7,1	8,6	4,0
	65-69 ans	7,1	8,8	5,8	10,8	7,2	8,5	5,7
	70-74 ans	8,7	11,2	6,7	22,1	5,4	10,2	6,8
	50-74 ans	6,2	8,2	4,5	9,0	4,4	8,0	4,5
50-74 ans **	6,1	8,0	4,4	
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,5	3,7	1,5	4,2	1,8	2,9	1,2
	55-59 ans	2,8	4,1	1,7	6,4	2,8	3,6	1,5
	60-64 ans	3,6	5,2	2,2	8,1	3,9	4,7	2,0
	65-69 ans	3,8	5,0	2,8	6,9	3,0	4,7	2,8
	70-74 ans	3,9	5,0	3,1	10,4	3,6	4,4	3,1
	50-74 ans	3,3	4,5	2,2	5,7	2,5	4,2	2,1
50-74 ans **	3,3	4,5	2,1	
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,0	2,9	1,2	3,3	1,6	2,4	0,8
	55-59 ans	2,3	3,5	1,3	5,9	2,6	3,1	1,1
	60-64 ans	3,0	4,4	2,0	7,1	3,2	3,9	1,8
	65-69 ans	3,1	4,1	2,3	5,8	2,6	3,9	2,2
	70-74 ans	3,2	4,0	2,6	9,7	3,6	3,5	2,6
	50-74 ans	2,7	3,8	1,8	4,8	2,2	3,5	1,8
50-74 ans **	2,7	3,7	1,8	
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,4	3,5	1,4	4,2	1,8	2,7	1,0
	55-59 ans	2,7	4,1	1,5	7,0	2,6	3,6	1,3
	60-64 ans	3,6	5,2	2,3	7,9	4,1	4,8	2,1
	65-69 ans	3,8	5,1	2,7	7,3	3,0	4,9	2,7
	70-74 ans	3,9	5,0	3,0	10,4	3,6	4,4	3,0
	50-74 ans	3,2	4,6	2,1	5,7	2,4	4,2	2,1
50-74 ans **	3,2	4,5	2,1	
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	1,0	0,3	1,2	0,4	0,8	0,1
	55-59 ans	1,2	1,9	0,6	4,6	0,7	1,4	0,6
	60-64 ans	1,4	2,0	0,9	4,1	1,8	1,7	0,8
	65-69 ans	2,1	2,8	1,6	7,7	1,1	2,2	1,6
	70-74 ans	2,4	3,3	1,7	8,3	3,6	2,8	1,6

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1,5	2,1	1,0	3,1	0,9	1,8	1,0
	50-74 ans **	1,4	2,0	0,9

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)