Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013.

Effectifs sur la période 2012-2013			Total		Dépistage	Dépistage initial §		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel									
qu'en soit le résultat)	50-54 ans	8 681	3 200	5 481	2 293	3 605	907	1 876	
	55-59 ans	7 782	2 757	5 025	1 059	1 289	1 698	3 736	
	60-64 ans	7 925	2 832	5 093	1 136	1 277	1 696	3 816	
	65-69 ans	6 182	2 238	3 944	827	839	1 411	3 105	
	70-74 ans	4 823	1 737	3 086	618	696	1 119	2 390	
	50-74 ans	35 393	12 764	22 629	5 933	7 706	6 831	14 923	
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	703	323	380	242	268	81	112	
от том и то	55-59 ans	702	312	390	149	100	163	290	
	60-64 ans	730	315	415	151	126	164	289	
	65-69 ans	634	249	385	115	105	134	280	
	70-74 ans	632	242	390	103	125	139	265	
	50-74 ans	3 401	1 441	1 960	760	724	681	1 236	
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test									
NA	50-54 ans	310	132	178	91	113	41	65	
	55-59 ans	316	119	197	43	42	76	155	
	60-64 ans	356	139	217	59	57	80	160	
	65-69 ans	298	104	194	46	42	58	152	
	70-74 ans	268	95	173	29	38	66	135	
	50-74 ans	1 548	589	959	268	292	321	667	
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	393	191	202	151	155	40	47	
	55-59 ans	386	193	193	106	58	87	135	
	60-64 ans	374	176	198	92	69	84	129	
	65-69 ans	336	145	191	69	63	76	128	
	70-74 ans	364	147	217	74	87	73	130	
	50-74 ans	1 853	852	1 001	492	432	360	569	
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	8 288	3 009	5 279	2 142	3 450	867	1 829	
	55-59 ans	7 396	2 564	4 832	953	1 231	1 611	3 601	
	60-64 ans	7 551	2 656	4 895	1 044	1 208	1 612	3 687	
	65-69 ans	5 846	2 093	3 753	758	776	1 335	2 977	
	70-74 ans	4 459	1 590	2 869	544	609	1 046	2 260	
	50-74 ans	33 540	11 912	21 628	5 441	7 274	6 471	14 354	
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	130	40	90	32	60	8	30	
•	55-59 ans	123	46	77	27	23	19	54	
	60-64 ans	137	58	79	21	24	37	55	

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013.

Effectifs sur la période 2012-2013			Total		Dépistage	Dépistage initial §		Dépistages Subséquents †	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	65-69 ans	103	42	61	20	17	22	44	
	70-74 ans	74	37	37	14	13	23	24	
	50-74 ans	567	223	344	114	137	109	207	
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la									
coloscopie	50-54 ans	130	40	90	32	60	8	30	
	55-59 ans	123	46	77	27	23	19	54	
	60-64 ans	137	58	79	21	24	37	55 44	
	65-69 ans	103	42	61	20	17	22	44	
	70-74 ans	73	36	37	14	13	22	24	
	50-74 ans	566	222	344	114	137	108	207	
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	120	34	86	26	57	8	29	
700 Nombre de personnes ayant realise une coloscopie	55-59 ans	104	37	67	24	20	13	47	
	60-64 ans	123	53	70	18	19	35	51	
	65-69 ans	87	35	52	16	14	19	38	
	70-74 ans	63	29	34	10	11	19	23	
	50-74 ans	497	188	309	94	121	94	188	
Account of all a constructions and a construction of a constructio	50.54	440	00	00	0.5	5.4		00	
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	113	33	80	25	54	8	26	
	55-59 ans	99	37	62	24	18	13	44	
	60-64 ans	115	48	67	15	17	33	50 36	
	65-69 ans	80	30	50	13	14	17	36	
	70-74 ans <b>50-74 ans</b>	60 <b>467</b>	27 <b>175</b>	33 <b>292</b>	9 <b>86</b>	11 <b>114</b>	18 <b>89</b>	22 <b>178</b>	
	50-74 ans	407	1/5	292	00	114	69	1/6	
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une									
complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une									
complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72									
h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013.

Effectifs sur la période 2012-2013			Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas								
d'autres examens)	50-54 ans	120	34	86	26	57	8	29
	55-59 ans	103	37	66	24	20	13	46
	60-64 ans	123	53	70	18	19	35	51
	65-69 ans	87	35	52	16	14	19	38
	70-74 ans	63	29	34	10	11	19	23
	50-74 ans	496	188	308	94	121	94	187
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre								
exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre								
que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013			Total		Dépistage	e initial §	Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable								
(NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,1	10,1	6,9	10,6	7,4	8,9	6,0
	55-59 ans	9,0	11,3	7,8	14,1	7,8	9,6	7,8
	60-64 ans	9,2	11,1	8,1	13,3	9,9	9,7	7,6
	65-69 ans	10,3	11,1	9,8	13,9	12,5	9,5	9,0
	70-74 ans	13,1	13,9	12,6	16,7	18,0	12,4	11,1
	50-74 ans	9,6	11,3	8,7	12,8	9,4	10,0	8,3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non								
suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	4,5	6,0	3,7	6,6	4,3	4,4	2,5
	55-59 ans	5,0	7,0	3,8	10,0	4,5	5,1	3,6
	60-64 ans	4,7	6,2	3,9	8,1	5,4	5,0	3,4
	65-69 ans	5,4	6,5	4,8	8,3	7,5	5,4	4,1
	70-74 ans	7,5	8,5	7,0	12,0	12,5	6,5	5,4
	50-74 ans	5,2	6,7	4,4	8,3	5,6	5,3	3,8
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un								
résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	44,1	40,9	46,8	37,6	42,2	50,6	58,0
	55-59 ans	45,0	38,1	50,5	28,9	42,0	46,6	53,4
	60-64 ans	48,8	44,1	52,3	39,1	45,2	48,8	55,4
	65-69 ans	47,0	41,8	50,4	40,0	40,0	43,3	54,3
	70-74 ans	42,4	39,3	44,4	28,2	30,4	47,5	50,9
	50-74 ans	45,5	40,9	48,9	35,3	40,3	47,1	54,0
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les								
personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,6	1,3	1,7	1,5	1,7	0,9	1,6
	55-59 ans	1,7	1,8	1,6	2,8	1,9	1,2	1,5
	60-64 ans	1,8	2,2	1,6	2,0	2,0	2,3	1,5
	65-69 ans	1,8	2,0	1,6	2,6	2,2	1,6	1,5
	70-74 ans	1,7	2,3	1,3	2,6	2,1	2,2	1,1
	50-74 ans	1,7	1,9	1,6	2,1	1,9	1,7	1,4
	50-74 ans **	1,7	1,9	1,6				
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant								
éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	98,6	97,3	100,0	100,0	100,0	95,7	100,0

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013		Total			Dépistage initial §		Dépistages Subséquents †	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	99,8	99,6	100,0	100,0	100,0	99,1	100,0
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après								
un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	92,3	85,0	95,6	81,3	95,0	100,0	96,7
	55-59 ans	84,6	80,4	87,0	88,9	87,0	68,4	87,0
	60-64 ans	89,8	91,4	88,6	85,7	79,2	94,6	92,7
	65-69 ans	84,5	83,3	85,2	80,0	82,4	86,4	86,4
	70-74 ans	86,3	80,6	91,9	71,4	84,6	86,4	95,8
	50-74 ans	87,8	84,7	89,8	82,5	88,3	87,0	90,8
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie								
complète	50-54 ans	94,2	97,1	93,0	96,2	94,7	100,0	89,7
	55-59 ans	95,2	100,0	92,5	100,0	90,0	100,0	93,6
	60-64 ans	93,5	90,6	95,7	83,3	89,5	94,3	98,0
	65-69 ans	92,0	85,7	96,2	81,3	100,0	89,5	94,7
	70-74 ans	95,2	93,1	97,1	90,0	100,0	94,7	95,7
	50-74 ans	94,0	93,1	94,5	91,5	94,2	94,7	94,7

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

<sup>\*\*</sup> standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)