

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 32 - Région: NORD_PAS_DE_CALAIS_PICARDIE

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	92 496	42 383	50 113	25 150	28 465	17 233	21 648
	55-59 ans	86 331	37 908	48 423	7 275	8 338	30 633	40 085
	60-64 ans	97 358	43 278	54 080	6 782	7 506	36 496	46 574
	65-69 ans	74 422	33 544	40 878	4 209	4 784	29 335	36 094
	70-74 ans	52 172	22 907	29 265	2 552	3 070	20 355	26 195
	50-74 ans	402 779	180 020	222 759	45 968	52 163	134 052	170 596
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	6 475	2 996	3 479	2 085	2 371	911	1 108
	55-59 ans	5 516	2 423	3 093	697	746	1 726	2 347
	60-64 ans	6 171	2 596	3 575	615	724	1 981	2 851
	65-69 ans	5 001	2 095	2 906	414	533	1 681	2 373
	70-74 ans	4 195	1 729	2 466	322	386	1 407	2 080
	50-74 ans	27 358	11 839	15 519	4 133	4 760	7 706	10 759
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	3 964	1 864	2 100	1 230	1 354	634	746
	55-59 ans	3 540	1 522	2 018	357	389	1 165	1 629
	60-64 ans	4 200	1 753	2 447	353	422	1 400	2 025
	65-69 ans	3 411	1 439	1 972	215	295	1 224	1 677
	70-74 ans	2 763	1 134	1 629	166	195	968	1 434
	50-74 ans	17 878	7 712	10 166	2 321	2 655	5 391	7 511
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	2 511	1 132	1 379	855	1 017	277	362
	55-59 ans	1 976	901	1 075	340	357	561	718
	60-64 ans	1 971	843	1 128	262	302	581	826
	65-69 ans	1 590	656	934	199	238	457	696
	70-74 ans	1 432	595	837	156	191	439	646
	50-74 ans	9 480	4 127	5 353	1 812	2 105	2 315	3 248
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	89 985	41 251	48 734	24 295	27 448	16 956	21 286
	55-59 ans	84 355	37 007	47 348	6 935	7 981	30 072	39 367
	60-64 ans	95 387	42 435	52 952	6 520	7 204	35 915	45 748
	65-69 ans	72 832	32 888	39 944	4 010	4 546	28 878	35 398
	70-74 ans	50 740	22 312	28 428	2 396	2 879	19 916	25 549
	50-74 ans	393 299	175 893	217 406	44 156	50 058	131 737	167 348
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	1 687	884	803	557	463	327	340
	55-59 ans	1 743	917	826	236	165	681	661
	60-64 ans	2 166	1 089	1 077	212	199	877	878

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1 845	961	884	141	128	820	756
	70-74 ans	1 407	729	678	107	79	622	599
	50-74 ans	8 848	4 580	4 268	1 253	1 034	3 327	3 234
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	1 659	872	787	552	452	320	335
	55-59 ans	1 717	903	814	232	162	671	652
	60-64 ans	2 128	1 070	1 058	210	195	860	863
	65-69 ans	1 816	943	873	138	125	805	748
	70-74 ans	1 369	709	660	105	77	604	583
	50-74 ans	8 689	4 497	4 192	1 237	1 011	3 260	3 181
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	1 357	699	658	429	370	270	288
	55-59 ans	1 465	759	706	177	127	582	579
	60-64 ans	1 828	912	916	162	155	750	761
	65-69 ans	1 561	810	751	114	101	696	650
	70-74 ans	1 167	599	568	86	65	513	503
	50-74 ans	7 378	3 779	3 599	968	818	2 811	2 781
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	1 341	694	647	424	366	270	281
	55-59 ans	1 443	748	695	174	124	574	571
	60-64 ans	1 788	896	892	157	151	739	741
	65-69 ans	1 520	788	732	108	98	680	634
	70-74 ans	1 140	586	554	82	63	504	491
	50-74 ans	7 232	3 712	3 520	945	802	2 767	2 718
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	4	3	1	2	1	1	0
	60-64 ans	8	6	2	3	0	3	2
	65-69 ans	6	4	2	1	1	3	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	24	17	7	8	3	9	4
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	2	0	2	0	0	0	2

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	1 351	698	653	428	369	270	284
	55-59 ans	1 452	754	698	175	126	579	572
	60-64 ans	1 807	904	903	161	155	743	748
	65-69 ans	1 543	798	745	110	100	688	645
	70-74 ans	1 157	596	561	86	65	510	496
	50-74 ans	7 310	3 750	3 560	960	815	2 790	2 745
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	6	1	5	1	1	0	4
	55-59 ans	13	5	8	2	1	3	7
	60-64 ans	21	8	13	1	0	7	13
	65-69 ans	18	12	6	4	1	8	5
	70-74 ans	10	3	7	0	0	3	7
	50-74 ans	68	29	39	8	3	21	36
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	6	4	2	3	1	1	1
	55-59 ans	5	2	3	1	1	1	2
	60-64 ans	9	4	5	0	0	4	5
	65-69 ans	11	5	6	0	1	5	5
	70-74 ans	16	11	5	1	1	10	4
	50-74 ans	47	26	21	5	4	21	17

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 32 - Région: NORD_PAS_DE_CALAIS_PICARDIE

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,0	7,1	6,9	8,3	8,3	5,3	5,1
	55-59 ans	6,4	6,4	6,4	9,6	8,9	5,6	5,9
	60-64 ans	6,3	6,0	6,6	9,1	9,6	5,4	6,1
	65-69 ans	6,7	6,2	7,1	9,8	11,1	5,7	6,6
	70-74 ans	8,0	7,5	8,4	12,6	12,6	6,9	7,9
	50-74 ans	6,8	6,6	7,0	9,0	9,1	5,7	6,3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,7	2,7	2,8	3,4	3,6	1,6	1,7
	55-59 ans	2,3	2,4	2,2	4,7	4,3	1,8	1,8
	60-64 ans	2,0	1,9	2,1	3,9	4,0	1,6	1,8
	65-69 ans	2,1	2,0	2,3	4,7	5,0	1,6	1,9
	70-74 ans	2,7	2,6	2,9	6,1	6,2	2,2	2,5
	50-74 ans	2,4	2,3	2,4	3,9	4,0	1,7	1,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	61,2	62,2	60,4	59,0	57,1	69,6	67,3
	55-59 ans	64,2	62,8	65,2	51,2	52,1	67,5	69,4
	60-64 ans	68,1	67,5	68,4	57,4	58,3	70,7	71,0
	65-69 ans	68,2	68,7	67,9	51,9	55,3	72,8	70,7
	70-74 ans	65,9	65,6	66,1	51,6	50,5	68,8	68,9
	50-74 ans	65,3	65,1	65,5	56,2	55,8	70,0	69,8
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,9	2,1	1,6	2,3	1,7	1,9	1,6
	55-59 ans	2,1	2,5	1,7	3,4	2,1	2,3	1,7
	60-64 ans	2,3	2,6	2,0	3,3	2,8	2,4	1,9
	65-69 ans	2,5	2,9	2,2	3,5	2,8	2,8	2,1
	70-74 ans	2,8	3,3	2,4	4,5	2,7	3,1	2,3
	50-74 ans	2,2	2,6	2,0	2,8	2,1	2,5	1,9
50-74 ans **	2,3	2,6	2,0	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,3	98,6	98,0	99,1	97,6	97,9	98,5
	55-59 ans	98,5	98,5	98,5	98,3	98,2	98,5	98,6
	60-64 ans	98,2	98,3	98,2	99,1	98,0	98,1	98,3
	65-69 ans	98,4	98,1	98,8	97,9	97,7	98,2	98,9
	70-74 ans	97,3	97,3	97,3	98,1	97,5	97,1	97,3

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	98,2	98,2	98,2	98,7	97,8	98,0	98,4
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	81,8	80,2	83,6	77,7	81,9	84,4	86,0
	55-59 ans	85,3	84,1	86,7	76,3	78,4	86,7	88,8
	60-64 ans	85,9	85,2	86,6	77,1	79,5	87,2	88,2
	65-69 ans	86,0	85,9	86,0	82,6	80,8	86,5	86,9
	70-74 ans	85,2	84,5	86,1	81,9	84,4	84,9	86,3
	50-74 ans	84,9	84,0	85,9	78,3	80,9	86,2	87,4
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,8	99,3	98,3	98,8	98,9	100,0	97,6
	55-59 ans	98,5	98,6	98,4	98,3	97,6	98,6	98,6
	60-64 ans	97,8	98,2	97,4	96,9	97,4	98,5	97,4
	65-69 ans	97,4	97,3	97,5	94,7	97,0	97,7	97,5
	70-74 ans	97,7	97,8	97,5	95,3	96,9	98,2	97,6
	50-74 ans	98,0	98,2	97,8	97,6	98,0	98,4	97,7

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)