

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 52 - Région: PAYS_DE_LA_LOIRE

Date de réalisation du présent document = 22/04/2016

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	1 352	758	594	450	356	308	238
	55-59 ans	1 202	660	542	122	100	538	442
	60-64 ans	1 575	848	727	192	160	656	567
	65-69 ans	1 298	655	643	108	94	547	549
	70-74 ans	1 089	544	545	79	73	465	472
	50-74 ans	6 516	3 465	3 051	951	783	2 514	2 268
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	1 360	762	598	452	359	310	239
	55-59 ans	1 221	672	549	125	104	547	445
	60-64 ans	1 585	852	733	193	160	659	573
	65-69 ans	1 316	661	655	108	100	553	555
	70-74 ans	1 113	552	561	81	75	471	486
	50-74 ans	6 595	3 499	3 096	959	798	2 540	2 298
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	646	307	339	192	215	115	124
	55-59 ans	506	233	273	42	52	191	221
	60-64 ans	642	258	384	62	83	196	301
	65-69 ans	467	174	293	32	42	142	251
	70-74 ans	421	157	264	24	33	133	231
	50-74 ans	2 682	1 129	1 553	352	425	777	1 128
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	143	87	56	47	27	40	29
	55-59 ans	125	66	59	9	10	57	49
	60-64 ans	151	84	67	21	22	63	45
	65-69 ans	141	62	79	14	13	48	66
	70-74 ans	99	49	50	4	5	45	45
	50-74 ans	659	348	311	95	77	253	234
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	15	8	7	3	7	5	0
	55-59 ans	7	3	4	0	2	3	2
	60-64 ans	5	3	2	1	0	2	2
	65-69 ans	6	4	2	0	0	4	2
	70-74 ans	4	1	3	0	1	1	2
	50-74 ans	37	19	18	4	10	15	8
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	204	124	80	74	47	50	33
	55-59 ans	204	127	77	19	15	108	62
	60-64 ans	286	179	107	31	20	148	87
	65-69 ans	240	136	104	20	13	116	91
	70-74 ans	186	108	78	15	9	93	69

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 120	674	446	159	104	515	342
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux)	50-54 ans	234	160	74	90	40	70	34
	55-59 ans	217	146	71	29	13	117	58
	60-64 ans	293	189	104	49	20	140	84
	65-69 ans	296	191	105	30	19	161	86
	70-74 ans	232	135	97	16	17	119	80
	50-74 ans	1 272	821	451	214	109	607	342
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	44	30	14	21	10	9	4
	55-59 ans	69	42	27	13	6	29	21
	60-64 ans	118	88	30	19	7	69	23
	65-69 ans	99	65	34	9	3	56	31
	70-74 ans	104	67	37	17	7	50	30
	50-74 ans	434	292	142	79	33	213	109
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	35	21	14	11	7	10	7
	55-59 ans	42	23	19	5	3	18	16
	60-64 ans	43	23	20	4	6	19	14
	65-69 ans	27	11	16	0	4	11	12
	70-74 ans	19	8	11	1	1	7	10
	50-74 ans	166	86	80	21	21	65	59
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	24	16	8	9	4	7	4
	55-59 ans	27	15	12	5	2	10	10
	60-64 ans	34	23	11	5	2	18	9
	65-69 ans	24	11	13	2	3	9	10
	70-74 ans	37	23	14	4	1	19	13
	50-74 ans	146	88	58	25	12	63	46
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	5	2	3	1	2	1	1
	55-59 ans	16	12	4	3	1	9	3
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	11	4	7	0	3	4	4
	70-74 ans	9	3	6	0	1	3	5
	50-74 ans	44	22	22	4	7	18	15
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	438	284	154	164	87	120	67
	55-59 ans	421	273	148	48	28	225	120

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	579	368	211	80	40	288	171
	65-69 ans	536	327	209	50	32	277	177
	70-74 ans	418	243	175	31	26	212	149
	50-74 ans	2 392	1 495	897	373	213	1 122	684
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	234	160	74	90	40	70	34
	55-59 ans	217	146	71	29	13	117	58
	60-64 ans	293	189	104	49	20	140	84
	65-69 ans	296	191	105	30	19	161	86
	70-74 ans	232	135	97	16	17	119	80
	50-74 ans	1 272	821	451	214	109	607	342
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	194	135	59	75	32	60	27
	55-59 ans	178	121	57	24	11	97	46
	60-64 ans	246	166	80	47	16	119	64
	65-69 ans	243	154	89	26	19	128	70
	70-74 ans	196	119	77	16	13	103	64
	50-74 ans	1 057	695	362	188	91	507	271
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	223	156	67	87	36	69	31
	55-59 ans	205	141	64	29	13	112	51
	60-64 ans	292	202	90	54	18	148	72
	65-69 ans	304	196	108	30	23	166	85
	70-74 ans	237	146	91	19	18	127	73
	50-74 ans	1 261	841	420	219	108	622	312
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	44	30	14	21	10	9	4
	55-59 ans	69	42	27	13	6	29	21
	60-64 ans	118	88	30	19	7	69	23
	65-69 ans	99	65	34	9	3	56	31
	70-74 ans	104	67	37	17	7	50	30
	50-74 ans	434	292	142	79	33	213	109

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,6	99,6	99,5	99,8	99,4	99,4	99,6
	55-59 ans	98,6	98,4	98,9	98,4	97,1	98,4	99,3
	60-64 ans	99,5	99,6	99,3	100,0	100,0	99,5	99,1
	65-69 ans	99,2	99,5	98,8	100,0	95,9	99,5	99,3
	70-74 ans	98,5	98,9	98,0	98,8	97,3	98,9	98,1
	50-74 ans	99,1	99,3	98,9	99,6	98,6	99,1	99,0
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	47,5	40,3	56,7	42,5	59,9	37,1	51,9
	55-59 ans	41,4	34,7	49,7	33,6	50,0	34,9	49,7
	60-64 ans	40,5	30,3	52,4	32,1	51,9	29,7	52,5
	65-69 ans	35,5	26,3	44,7	29,6	42,0	25,7	45,2
	70-74 ans	37,8	28,4	47,1	29,6	44,0	28,2	47,5
	50-74 ans	40,7	32,3	50,2	36,7	53,3	30,6	49,1
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	10,5	11,4	9,4	10,4	7,5	12,9	12,1
	55-59 ans	10,2	9,8	10,7	7,2	9,6	10,4	11,0
	60-64 ans	9,5	9,9	9,1	10,9	13,8	9,6	7,9
	65-69 ans	10,7	9,4	12,1	13,0	13,0	8,7	11,9
	70-74 ans	8,9	8,9	8,9	4,9	6,7	9,6	9,3
	50-74 ans	10,0	9,9	10,0	9,9	9,6	10,0	10,2
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,1	1,0	1,2	0,7	1,9	1,6	0,0
	55-59 ans	0,6	0,4	0,7	0,0	1,9	0,5	0,4
	60-64 ans	0,3	0,4	0,3	0,5	0,0	0,3	0,3
	65-69 ans	0,5	0,6	0,3	0,0	0,0	0,7	0,4
	70-74 ans	0,4	0,2	0,5	0,0	1,3	0,2	0,4
	50-74 ans	0,6	0,5	0,6	0,4	1,3	0,6	0,3
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15,0	16,3	13,4	16,4	13,1	16,1	13,8
	55-59 ans	16,7	18,9	14,0	15,2	14,4	19,7	13,9
	60-64 ans	18,0	21,0	14,6	16,1	12,5	22,5	15,2
	65-69 ans	18,2	20,6	15,9	18,5	13,0	21,0	16,4
	70-74 ans	16,7	19,6	13,9	18,5	12,0	19,7	14,2
	50-74 ans	17,0	19,3	14,4	16,6	13,0	20,3	14,9

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	17,2	21,0	12,4	19,9	11,1	22,6	14,2
	55-59 ans	17,8	21,7	12,9	23,2	12,5	21,4	13,0
	60-64 ans	18,5	22,2	14,2	25,4	12,5	21,2	14,7
	65-69 ans	22,5	28,9	16,0	27,8	19,0	29,1	15,5
	70-74 ans	20,8	24,5	17,3	19,8	22,7	25,3	16,5
	50-74 ans	19,3	23,5	14,6	22,3	13,7	23,9	14,9
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,2	3,9	2,3	4,6	2,8	2,9	1,7
	55-59 ans	5,7	6,3	4,9	10,4	5,8	5,3	4,7
	60-64 ans	7,4	10,3	4,1	9,8	4,4	10,5	4,0
	65-69 ans	7,5	9,8	5,2	8,3	3,0	10,1	5,6
	70-74 ans	9,3	12,1	6,6	21,0	9,3	10,6	6,2
	50-74 ans	6,6	8,3	4,6	8,2	4,1	8,4	4,7
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,6	2,8	2,3	2,4	1,9	3,2	2,9
	55-59 ans	3,4	3,4	3,5	4,0	2,9	3,3	3,6
	60-64 ans	2,7	2,7	2,7	2,1	3,8	2,9	2,4
	65-69 ans	2,1	1,7	2,4	0,0	4,0	2,0	2,2
	70-74 ans	1,7	1,4	2,0	1,2	1,3	1,5	2,1
	50-74 ans	2,5	2,5	2,6	2,2	2,6	2,6	2,6
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,8	2,1	1,3	2,0	1,1	2,3	1,7
	55-59 ans	2,2	2,2	2,2	4,0	1,9	1,8	2,2
	60-64 ans	2,1	2,7	1,5	2,6	1,3	2,7	1,6
	65-69 ans	1,8	1,7	2,0	1,9	3,0	1,6	1,8
	70-74 ans	3,3	4,2	2,5	4,9	1,3	4,0	2,7
	50-74 ans	2,2	2,5	1,9	2,6	1,5	2,5	2,0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,4	0,3	0,5	0,2	0,6	0,3	0,4
	55-59 ans	1,3	1,8	0,7	2,4	1,0	1,6	0,7
	60-64 ans	0,2	0,1	0,3	0,0	0,0	0,2	0,3
	65-69 ans	0,8	0,6	1,1	0,0	3,0	0,7	0,7
	70-74 ans	0,8	0,5	1,1	0,0	1,3	0,6	1,0
	50-74 ans	0,7	0,6	0,7	0,4	0,9	0,7	0,7

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,8	8,0	3,9	8,1	3,9	7,9	3,8
	55-59 ans	6,5	9,4	4,2	9,4	5,1	9,4	4,0
	60-64 ans	7,7	10,9	5,1	14,9	6,8	10,1	4,8
	65-69 ans	9,0	12,2	6,5	14,1	8,3	11,9	6,2
	70-74 ans	9,3	12,1	7,1	14,0	10,0	11,9	6,7
	50-74 ans	7,5	10,3	5,2	10,2	5,3	10,3	5,1
50-74 ans **	7,5	10,1	5,1	
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,1	4,5	1,9	4,4	1,8	4,6	1,9
	55-59 ans	3,4	5,0	2,0	5,7	2,4	4,9	1,9
	60-64 ans	3,9	5,6	2,5	9,2	3,4	4,9	2,4
	65-69 ans	5,0	7,1	3,2	8,5	4,9	6,9	3,0
	70-74 ans	5,2	6,7	3,9	7,2	6,5	6,7	3,6
	50-74 ans	4,0	5,7	2,6	5,9	2,7	5,6	2,6
50-74 ans **	4,0	5,6	2,6	
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,6	3,8	1,5	3,7	1,4	4,0	1,5
	55-59 ans	2,8	4,2	1,6	4,7	2,0	4,1	1,5
	60-64 ans	3,3	4,9	1,9	8,8	2,7	4,2	1,8
	65-69 ans	4,1	5,7	2,8	7,3	4,9	5,5	2,5
	70-74 ans	4,4	5,9	3,1	7,2	5,0	5,8	2,9
	50-74 ans	3,3	4,8	2,1	5,1	2,3	4,7	2,0
50-74 ans **	3,3	4,7	2,0	
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,0	4,4	1,7	4,3	1,6	4,5	1,7
	55-59 ans	3,2	4,9	1,8	5,7	2,4	4,7	1,7
	60-64 ans	3,9	6,0	2,2	10,1	3,1	5,2	2,0
	65-69 ans	5,1	7,3	3,3	8,5	6,0	7,1	3,0
	70-74 ans	5,3	7,3	3,7	8,6	6,9	7,1	3,3
	50-74 ans	4,0	5,8	2,4	6,0	2,7	5,7	2,3
50-74 ans **	4,0	5,7	2,4	
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	0,8	0,4	1,0	0,5	0,6	0,2
	55-59 ans	1,1	1,5	0,8	2,5	1,1	1,2	0,7
	60-64 ans	1,6	2,6	0,7	3,5	1,2	2,4	0,6
	65-69 ans	1,7	2,4	1,1	2,5	0,8	2,4	1,1
	70-74 ans	2,3	3,3	1,5	7,7	2,7	2,8	1,4

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1,4	2,0	0,8	2,2	0,8	2,0	0,8
	50-74 ans **	1,4	1,9	0,8

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)