

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans | 11179 | 5106 | 6073 | 2879 | 3364 | 2227 | 2709 |
| | 55-59 ans | 10272 | 4448 | 5824 | 1134 | 1396 | 3314 | 4428 |
| | 60-64 ans | 12005 | 5278 | 6727 | 1135 | 1395 | 4143 | 5332 |
| | 65-69 ans | 11122 | 4836 | 6286 | 868 | 1033 | 3968 | 5253 |
| | 70-74 ans | 8568 | 3703 | 4865 | 531 | 758 | 3172 | 4107 |
| | 50-74 ans | 53146 | 23371 | 29775 | 6547 | 7946 | 16824 | 21829 |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) | 50-54 ans | 824 | 393 | 431 | 225 | 271 | 168 | 160 |
| | 55-59 ans | 748 | 349 | 399 | 114 | 133 | 235 | 266 |
| | 60-64 ans | 907 | 433 | 474 | 105 | 144 | 328 | 330 |
| | 65-69 ans | 818 | 355 | 463 | 96 | 111 | 259 | 352 |
| | 70-74 ans | 788 | 311 | 477 | 51 | 107 | 260 | 370 |
| | 50-74 ans | 4085 | 1841 | 2244 | 591 | 766 | 1250 | 1478 |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 593 | 284 | 309 | 143 | 185 | 141 | 124 |
| | 55-59 ans | 543 | 257 | 286 | 68 | 82 | 189 | 204 |
| | 60-64 ans | 718 | 339 | 379 | 72 | 95 | 267 | 284 |
| | 65-69 ans | 646 | 278 | 368 | 60 | 72 | 218 | 296 |
| | 70-74 ans | 626 | 253 | 373 | 35 | 70 | 218 | 303 |
| | 50-74 ans | 3126 | 1411 | 1715 | 378 | 504 | 1033 | 1211 |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait | 50-54 ans | 231 | 109 | 122 | 82 | 86 | 27 | 36 |
| | 55-59 ans | 205 | 92 | 113 | 46 | 51 | 46 | 62 |
| | 60-64 ans | 189 | 94 | 95 | 33 | 49 | 61 | 46 |
| | 65-69 ans | 172 | 77 | 95 | 36 | 39 | 41 | 56 |
| | 70-74 ans | 162 | 58 | 104 | 16 | 37 | 42 | 67 |
| | 50-74 ans | 959 | 430 | 529 | 213 | 262 | 217 | 267 |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable) | 50-54 ans | 10948 | 4997 | 5951 | 2797 | 3278 | 2200 | 2673 |
| | 55-59 ans | 10067 | 4356 | 5711 | 1088 | 1345 | 3268 | 4366 |
| | 60-64 ans | 11816 | 5184 | 6632 | 1102 | 1346 | 4082 | 5286 |
| | 65-69 ans | 10950 | 4759 | 6191 | 832 | 994 | 3927 | 5197 |
| | 70-74 ans | 8406 | 3645 | 4761 | 515 | 721 | 3130 | 4040 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|--|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 50-74 ans | 52187 | 22941 | 29246 | 6334 | 7684 | 16607 | 21562 |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif | 50-54 ans | 137 | 71 | 66 | 44 | 46 | 27 | 20 |
| | 55-59 ans | 124 | 70 | 54 | 18 | 17 | 52 | 37 |
| | 60-64 ans | 175 | 105 | 70 | 24 | 17 | 81 | 53 |
| | 65-69 ans | 179 | 94 | 85 | 25 | 11 | 69 | 74 |
| | 70-74 ans | 154 | 79 | 75 | 17 | 19 | 62 | 56 |
| | 50-74 ans | 769 | 419 | 350 | 128 | 110 | 291 | 240 |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie | 50-54 ans | 135 | 70 | 65 | 43 | 45 | 27 | 20 |
| | 55-59 ans | 123 | 69 | 54 | 18 | 17 | 51 | 37 |
| | 60-64 ans | 170 | 103 | 67 | 24 | 17 | 79 | 50 |
| | 65-69 ans | 173 | 93 | 80 | 25 | 10 | 68 | 70 |
| | 70-74 ans | 147 | 76 | 71 | 17 | 18 | 59 | 53 |
| | 50-74 ans | 748 | 411 | 337 | 127 | 107 | 284 | 230 |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie | 50-54 ans | 116 | 58 | 58 | 34 | 41 | 24 | 17 |
| | 55-59 ans | 107 | 61 | 46 | 15 | 12 | 46 | 34 |
| | 60-64 ans | 157 | 95 | 62 | 22 | 15 | 73 | 47 |
| | 65-69 ans | 158 | 84 | 74 | 20 | 8 | 64 | 66 |
| | 70-74 ans | 130 | 70 | 60 | 16 | 16 | 54 | 44 |
| | 50-74 ans | 668 | 368 | 300 | 107 | 92 | 261 | 208 |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète | 50-54 ans | 109 | 53 | 56 | 31 | 40 | 22 | 16 |
| | 55-59 ans | 98 | 56 | 42 | 14 | 10 | 42 | 32 |
| | 60-64 ans | 147 | 88 | 59 | 20 | 14 | 68 | 45 |
| | 65-69 ans | 149 | 82 | 67 | 20 | 7 | 62 | 60 |
| | 70-74 ans | 117 | 65 | 52 | 14 | 14 | 51 | 38 |
| | 50-74 ans | 620 | 344 | 276 | 99 | 85 | 245 | 191 |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie) | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------|------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens) | 50-54 ans | 116 | 58 | 58 | 34 | 41 | 24 | 17 |
| | 55-59 ans | 107 | 61 | 46 | 15 | 12 | 46 | 34 |
| | 60-64 ans | 155 | 94 | 61 | 22 | 14 | 72 | 47 |
| | 65-69 ans | 154 | 82 | 72 | 19 | 8 | 63 | 64 |
| | 70-74 ans | 128 | 68 | 60 | 16 | 16 | 52 | 44 |
| | 50-74 ans | 660 | 363 | 297 | 106 | 91 | 257 | 206 |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| | 70-74 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 50-74 ans | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie) | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| | Effectifs sur la période 2012-2013 | | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------|------------------------|------------|
| | Age | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 50-74 ans | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 116 | 58 | 58 | 34 | 41 | 24 | 17 |
| | 55-59 ans | 107 | 61 | 46 | 15 | 12 | 46 | 34 |
| | 60-64 ans | 156 | 94 | 62 | 21 | 15 | 73 | 47 |
| | 65-69 ans | 158 | 84 | 74 | 20 | 8 | 64 | 66 |
| | 70-74 ans | 128 | 69 | 59 | 16 | 16 | 53 | 43 |
| | 50-74 ans | 665 | 366 | 299 | 106 | 92 | 260 | 207 |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) | 50-54 ans | 117 | 58 | 59 | 34 | 42 | 24 | 17 |
| | 55-59 ans | 108 | 62 | 46 | 15 | 12 | 47 | 34 |
| | 60-64 ans | 158 | 95 | 63 | 22 | 15 | 73 | 48 |
| | 65-69 ans | 160 | 85 | 75 | 20 | 8 | 65 | 67 |
| | 70-74 ans | 131 | 70 | 61 | 16 | 16 | 54 | 45 |
| | 50-74 ans | 674 | 370 | 304 | 107 | 93 | 263 | 211 |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 58 | 24 | 34 | 16 | 26 | 8 | 8 |
| | 55-59 ans | 36 | 16 | 20 | 2 | 6 | 14 | 14 |
| | 60-64 ans | 60 | 37 | 23 | 9 | 4 | 28 | 19 |
| | 65-69 ans | 52 | 18 | 34 | 3 | 2 | 15 | 32 |
| | 70-74 ans | 48 | 25 | 23 | 5 | 6 | 20 | 17 |
| | 50-74 ans | 254 | 120 | 134 | 35 | 44 | 85 | 90 |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm | 50-54 ans | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| | 55-59 ans | 13 | 9 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 |
| | 60-64 ans | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| | 65-69 ans | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| | 70-74 ans | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| | 50-74 ans | 46 | 20 | 26 | 5 | 6 | 15 | 20 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------|------------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 10 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| | 55-59 ans | 16 | 10 | 6 | 3 | 1 | 7 | 5 |
| | 60-64 ans | 27 | 19 | 8 | 3 | 1 | 16 | 7 |
| | 65-69 ans | 26 | 18 | 8 | 4 | 3 | 14 | 5 |
| | 70-74 ans | 17 | 11 | 6 | 3 | 3 | 8 | 3 |
| | 50-74 ans | 96 | 63 | 33 | 14 | 11 | 49 | 22 |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 30 | 19 | 11 | 12 | 7 | 7 | 4 |
| | 55-59 ans | 27 | 21 | 6 | 4 | 1 | 17 | 5 |
| | 60-64 ans | 41 | 27 | 14 | 6 | 2 | 21 | 12 |
| | 65-69 ans | 43 | 25 | 18 | 8 | 2 | 17 | 16 |
| | 70-74 ans | 42 | 28 | 14 | 7 | 3 | 21 | 11 |
| | 50-74 ans | 183 | 120 | 63 | 37 | 15 | 83 | 48 |
| A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal | 50-54 ans | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| | 55-59 ans | 12 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| | 60-64 ans | 15 | 9 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| | 65-69 ans | 21 | 14 | 7 | 4 | 1 | 10 | 6 |
| | 70-74 ans | 13 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| | 50-74 ans | 69 | 37 | 32 | 12 | 11 | 25 | 21 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------|------------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique) | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| | 60-64 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| | 70-74 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 50-74 ans | 11 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté | 50-54 ans | 40 | 24 | 16 | 13 | 10 | 11 | 6 |
| | 55-59 ans | 43 | 31 | 12 | 7 | 2 | 24 | 10 |
| | 60-64 ans | 68 | 46 | 22 | 9 | 3 | 37 | 19 |
| | 65-69 ans | 69 | 43 | 26 | 12 | 5 | 31 | 21 |
| | 70-74 ans | 59 | 39 | 20 | 10 | 6 | 29 | 14 |
| | 50-74 ans | 279 | 183 | 96 | 51 | 26 | 132 | 70 |
| A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) | 50-54 ans | 30 | 19 | 11 | 12 | 7 | 7 | 4 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------|------------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 27 | 21 | 6 | 4 | 1 | 17 | 5 |
| | 60-64 ans | 41 | 27 | 14 | 6 | 2 | 21 | 12 |
| | 65-69 ans | 43 | 25 | 18 | 8 | 2 | 17 | 16 |
| | 70-74 ans | 42 | 28 | 14 | 7 | 3 | 21 | 11 |
| | 50-74 ans | 183 | 120 | 63 | 37 | 15 | 83 | 48 |
| A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) | 50-54 ans | 25 | 18 | 7 | 11 | 4 | 7 | 3 |
| | 55-59 ans | 23 | 18 | 5 | 4 | 1 | 14 | 4 |
| | 60-64 ans | 37 | 25 | 12 | 6 | 2 | 19 | 10 |
| | 65-69 ans | 39 | 23 | 16 | 7 | 1 | 16 | 15 |
| | 70-74 ans | 34 | 21 | 13 | 6 | 3 | 15 | 10 |
| | 50-74 ans | 158 | 105 | 53 | 34 | 11 | 71 | 42 |
| A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) | 50-54 ans | 25 | 18 | 7 | 11 | 4 | 7 | 3 |
| | 55-59 ans | 26 | 21 | 5 | 6 | 1 | 15 | 4 |
| | 60-64 ans | 43 | 29 | 14 | 6 | 2 | 23 | 12 |
| | 65-69 ans | 40 | 23 | 17 | 7 | 1 | 16 | 16 |
| | 70-74 ans | 39 | 26 | 13 | 7 | 3 | 19 | 10 |
| | 50-74 ans | 173 | 117 | 56 | 37 | 11 | 80 | 45 |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté | 50-54 ans | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| | 55-59 ans | 12 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| | 60-64 ans | 16 | 9 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| | 65-69 ans | 21 | 14 | 7 | 4 | 1 | 10 | 6 |
| | 70-74 ans | 13 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| | 50-74 ans | 70 | 37 | 33 | 12 | 12 | 25 | 21 |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire) | 50-54 ans | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| | 55-59 ans | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|--|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 14 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| | 65-69 ans | 17 | 12 | 5 | 3 | 1 | 9 | 4 |
| | 70-74 ans | 12 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| | 50-74 ans | 58 | 31 | 27 | 10 | 12 | 21 | 15 |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 50-74 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus) | 50-54 ans | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| | 55-59 ans | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| | 60-64 ans | 14 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| | 65-69 ans | 17 | 12 | 5 | 3 | 1 | 9 | 4 |
| | 70-74 ans | 10 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 50-74 ans | 56 | 31 | 25 | 10 | 12 | 21 | 13 |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu | 50-54 ans | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| | 55-59 ans | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| | 60-64 ans | 14 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| | 65-69 ans | 14 | 10 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 |
| | 70-74 ans | 10 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 50-74 ans | 51 | 27 | 24 | 8 | 12 | 19 | 12 |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|--|------------------|------------|----------|----------|-------------------|----------|------------------------|----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1 | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 15 | 9 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2 | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| | 70-74 ans | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 12 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3 | 50-54 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | 70-74 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 14 | 6 | 8 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4 | 50-54 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| | 65-69 ans | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 10 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu | 50-54 ans | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| | 55-59 ans | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| | 60-64 ans | 13 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| | 65-69 ans | 17 | 12 | 5 | 3 | 1 | 9 | 4 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|------------------------------------|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 70-74 ans | 11 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| | 50-74 ans | 55 | 30 | 25 | 10 | 11 | 20 | 14 |
| A40- Perdus de vue | 50-54 ans | 12 | 8 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| | 55-59 ans | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| | 60-64 ans | 10 | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| | 65-69 ans | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 15 | 5 | 10 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| | 50-74 ans | 53 | 30 | 23 | 15 | 8 | 15 | 15 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Indicateurs sur la période 2012-2013 | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%) | 50-54 ans | 7,4 | 7,7 | 7,1 | 7,8 | 8,1 | 7,5 | 5,9 |
| | 55-59 ans | 7,3 | 7,8 | 6,9 | 10,1 | 9,5 | 7,1 | 6 |
| | 60-64 ans | 7,6 | 8,2 | 7 | 9,3 | 10,3 | 7,9 | 6,2 |
| | 65-69 ans | 7,4 | 7,3 | 7,4 | 11,1 | 10,7 | 6,5 | 6,7 |
| | 70-74 ans | 9,2 | 8,4 | 9,8 | 9,6 | 14,1 | 8,2 | 9 |
| | 50-74 ans | 7,7 | 7,9 | 7,5 | 9 | 9,6 | 7,4 | 6,8 |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%) | 50-54 ans | 2,1 | 2,1 | 2 | 2,8 | 2,6 | 1,2 | 1,3 |
| | 55-59 ans | 2 | 2,1 | 1,9 | 4,1 | 3,7 | 1,4 | 1,4 |
| | 60-64 ans | 1,6 | 1,8 | 1,4 | 2,9 | 3,5 | 1,5 | 0,9 |
| | 65-69 ans | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 4,1 | 3,8 | 1 | 1,1 |
| | 70-74 ans | 1,9 | 1,6 | 2,1 | 3 | 4,9 | 1,3 | 1,6 |
| | 50-74 ans | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 3,3 | 3,3 | 1,3 | 1,2 |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 72 | 72,3 | 71,7 | 63,6 | 68,3 | 83,9 | 77,5 |
| | 55-59 ans | 72,6 | 73,6 | 71,7 | 59,6 | 61,7 | 80,4 | 76,7 |
| | 60-64 ans | 79,2 | 78,3 | 80 | 68,6 | 66 | 81,4 | 86,1 |
| | 65-69 ans | 79 | 78,3 | 79,5 | 62,5 | 64,9 | 84,2 | 84,1 |
| | 70-74 ans | 79,4 | 81,4 | 78,2 | 68,6 | 65,4 | 83,8 | 81,9 |
| | 50-74 ans | 76,5 | 76,6 | 76,4 | 64 | 65,8 | 82,6 | 81,9 |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%) | 50-54 ans | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 0,7 |
| | 55-59 ans | 1,2 | 1,6 | 0,9 | 1,7 | 1,3 | 1,6 | 0,8 |
| | 60-64 ans | 1,5 | 2 | 1,1 | 2,2 | 1,3 | 2 | 1 |
| | 65-69 ans | 1,6 | 2 | 1,4 | 3 | 1,1 | 1,8 | 1,4 |
| | 70-74 ans | 1,8 | 2,2 | 1,6 | 3,3 | 2,6 | 2 | 1,4 |
| | 50-74 ans | 1,5 | 1,8 | 1,2 | 2 | 1,4 | 1,8 | 1,1 |
| 50-74 ans ** | 1,5 | 1,8 | 1,2 | . | . | . | . | |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie | 50-54 ans | 98,5 | 98,6 | 98,5 | 97,7 | 97,8 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 99,2 | 98,6 | 100 | 100 | 100 | 98,1 | 100 |
| | 60-64 ans | 97,1 | 98,1 | 95,7 | 100 | 100 | 97,5 | 94,3 |
| | 65-69 ans | 96,6 | 98,9 | 94,1 | 100 | 90,9 | 98,6 | 94,6 |
| | 70-74 ans | 95,5 | 96,2 | 94,7 | 100 | 94,7 | 95,2 | 94,6 |
| | 50-74 ans | 97,3 | 98,1 | 96,3 | 99,2 | 97,3 | 97,6 | 95,8 |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans | 85,9 | 82,9 | 89,2 | 79,1 | 91,1 | 88,9 | 85 |
| | 55-59 ans | 87 | 88,4 | 85,2 | 83,3 | 70,6 | 90,2 | 91,9 |
| | 60-64 ans | 92,4 | 92,2 | 92,5 | 91,7 | 88,2 | 92,4 | 94 |
| | 65-69 ans | 91,3 | 90,3 | 92,5 | 80 | 80 | 94,1 | 94,3 |
| | 70-74 ans | 88,4 | 92,1 | 84,5 | 94,1 | 88,9 | 91,5 | 83 |
| | 50-74 ans | 89,3 | 89,5 | 89 | 84,3 | 86 | 91,9 | 90,4 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Indicateurs sur la période 2012-2013 | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète | 50-54 ans | 94 | 91,4 | 96,6 | 91,2 | 97,6 | 91,7 | 94,1 |
| | 55-59 ans | 91,6 | 91,8 | 91,3 | 93,3 | 83,3 | 91,3 | 94,1 |
| | 60-64 ans | 93,6 | 92,6 | 95,2 | 90,9 | 93,3 | 93,2 | 95,7 |
| | 65-69 ans | 94,3 | 97,6 | 90,5 | 100 | 87,5 | 96,9 | 90,9 |
| | 70-74 ans | 90 | 92,9 | 86,7 | 87,5 | 87,5 | 94,4 | 86,4 |
| | 50-74 ans | 92,8 | 93,5 | 92 | 92,5 | 92,4 | 93,9 | 91,8 |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) |
| | 55-59 ans | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) |
| | 60-64 ans | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) |
| | 65-69 ans | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) |
| | 70-74 ans | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) |
| | 50-74 ans | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) |
| C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 102 | 88 | 117 | 101 | 124 | 69 | 99 |
| | 55-59 ans | 99 | 86 | 115 | 145 | 118 | 68 | 113 |
| | 60-64 ans | 72 | 75 | 66 | 55 | 54 | 81 | 70 |
| | 65-69 ans | 77 | 76 | 78 | 86 | 61 | 74 | 80 |
| | 70-74 ans | 86 | 89 | 83 | 65 | 90 | 96 | 80 |
| | 50-74 ans | 85 | 82 | 90 | 89 | 100 | 79 | 85 |
| C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 57.5 (42.5-110) | 57 (43-106) | 59.5 (42-112) | 57 (42-143) | 63 (45-108) 61.5 (48.5-138.5) | 58.5 (43.5-84.5) | 52 (41-113) |
| | 55-59 ans | 57 (42-84) | 57 (42-81) | 58 (42-84) | 72 (42-132) | 138.5 | 55.5 (42-75) | 53 (40-83) |
| | 60-64 ans | 55 (40-81) | 58 (42-81) | 53 (33-83) | 45 (42-66) | 50 (29-79) | 62 (44-87) | 53 (35-85) |
| | 65-69 ans | 56 (35-80) | 57 (35-75) | 56 (37-81) | 42 (31.5-88.5) | 49 (37-64) | 58.5 (41-74) | 56 (37-91) |
| | 70-74 ans | 57 (39-87) | 60 (44-91) | 51.5 (34-79) | 59 (33-94.5) | 39.5 (31-72.5) | 61.5 (46-91) | 52.5 (38-81) |
| | 50-74 ans | 56 (40-86.5) | 58 (42-85.5) | 53.5 (38.5-87) | 54 (39-96) | 54.5 (39-92) | 59 (43-82) | 53.5 (37-84) |
| C05- Pourcentage de perdus de vue | 50-54 ans | 8,8 | 11,3 | 6,1 | 13,6 | 6,5 | 7,4 | 5 |
| | 55-59 ans | 8,1 | 8,6 | 7,4 | 16,7 | 11,8 | 5,8 | 5,4 |
| | 60-64 ans | 5,7 | 6,7 | 4,3 | 8,3 | 0 | 6,2 | 5,7 |
| | 65-69 ans | 3,4 | 4,3 | 2,4 | 12 | 9,1 | 1,4 | 1,4 |
| | 70-74 ans | 9,7 | 6,3 | 13,3 | 5,9 | 10,5 | 6,5 | 14,3 |
| | 50-74 ans | 6,9 | 7,2 | 6,6 | 11,7 | 7,3 | 5,2 | 6,3 |
| D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 60-64 ans | 99,4 | 98,9 | 100 | 95,5 | 100 | 100 | 100 |
| | 65-69 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 70-74 ans | 98,5 | 98,6 | 98,3 | 100 | 100 | 98,1 | 97,7 |
| | 50-74 ans | 99,6 | 99,5 | 99,7 | 99,1 | 100 | 99,6 | 99,5 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Indicateurs sur la période 2012-2013 | | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | Age | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 49,6 | 41,4 | 57,6 | 47,1 | 61,9 | 33,3 | 47,1 |
| | 55-59 ans | 33,3 | 25,8 | 43,5 | 13,3 | 50 | 29,8 | 41,2 |
| | 60-64 ans | 38 | 38,9 | 36,5 | 40,9 | 26,7 | 38,4 | 39,6 |
| | 65-69 ans | 32,5 | 21,2 | 45,3 | 15 | 25 | 23,1 | 47,8 |
| | 70-74 ans | 36,6 | 35,7 | 37,7 | 31,3 | 37,5 | 37 | 37,8 |
| | 50-74 ans | 37,7 | 32,4 | 44,1 | 32,7 | 47,3 | 32,3 | 42,7 |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm | 50-54 ans | 4,3 | 5,2 | 3,4 | 2,9 | 2,4 | 8,3 | 5,9 |
| | 55-59 ans | 12 | 14,5 | 8,7 | 26,7 | 0 | 10,6 | 11,8 |
| | 60-64 ans | 5,1 | 1,1 | 11,1 | 0 | 20 | 1,4 | 8,3 |
| | 65-69 ans | 8,1 | 7,1 | 9,3 | 0 | 0 | 9,2 | 10,4 |
| | 70-74 ans | 5,3 | 1,4 | 9,8 | 0 | 12,5 | 1,9 | 8,9 |
| | 50-74 ans | 6,8 | 5,4 | 8,6 | 4,7 | 6,5 | 5,7 | 9,5 |
| D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm | 50-54 ans | 0,9 | 1,7 | 0 | 2,9 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0,1 | 0,3 | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 0 |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 8,5 | 8,6 | 8,5 | 2,9 | 7,1 | 16,7 | 11,8 |
| | 55-59 ans | 14,8 | 16,1 | 13 | 20 | 8,3 | 14,9 | 14,7 |
| | 60-64 ans | 17,1 | 20 | 12,7 | 13,6 | 6,7 | 21,9 | 14,6 |
| | 65-69 ans | 16,3 | 21,2 | 10,7 | 20 | 37,5 | 21,5 | 7,5 |
| | 70-74 ans | 13 | 15,7 | 9,8 | 18,8 | 18,8 | 14,8 | 6,7 |
| | 50-74 ans | 14,2 | 17 | 10,9 | 13,1 | 11,8 | 18,6 | 10,4 |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 25,6 | 32,8 | 18,6 | 35,3 | 16,7 | 29,2 | 23,5 |
| | 55-59 ans | 25 | 33,9 | 13 | 26,7 | 8,3 | 36,2 | 14,7 |
| | 60-64 ans | 25,9 | 28,4 | 22,2 | 27,3 | 13,3 | 28,8 | 25 |
| | 65-69 ans | 26,9 | 29,4 | 24 | 40 | 25 | 26,2 | 23,9 |
| | 70-74 ans | 32,1 | 40 | 23 | 43,8 | 18,8 | 38,9 | 24,4 |
| | 50-74 ans | 27,2 | 32,4 | 20,7 | 34,6 | 16,1 | 31,6 | 22,7 |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer | 50-54 ans | 6,8 | 8,6 | 5,1 | 5,9 | 7,1 | 12,5 | 0 |
| | 55-59 ans | 11,1 | 8,1 | 15,2 | 13,3 | 25 | 6,4 | 11,8 |
| | 60-64 ans | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 13,6 | 13,3 | 8,2 | 8,3 |
| | 65-69 ans | 13,1 | 16,5 | 9,3 | 20 | 12,5 | 15,4 | 9 |
| | 70-74 ans | 9,9 | 5,7 | 14,8 | 6,3 | 12,5 | 5,6 | 15,6 |
| | 50-74 ans | 10,2 | 10 | 10,5 | 11,2 | 11,8 | 9,5 | 10 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Indicateurs sur la période 2012-2013 | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique) | 50-54 ans | 0,9 | 0 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| | 55-59 ans | 2,8 | 0 | 6,5 | 0 | 8,3 | 0 | 5,9 |
| | 60-64 ans | 1,3 | 0 | 3,2 | 0 | 6,7 | 0 | 2,1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0,9 | 0 | 2 | 0 | 2,2 | 0 | 1,9 |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 2,6 | 1,7 | 3,4 | 2,9 | 2,4 | 0 | 5,9 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1,3 | 1,1 | 1,6 | 0 | 6,7 | 1,4 | 0 |
| | 65-69 ans | 2,5 | 3,5 | 1,3 | 5 | 0 | 3,1 | 1,5 |
| | 70-74 ans | 1,5 | 0 | 3,3 | 0 | 0 | 0 | 4,4 |
| | 50-74 ans | 1,6 | 1,4 | 2 | 1,9 | 2,2 | 1,1 | 1,9 |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1,3 | 1,1 | 1,6 | 4,5 | 0 | 0 | 2,1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 0 | 0 | 1,9 | 2,2 |
| | 50-74 ans | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0 | 0,4 | 0,9 |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 3,7 | 4,8 | 2,7 | 4,6 | 3,1 | 5 | 2,2 |
| | 55-59 ans | 4,3 | 7,1 | 2,1 | 6,4 | 1,5 | 7,3 | 2,3 |
| | 60-64 ans | 5,8 | 8,9 | 3,3 | 8,2 | 2,2 | 9,1 | 3,6 |
| | 65-69 ans | 6,3 | 9 | 4,2 | 14,4 | 5 | 7,9 | 4 |
| | 70-74 ans | 7 | 10,7 | 4,2 | 19,4 | 8,3 | 9,3 | 3,5 |
| | 50-74 ans | 5,3 | 8 | 3,3 | 8,1 | 3,4 | 7,9 | 3,2 |
| 50-74 ans ** | 5,3 | 7,7 | 3,1 | . | . | . | . | |
| D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 2,7 | 3,8 | 1,8 | 4,3 | 2,1 | 3,2 | 1,5 |
| | 55-59 ans | 2,7 | 4,8 | 1,1 | 3,7 | 0,7 | 5,2 | 1,1 |
| | 60-64 ans | 3,5 | 5,2 | 2,1 | 5,4 | 1,5 | 5,1 | 2,3 |
| | 65-69 ans | 3,9 | 5,3 | 2,9 | 9,6 | 2 | 4,3 | 3,1 |
| | 70-74 ans | 5 | 7,7 | 2,9 | 13,6 | 4,2 | 6,7 | 2,7 |
| | 50-74 ans | 3,5 | 5,2 | 2,2 | 5,8 | 2 | 5 | 2,2 |
| 50-74 ans ** | 3,5 | 5,1 | 2 | . | . | . | . | |
| D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 2,3 | 3,6 | 1,2 | 3,9 | 1,2 | 3,2 | 1,1 |
| | 55-59 ans | 2,3 | 4,1 | 0,9 | 3,7 | 0,7 | 4,3 | 0,9 |
| | 60-64 ans | 3,1 | 4,8 | 1,8 | 5,4 | 1,5 | 4,7 | 1,9 |
| | 65-69 ans | 3,6 | 4,8 | 2,6 | 8,4 | 1 | 4,1 | 2,9 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Indicateurs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|---------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 70-74 ans | 4 | 5,8 | 2,7 | 11,7 | 4,2 | 4,8 | 2,5 |
| | 50-74 ans | 3 | 4,6 | 1,8 | 5,4 | 1,4 | 4,3 | 1,9 |
| | 50-74 ans ** | 3 | 4,5 | 1,7 | . | . | . | . |
| D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 2,3 | 3,6 | 1,2 | 3,9 | 1,2 | 3,2 | 1,1 |
| | 55-59 ans | 2,6 | 4,8 | 0,9 | 5,5 | 0,7 | 4,6 | 0,9 |
| | 60-64 ans | 3,6 | 5,6 | 2,1 | 5,4 | 1,5 | 5,6 | 2,3 |
| | 65-69 ans | 3,7 | 4,8 | 2,7 | 8,4 | 1 | 4,1 | 3,1 |
| | 70-74 ans | 4,6 | 7,1 | 2,7 | 13,6 | 4,2 | 6,1 | 2,5 |
| | 50-74 ans | 3,3 | 5,1 | 1,9 | 5,8 | 1,4 | 4,8 | 2,1 |
| | 50-74 ans ** | 3,3 | 5 | 1,8 | . | . | . | . |
| D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 0,7 | 1 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,4 | 0 |
| | 55-59 ans | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,8 | 2,2 | 0,9 | 0,9 |
| | 60-64 ans | 1,4 | 1,7 | 1,1 | 2,7 | 2,2 | 1,5 | 0,8 |
| | 65-69 ans | 1,9 | 2,9 | 1,1 | 4,8 | 1 | 2,5 | 1,2 |
| | 70-74 ans | 1,5 | 1,1 | 1,9 | 1,9 | 2,8 | 1 | 1,7 |
| | 50-74 ans | 1,3 | 1,6 | 1,1 | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 1 |
| | 50-74 ans ** | 3,3 | 1,5 | 1,1 | . | . | . | . |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009