

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	10132	4652	5480	2646	3000	2006	2480
	55-59 ans	8899	3878	5021	721	815	3157	4206
	60-64 ans	11012	4781	6231	796	922	3985	5309
	65-69 ans	10473	4637	5836	573	620	4064	5216
	70-74 ans	7931	3545	4386	315	368	3230	4018
	50-74 ans	48447	21493	26954	5051	5725	16442	21229
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	432	218	214	133	137	85	77
	55-59 ans	342	160	182	35	36	125	146
	60-64 ans	438	197	241	46	56	151	185
	65-69 ans	383	171	212	27	39	144	173
	70-74 ans	385	181	204	31	21	150	183
	50-74 ans	1980	927	1053	272	289	655	764
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	260	126	134	64	82	62	52
	55-59 ans	196	90	106	11	17	79	89
	60-64 ans	290	135	155	27	28	108	127
	65-69 ans	238	109	129	10	11	99	118
	70-74 ans	227	102	125	15	10	87	115
	50-74 ans	1211	562	649	127	148	435	501
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	172	92	80	69	55	23	25
	55-59 ans	146	70	76	24	19	46	57
	60-64 ans	148	62	86	19	28	43	58
	65-69 ans	145	62	83	17	28	45	55
	70-74 ans	158	79	79	16	11	63	68
	50-74 ans	769	365	404	145	141	220	263
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	9960	4560	5400	2577	2945	1983	2455
	55-59 ans	8753	3808	4945	697	796	3111	4149
	60-64 ans	10864	4719	6145	777	894	3942	5251
	65-69 ans	10328	4575	5753	556	592	4019	5161
	70-74 ans	7773	3466	4307	299	357	3167	3950

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	47678	21128	26550	4906	5584	16222	20966
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	189	112	77	66	46	46	31
	55-59 ans	181	100	81	18	19	82	62
	60-64 ans	222	124	98	26	11	98	87
	65-69 ans	223	113	110	13	11	100	99
	70-74 ans	182	109	73	16	8	93	65
	50-74 ans	997	558	439	139	95	419	344
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	187	110	77	65	46	45	31
	55-59 ans	176	97	79	17	18	80	61
	60-64 ans	214	117	97	25	11	92	86
	65-69 ans	216	108	108	11	11	97	97
	70-74 ans	175	105	70	15	8	90	62
	50-74 ans	968	537	431	133	94	404	337
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	163	95	68	55	40	40	28
	55-59 ans	157	88	69	15	16	73	53
	60-64 ans	192	102	90	20	9	82	81
	65-69 ans	198	98	100	9	10	89	90
	70-74 ans	156	93	63	13	7	80	56
	50-74 ans	866	476	390	112	82	364	308
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	135	79	56	46	31	33	25
	55-59 ans	122	69	53	12	13	57	40
	60-64 ans	160	89	71	18	5	71	66
	65-69 ans	169	85	84	8	9	77	75
	70-74 ans	127	78	49	10	5	68	44
	50-74 ans	713	400	313	94	63	306	250
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	162	95	67	55	39	40	28
	55-59 ans	152	86	66	15	15	71	51
	60-64 ans	191	102	89	20	9	82	80
	65-69 ans	195	96	99	9	10	87	89
	70-74 ans	154	91	63	13	7	78	56
	50-74 ans	854	470	384	112	80	358	304
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	5	2	3	0	1	2	2
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	12	6	6	0	2	6	4
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		50-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	150	90	60	54	33	36	27	
	55-59 ans	136	78	58	12	14	66	44	
	60-64 ans	172	95	77	19	5	76	72	
	65-69 ans	182	91	91	9	9	82	82	
	70-74 ans	142	87	55	11	6	76	49	
	50-74 ans	782	441	341	105	67	336	274	
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	164	96	68	55	40	41	28	
	55-59 ans	157	88	69	15	16	73	53	
	60-64 ans	192	102	90	20	9	82	81	
	65-69 ans	199	98	101	9	10	89	91	
	70-74 ans	157	94	63	14	7	80	56	
	50-74 ans	869	478	391	113	82	365	309	
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	80	40	40	27	20	13	20	
	55-59 ans	57	31	26	4	5	27	21	
	60-64 ans	71	25	46	6	5	19	41	
	65-69 ans	85	29	56	2	7	27	49	
	70-74 ans	55	30	25	4	1	26	24	
	50-74 ans	348	155	193	43	38	112	155	
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	8	5	3	2	2	3	1	
	55-59 ans	6	4	2	1	0	3	2	
	60-64 ans	8	5	3	0	0	5	3	
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1	
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0	
	50-74 ans	29	20	9	3	2	17	7	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	9	4	5	1	4	3	1
	55-59 ans	12	5	7	1	1	4	6
	60-64 ans	21	12	9	3	0	9	9
	65-69 ans	16	7	9	0	0	7	9
	70-74 ans	16	11	5	2	2	9	3
	50-74 ans	74	39	35	7	7	32	28
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	22	19	3	13	0	6	3
	55-59 ans	28	21	7	4	3	17	4
	60-64 ans	26	20	6	6	0	14	6
	65-69 ans	24	18	6	3	0	15	6
	70-74 ans	22	14	8	2	2	12	6
	50-74 ans	122	92	30	28	5	64	25
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	4	3	1	1	1	2	0
	55-59 ans	8	6	2	1	1	5	1
	60-64 ans	14	8	6	1	0	7	6
	65-69 ans	15	9	6	1	0	8	6
	70-74 ans	16	11	5	4	0	7	5
	50-74 ans	57	37	20	8	2	29	18

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	23	17	6	8	4	9	2
	55-59 ans	21	11	10	1	3	10	7
	60-64 ans	29	22	7	3	0	19	7
	65-69 ans	28	17	11	2	1	15	10
	70-74 ans	26	17	9	0	1	17	8
	50-74 ans	127	84	43	14	9	70	34
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	13	5	8	1	7	4	1
	55-59 ans	21	10	11	3	2	7	9
	60-64 ans	20	8	12	1	4	7	8
	65-69 ans	17	8	9	0	1	8	8
	70-74 ans	15	6	9	2	1	4	8
	50-74 ans	86	37	49	7	15	30	34
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	32	24	8	14	4	10	4
	55-59 ans	41	27	14	5	4	22	10
	60-64 ans	49	34	15	9	0	25	15
	65-69 ans	40	25	15	3	0	22	15
	70-74 ans	38	25	13	4	4	21	9
	50-74 ans	200	135	65	35	12	100	53
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux)	50-54 ans	22	19	3	13	0	6	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	28	21	7	4	3	17	4
	60-64 ans	26	20	6	6	0	14	6
	65-69 ans	24	18	6	3	0	15	6
	70-74 ans	22	14	8	2	2	12	6
	50-74 ans	122	92	30	28	5	64	25
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	20	18	2	12	0	6	2
	55-59 ans	24	18	6	2	2	16	4
	60-64 ans	20	15	5	5	0	10	5
	65-69 ans	20	15	5	3	0	12	5
	70-74 ans	11	8	3	2	1	6	2
	50-74 ans	95	74	21	24	3	50	18
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	20	18	2	12	0	6	2
	55-59 ans	25	19	6	2	2	17	4
	60-64 ans	21	16	5	5	0	11	5
	65-69 ans	22	16	6	3	0	13	6
	70-74 ans	13	9	4	2	1	7	3
	50-74 ans	101	78	23	24	3	54	20
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	4	3	1	1	1	2	0
	55-59 ans	8	6	2	1	1	5	1
	60-64 ans	14	8	6	1	0	7	6
	65-69 ans	15	9	6	1	0	8	6
	70-74 ans	16	11	5	4	0	7	5
	50-74 ans	57	37	20	8	2	29	18
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	4	3	1	1	1	2	0
	55-59 ans	8	6	2	1	1	5	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	13	7	6	1	0	6	6
	65-69 ans	13	9	4	1	0	8	4
	70-74 ans	15	10	5	4	0	6	5
	50-74 ans	53	35	18	8	2	27	16
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	4	3	1	1	1	2	0
	55-59 ans	8	6	2	1	1	5	1
	60-64 ans	9	5	4	1	0	4	4
	65-69 ans	12	8	4	1	0	7	4
	70-74 ans	11	8	3	3	0	5	3
	50-74 ans	44	30	14	7	2	23	12
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	50-74 ans	9	5	4	1	0	4	4
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	7	4	3	1	0	3	3
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	6	5	1	1	0	4	1
	60-64 ans	6	3	3	0	0	3	3
	65-69 ans	8	5	3	0	0	5	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	10	7	3	4	0	3	3
	50-74 ans	30	20	10	5	0	15	10
A40- Perdus de vue	50-54 ans	20	12	8	8	6	4	2
	55-59 ans	12	8	4	1	1	7	3
	60-64 ans	14	7	7	4	2	3	5
	65-69 ans	9	3	6	1	1	2	5
	70-74 ans	13	10	3	2	1	8	2
	50-74 ans	68	40	28	16	11	24	17

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,3	4,7	3,9	5	4,6	4,2	3,1
	55-59 ans	3,8	4,1	3,6	4,9	4,4	4	3,5
	60-64 ans	4	4,1	3,9	5,8	6,1	3,8	3,5
	65-69 ans	3,7	3,7	3,6	4,7	6,3	3,5	3,3
	70-74 ans	4,9	5,1	4,7	9,8	5,7	4,6	4,6
	50-74 ans	4,1	4,3	3,9	5,4	5	4	3,6
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,7	2	1,5	2,6	1,8	1,1	1
	55-59 ans	1,6	1,8	1,5	3,3	2,3	1,5	1,4
	60-64 ans	1,3	1,3	1,4	2,4	3	1,1	1,1
	65-69 ans	1,4	1,3	1,4	3	4,5	1,1	1,1
	70-74 ans	2	2,2	1,8	5,1	3	2	1,7
	50-74 ans	1,6	1,7	1,5	2,9	2,5	1,3	1,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	60,2	57,8	62,6	48,1	59,9	72,9	67,5
	55-59 ans	57,3	56,3	58,2	31,4	47,2	63,2	61
	60-64 ans	66,2	68,5	64,3	58,7	50	71,5	68,6
	65-69 ans	62,1	63,7	60,8	37	28,2	68,8	68,2
	70-74 ans	59	56,4	61,3	48,4	47,6	58	62,8
	50-74 ans	61,2	60,6	61,6	46,7	51,2	66,4	65,6
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,9	2,5	1,4	2,6	1,6	2,3	1,3
	55-59 ans	2,1	2,6	1,6	2,6	2,4	2,6	1,5
	60-64 ans	2	2,6	1,6	3,3	1,2	2,5	1,7
	65-69 ans	2,2	2,5	1,9	2,3	1,9	2,5	1,9
	70-74 ans	2,3	3,1	1,7	5,4	2,2	2,9	1,6
	50-74 ans	2,1	2,6	1,7	2,8	1,7	2,6	1,6
50-74 ans **	2,1	2,6	1,6	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,9	98,2	100	98,5	100	97,8	100
	55-59 ans	97,2	97	97,5	94,4	94,7	97,6	98,4
	60-64 ans	96,4	94,4	99	96,2	100	93,9	98,9
	65-69 ans	96,9	95,6	98,2	84,6	100	97	98
	70-74 ans	96,2	96,3	95,9	93,8	100	96,8	95,4
	50-74 ans	97,1	96,2	98,2	95,7	98,9	96,4	98
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	87,2	86,4	88,3	84,6	87	88,9	90,3
	55-59 ans	89,2	90,7	87,3	88,2	88,9	91,3	86,9
	60-64 ans	89,7	87,2	92,8	80	81,8	89,1	94,2
	65-69 ans	91,7	90,7	92,6	81,8	90,9	91,8	92,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	89,1	88,6	90	86,7	87,5	88,9	90,3
	50-74 ans	89,5	88,6	90,5	84,2	87,2	90,1	91,4
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	82,8	83,2	82,4	83,6	77,5	82,5	89,3
	55-59 ans	77,7	78,4	76,8	80	81,3	78,1	75,5
	60-64 ans	83,3	87,3	78,9	90	55,6	86,6	81,5
	65-69 ans	85,4	86,7	84	88,9	90	86,5	83,3
	70-74 ans	81,4	83,9	77,8	76,9	71,4	85	78,6
	50-74 ans	82,3	84	80,3	83,9	76,8	84,1	81,2
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	1
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
	50-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	1 (0-1)
	55-59 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	60-64 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	65-69 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	1 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	70-74 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	1 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	50-74 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)				
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	66	68	62	69	65	67	58
	55-59 ans	64	65	64	58	92	66	55
	60-64 ans	56	55	57	46	52	57	58
	65-69 ans	60	64	56	53	48	65	57
	70-74 ans	69	63	78	91	95	58	75
	50-74 ans	63	63	62	65	69	62	60
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	50 (34-73)	50 (33-73)	53.5 (34-73.5)	50 (35-81)	52.5 (34-70)	48.5 (32.5-68.5)	56.5 (36.5-74.5)
	55-59 ans	43.5 (32-68)	41 (30.5-69.5)	48 (35.5-67)	45 (29-66)	64.5 (45-88.5)	40 (32-70)	44 (30-62.5)
	60-64 ans	46 (29-64.5)	45.5 (30-66)	47.5 (27-64)	43 (30.5-55.5)	51 (42-64)	48 (30-66)	45 (27-64)
	65-69 ans	44 (31-65)	44 (32-67)	44 (30-63.5)	40 (30-68)	47.5 (28-65)	44 (34-66)	42 (30-63)
	70-74 ans	50 (34-77)	48 (32-74)	57 (34-79)	57 (48-77)	62 (34-79)	43 (31.5-69)	55.5 (34.5-80.5)
	50-74 ans	46 (32-68)	45 (32-68)	49 (32-68)	48 (34-69)	53.5 (36-75)	44 (32-68)	46 (30-67)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	10,6	10,7	10,4	12,1	13	8,7	6,5
	55-59 ans	6,6	8	4,9	5,6	5,3	8,5	4,8
	60-64 ans	6,3	5,6	7,1	15,4	18,2	3,1	5,7
	65-69 ans	4	2,7	5,5	7,7	9,1	2	5,1
	70-74 ans	7,1	9,2	4,1	12,5	12,5	8,6	3,1
	50-74 ans	6,8	7,2	6,4	11,5	11,6	5,7	4,9
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	92	94,7	88,2	98,2	82,5	90	96,4
	55-59 ans	86,6	88,6	84,1	80	87,5	90,4	83

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	89,6	93,1	85,6	95	55,6	92,7	88,9
	65-69 ans	91,9	92,9	91	100	90	92,1	91,1
	70-74 ans	91	93,5	87,3	84,6	85,7	95	87,5
	50-74 ans	90,3	92,6	87,4	93,8	81,7	92,3	89
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	48,8	41,7	58,8	49,1	50	31,7	71,4
	55-59 ans	36,3	35,2	37,7	26,7	31,3	37	39,6
	60-64 ans	37	24,5	51,1	30	55,6	23,2	50,6
	65-69 ans	42,7	29,6	55,4	22,2	70	30,3	53,8
	70-74 ans	35	31,9	39,7	28,6	14,3	32,5	42,9
	50-74 ans	40	32,4	49,4	38,1	46,3	30,7	50,2
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	4,9	5,2	4,4	3,6	5	7,3	3,6
	55-59 ans	3,8	4,5	2,9	6,7	0	4,1	3,8
	60-64 ans	4,2	4,9	3,3	0	0	6,1	3,7
	65-69 ans	2	3,1	1	0	0	3,4	1,1
	70-74 ans	1,9	3,2	0	0	0	3,8	0
	50-74 ans	3,3	4,2	2,3	2,7	2,4	4,7	2,3
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,6	1	0	0	0	2,4	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,5	1	0	0	0	1,1	0
	70-74 ans	0,6	1,1	0	0	0	1,3	0
	50-74 ans	0,3	0,6	0	0	0	0,8	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	5,5	4,2	7,4	1,8	10	7,3	3,6
	55-59 ans	7,6	5,7	10,1	6,7	6,3	5,5	11,3
	60-64 ans	10,9	11,8	10	15	0	11	11,1
	65-69 ans	8	7,1	8,9	0	0	7,9	9,9
	70-74 ans	10,2	11,7	7,9	14,3	28,6	11,3	5,4
	50-74 ans	8,5	8,2	9	6,2	8,5	8,8	9,1
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	13,4	19,8	4,4	23,6	0	14,6	10,7
	55-59 ans	17,8	23,9	10,1	26,7	18,8	23,3	7,5
	60-64 ans	13,5	19,6	6,7	30	0	17,1	7,4
	65-69 ans	12,1	18,4	5,9	33,3	0	16,9	6,6
	70-74 ans	14	14,9	12,7	14,3	28,6	15	10,7
	50-74 ans	14	19,2	7,7	24,8	6,1	17,5	8,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,4	3,1	1,5	1,8	2,5	4,9	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	5,1	6,8	2,9	6,7	6,3	6,8	1,9
	60-64 ans	7,3	7,8	6,7	5	0	8,5	7,4
	65-69 ans	7,5	9,2	5,9	11,1	0	9	6,6
	70-74 ans	10,2	11,7	7,9	28,6	0	8,8	8,9
	50-74 ans	6,6	7,7	5,1	7,1	2,4	7,9	5,8
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,6	0	1,4	0	0	0	1,9
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0	0,3	0	0	0	0,3
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	14	17,7	8,8	14,5	10	22	7,1
	55-59 ans	13,4	12,5	14,5	6,7	18,8	13,7	13,2
	60-64 ans	15,1	21,6	7,8	15	0	23,2	8,6
	65-69 ans	14,1	17,3	10,9	22,2	10	16,9	11
	70-74 ans	16,6	18,1	14,3	0	14,3	21,3	14,3
	50-74 ans	14,6	17,6	11	12,4	11	19,2	11
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	7,9	5,2	11,8	1,8	17,5	9,8	3,6
	55-59 ans	13,4	11,4	15,9	20	12,5	9,6	17
	60-64 ans	10,4	7,8	13,3	5	44,4	8,5	9,9
	65-69 ans	8,5	8,2	8,9	0	10	9	8,8
	70-74 ans	9,6	6,4	14,3	14,3	14,3	5	14,3
	50-74 ans	9,9	7,7	12,5	6,2	18,3	8,2	11
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,2	5,3	1,5	5,4	1,4	5	1,6
	55-59 ans	4,7	7,1	2,8	7,2	5	7,1	2,4
	60-64 ans	4,5	7,2	2,4	11,6	0	6,3	2,9
	65-69 ans	3,9	5,5	2,6	5,4	0	5,5	2,9
	70-74 ans	4,9	7,2	3	13,4	11,2	6,6	2,3
	50-74 ans	4,2	6,4	2,4	7,1	2,1	6,2	2,5
	50-74 ans **	4,3	6,4	2,4
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,2	4,2	0,6	5	0	3	1,2
	55-59 ans	3,2	5,5	1,4	5,7	3,8	5,5	1
	60-64 ans	2,4	4,2	1	7,7	0	3,6	1,1
	65-69 ans	2,3	3,9	1	5,4	0	3,7	1,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	2,8	4	1,9	6,7	5,6	3,8	1,5
	50-74 ans	2,6	4,4	1,1	5,7	0,9	3,9	1,2
	50-74 ans **	2,7	4,5	1,1
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2	3,9	0,4	4,7	0	3	0,8
	55-59 ans	2,7	4,7	1,2	2,9	2,5	5,1	1
	60-64 ans	1,8	3,2	0,8	6,4	0	2,5	1
	65-69 ans	1,9	3,3	0,9	5,4	0	3	1
	70-74 ans	1,4	2,3	0,7	6,7	2,8	1,9	0,5
	50-74 ans	2	3,5	0,8	4,9	0,5	3,1	0,9
	50-74 ans **	2,2	3,7	0,8
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2	3,9	0,4	4,7	0	3	0,8
	55-59 ans	2,9	5	1,2	2,9	2,5	5,5	1
	60-64 ans	1,9	3,4	0,8	6,4	0	2,8	1
	65-69 ans	2,1	3,5	1	5,4	0	3,2	1,2
	70-74 ans	1,7	2,6	0,9	6,7	2,8	2,2	0,8
	50-74 ans	2,1	3,7	0,9	4,9	0,5	3,3	1
	50-74 ans **	2,3	3,8	0,9
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,7	0,2	0,4	0,3	1	0
	55-59 ans	0,9	1,6	0,4	1,4	1,3	1,6	0,2
	60-64 ans	1,3	1,7	1	1,3	0	1,8	1,1
	65-69 ans	1,5	2	1	1,8	0	2	1,2
	70-74 ans	2,1	3,2	1,2	13,4	0	2,2	1,3
	50-74 ans	1,2	1,8	0,8	1,6	0,4	1,8	0,9
	50-74 ans **	2,3	1,6	0,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009