

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	897	475	422	297	260	178	162
	55-59 ans	900	453	447	96	82	357	365
	60-64 ans	1 146	588	558	120	100	468	458
	65-69 ans	938	466	472	75	58	391	414
	70-74 ans	835	419	416	59	40	360	376
	50-74 ans	4 716	2 401	2 315	647	540	1 754	1 775
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	903	477	426	299	262	178	164
	55-59 ans	903	455	448	97	82	358	366
	60-64 ans	1 152	592	560	120	100	472	460
	65-69 ans	949	468	481	75	60	393	421
	70-74 ans	842	423	419	59	40	364	379
	50-74 ans	4 749	2 415	2 334	650	544	1 765	1 790
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	487	222	265	134	166	88	99
	55-59 ans	406	142	264	15	47	127	217
	60-64 ans	472	182	290	28	41	154	249
	65-69 ans	380	131	249	17	34	114	215
	70-74 ans	317	116	201	10	19	106	182
	50-74 ans	2 062	793	1 269	204	307	589	962
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	81	44	37	30	22	14	15
	55-59 ans	97	53	44	4	9	49	35
	60-64 ans	118	67	51	14	9	53	42
	65-69 ans	84	40	44	3	4	37	40
	70-74 ans	49	26	23	5	3	21	20
	50-74 ans	429	230	199	56	47	174	152
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	9	6	3	2	0	4	3
	60-64 ans	8	4	4	2	1	2	3
	65-69 ans	4	4	0	0	0	4	0
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	29	19	10	6	3	13	7
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	110	65	45	37	23	28	22
	55-59 ans	124	76	48	19	8	57	40

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	185	104	81	17	17	87	64
	65-69 ans	147	90	57	11	7	79	50
	70-74 ans	150	80	70	11	3	69	67
	50-74 ans	716	415	301	95	58	320	243
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	147	96	51	68	32	28	19
	55-59 ans	156	106	50	31	8	75	42
	60-64 ans	223	144	79	35	19	109	60
	65-69 ans	190	117	73	20	9	97	64
	70-74 ans	169	105	64	19	6	86	58
	50-74 ans	885	568	317	173	74	395	243
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	37	24	13	15	11	9	2
	55-59 ans	68	50	18	16	6	34	12
	60-64 ans	98	66	32	23	8	43	24
	65-69 ans	100	61	39	22	4	39	35
	70-74 ans	99	60	39	10	6	50	33
	50-74 ans	402	261	141	86	35	175	106
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	24	19	5	8	3	11	2
	55-59 ans	32	17	15	7	4	10	11
	60-64 ans	34	20	14	0	2	20	12
	65-69 ans	26	17	9	2	2	15	7
	70-74 ans	25	17	8	4	0	13	8
	50-74 ans	141	90	51	21	11	69	40
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	8	2	6	2	3	0	3
	55-59 ans	8	2	6	2	0	0	6
	60-64 ans	8	3	5	1	0	2	5
	65-69 ans	12	5	7	0	0	5	7
	70-74 ans	21	13	8	0	3	13	5
	50-74 ans	57	25	32	5	6	20	26
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	8	6	2	3	0	3	2
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	257	161	96	105	55	56	41
	55-59 ans	280	182	98	50	16	132	82
	60-64 ans	408	248	160	52	36	196	124
	65-69 ans	337	207	130	31	16	176	114
	70-74 ans	319	185	134	30	9	155	125
	50-74 ans	1 601	983	618	268	132	715	486
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	147	96	51	68	32	28	19
	55-59 ans	156	106	50	31	8	75	42
	60-64 ans	223	144	79	35	19	109	60
	65-69 ans	190	117	73	20	9	97	64
	70-74 ans	169	105	64	19	6	86	58
	50-74 ans	885	568	317	173	74	395	243
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	119	81	38	59	24	22	14
	55-59 ans	128	88	40	28	8	60	32
	60-64 ans	188	118	70	30	16	88	54
	65-69 ans	147	90	57	18	8	72	49
	70-74 ans	135	83	52	15	5	68	47
	50-74 ans	717	460	257	150	61	310	196
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	37	24	13	15	11	9	2
	55-59 ans	68	50	18	16	6	34	12
	60-64 ans	98	66	32	23	8	43	24
	65-69 ans	100	61	39	22	4	39	35
	70-74 ans	99	60	39	10	6	50	33
	50-74 ans	402	261	141	86	35	175	106

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,4	99,6	99,3	99,3	99,6	100,0	98,8
	55-59 ans	99,9	99,8	100,0	99,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	99,4	99,8	99,0	100,0	100,0	99,7	98,8
	70-74 ans	99,6	100,0	99,3	100,0	100,0	100,0	99,2
	50-74 ans	99,7	99,8	99,5	99,5	99,8	99,9	99,4
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	53,9	46,5	62,2	44,8	63,4	49,4	60,4
	55-59 ans	45,0	31,2	58,9	15,5	57,3	35,5	59,3
	60-64 ans	41,0	30,7	51,8	23,3	41,0	32,6	54,1
	65-69 ans	40,0	28,0	51,8	22,7	56,7	29,0	51,1
	70-74 ans	37,6	27,4	48,0	16,9	47,5	29,1	48,0
	50-74 ans	43,4	32,8	54,4	31,4	56,4	33,4	53,7
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	9,0	9,2	8,7	10,0	8,4	7,9	9,1
	55-59 ans	10,7	11,6	9,8	4,1	11,0	13,7	9,6
	60-64 ans	10,2	11,3	9,1	11,7	9,0	11,2	9,1
	65-69 ans	8,9	8,5	9,1	4,0	6,7	9,4	9,5
	70-74 ans	5,8	6,1	5,5	8,5	7,5	5,8	5,3
	50-74 ans	9,0	9,5	8,5	8,6	8,6	9,9	8,5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,4	0,4	0,5	0,7	0,8	0,0	0,0
	55-59 ans	1,0	1,3	0,7	2,1	0,0	1,1	0,8
	60-64 ans	0,7	0,7	0,7	1,7	1,0	0,4	0,7
	65-69 ans	0,4	0,9	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
	70-74 ans	0,5	0,7	0,2	0,0	0,0	0,8	0,3
	50-74 ans	0,6	0,8	0,4	0,9	0,6	0,7	0,4
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,2	13,6	10,6	12,4	8,8	15,7	13,4
	55-59 ans	13,7	16,7	10,7	19,6	9,8	15,9	10,9
	60-64 ans	16,1	17,6	14,5	14,2	17,0	18,4	13,9
	65-69 ans	15,5	19,2	11,9	14,7	11,7	20,1	11,9
	70-74 ans	17,8	18,9	16,7	18,6	7,5	19,0	17,7
	50-74 ans	15,1	17,2	12,9	14,6	10,7	18,1	13,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	16,3	20,1	12,0	22,7	12,2	15,7	11,6
	55-59 ans	17,3	23,3	11,2	32,0	9,8	20,9	11,5
	60-64 ans	19,4	24,3	14,1	29,2	19,0	23,1	13,0
	65-69 ans	20,0	25,0	15,2	26,7	15,0	24,7	15,2
	70-74 ans	20,1	24,8	15,3	32,2	15,0	23,6	15,3
	50-74 ans	18,6	23,5	13,6	26,6	13,6	22,4	13,6
	D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,1	5,0	3,1	5,0	4,2	5,1
55-59 ans		7,5	11,0	4,0	16,5	7,3	9,5	3,3
60-64 ans		8,5	11,1	5,7	19,2	8,0	9,1	5,2
65-69 ans		10,5	13,0	8,1	29,3	6,7	9,9	8,3
70-74 ans		11,8	14,2	9,3	16,9	15,0	13,7	8,7
50-74 ans		8,5	10,8	6,0	13,2	6,4	9,9	5,9
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)		50-54 ans	2,7	4,0	1,2	2,7	1,1	6,2
	55-59 ans	3,5	3,7	3,3	7,2	4,9	2,8	3,0
	60-64 ans	3,0	3,4	2,5	0,0	2,0	4,2	2,6
	65-69 ans	2,7	3,6	1,9	2,7	3,3	3,8	1,7
	70-74 ans	3,0	4,0	1,9	6,8	0,0	3,6	2,1
	50-74 ans	3,0	3,7	2,2	3,2	2,0	3,9	2,2
	D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,9	0,4	1,4	0,7	1,1	0,0
55-59 ans		0,9	0,4	1,3	2,1	0,0	0,0	1,6
60-64 ans		0,7	0,5	0,9	0,8	0,0	0,4	1,1
65-69 ans		1,3	1,1	1,5	0,0	0,0	1,3	1,7
70-74 ans		2,5	3,1	1,9	0,0	7,5	3,6	1,3
50-74 ans		1,2	1,0	1,4	0,8	1,1	1,1	1,5
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu		50-54 ans	0,3	0,4	0,2	0,7	0,0	0,0
	55-59 ans	0,2	0,4	0,0	1,0	0,0	0,3	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,3	0,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
	50-74 ans	0,2	0,2	0,1	0,5	0,0	0,2	0,1
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,4	6,0	3,1	6,7	3,1	4,9	3,0
	55-59 ans	5,3	7,6	3,4	12,8	3,6	6,6	3,3
	60-64 ans	6,5	8,9	4,6	12,2	7,5	8,3	4,1
	65-69 ans	7,2	9,8	5,1	12,7	6,3	9,5	4,9
	70-74 ans	8,2	10,9	6,2	18,4	4,9	10,1	6,3
	50-74 ans	6,2	8,4	4,3	9,6	4,2	8,0	4,3
	50-74 ans **	6,1	8,2	4,2
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,5	3,6	1,6	4,3	1,8	2,5	1,4
	55-59 ans	2,9	4,4	1,7	7,9	1,8	3,7	1,7
	60-64 ans	3,5	5,1	2,3	8,2	4,0	4,6	2,0
	65-69 ans	4,1	5,6	2,8	8,2	3,6	5,2	2,8
	70-74 ans	4,4	6,2	2,9	11,7	3,3	5,6	2,9
	50-74 ans	3,4	4,9	2,2	6,2	2,4	4,4	2,2
	50-74 ans **	3,4	4,8	2,2
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,0	3,0	1,2	3,8	1,4	1,9	1,0
	55-59 ans	2,4	3,7	1,4	7,2	1,8	3,0	1,3
	60-64 ans	3,0	4,2	2,0	7,0	3,3	3,7	1,8
	65-69 ans	3,1	4,3	2,2	7,4	3,2	3,9	2,1
	70-74 ans	3,5	4,9	2,4	9,2	2,7	4,4	2,4
	50-74 ans	2,8	3,9	1,8	5,4	2,0	3,5	1,8
	50-74 ans **	2,8	3,9	1,7
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	0,9	0,4	1,0	0,6	0,8	0,1
	55-59 ans	1,3	2,1	0,6	4,1	1,3	1,7	0,5
	60-64 ans	1,6	2,4	0,9	5,4	1,7	1,8	0,8
	65-69 ans	2,1	2,9	1,5	9,0	1,6	2,1	1,5
	70-74 ans	2,6	3,5	1,8	6,1	3,3	3,2	1,7
	50-74 ans	1,5	2,2	1,0	3,1	1,1	2,0	0,9
	50-74 ans **	1,5	2,2	0,9

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)