

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	391	210	181	117	121	93	60	
	55-59 ans	382	209	173	52	36	157	137	
	60-64 ans	492	265	227	63	46	202	181	
	65-69 ans	357	202	155	40	26	162	129	
	70-74 ans	355	198	157	39	23	159	134	
	50-74 ans	1 977	1 084	893	311	252	773	641	
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	393	212	181	119	121	93	60	
	55-59 ans	386	209	177	52	37	157	140	
	60-64 ans	495	268	227	63	46	205	181	
	65-69 ans	362	203	159	40	27	163	132	
	70-74 ans	360	200	160	39	24	161	136	
	50-74 ans	1 996	1 092	904	313	255	779	649	
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	226	111	115	62	79	49	36	
	55-59 ans	199	91	108	22	21	69	87	
	60-64 ans	219	90	129	22	24	68	105	
	65-69 ans	154	71	83	6	12	65	71	
	70-74 ans	146	61	85	11	9	50	76	
	50-74 ans	944	424	520	123	145	301	375	
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	34	14	20	7	13	7	7	
	55-59 ans	29	23	6	6	2	17	4	
	60-64 ans	27	18	9	3	3	15	6	
	65-69 ans	21	12	9	5	2	7	7	
	70-74 ans	17	8	9	1	3	7	6	
	50-74 ans	128	75	53	22	23	53	30	
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1	
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1	
	50-74 ans	7	5	2	1	0	4	2	
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	38	29	9	13	6	16	3	
	55-59 ans	51	31	20	10	1	21	19	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	73	47	26	6	3	41	23
	65-69 ans	38	25	13	3	3	22	10
	70-74 ans	52	37	15	5	3	32	12
	50-74 ans	252	169	83	37	16	132	67
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	54	30	24	20	15	10	9
	55-59 ans	70	47	23	11	6	36	17
	60-64 ans	108	74	34	20	10	54	24
	65-69 ans	85	59	26	13	5	46	21
	70-74 ans	80	52	28	9	4	43	24
	50-74 ans	397	262	135	73	40	189	95
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	15	10	5	8	3	2	2
	55-59 ans	19	11	8	3	3	8	5
	60-64 ans	44	29	15	9	4	20	11
	65-69 ans	45	27	18	11	1	16	17
	70-74 ans	44	31	13	9	2	22	11
	50-74 ans	167	108	59	40	13	68	46
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	4	4	0	1	0	3	0
	55-59 ans	3	0	3	0	1	0	2
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	3	0	3	0	1	0	2
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	14	6	8	1	2	5	6
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	5	3	2	1	1	2	1
	55-59 ans	4	2	2	0	1	2	1
	60-64 ans	12	4	8	1	2	3	6
	65-69 ans	5	5	0	1	0	4	0
	70-74 ans	6	3	3	2	1	1	2
	50-74 ans	32	17	15	5	5	12	10
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	3	0	3	0	0	0	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	1	3	0	1	1	2
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	50-74 ans	11	4	7	2	2	2	5
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	92	59	33	33	21	26	12
	55-59 ans	121	78	43	21	7	57	36
	60-64 ans	182	121	61	26	14	95	47
	65-69 ans	123	84	39	16	8	68	31
	70-74 ans	132	89	43	14	7	75	36
	50-74 ans	650	431	219	110	57	321	162
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	54	30	24	20	15	10	9
	55-59 ans	70	47	23	11	6	36	17
	60-64 ans	108	74	34	20	10	54	24
	65-69 ans	85	59	26	13	5	46	21
	70-74 ans	80	52	28	9	4	43	24
	50-74 ans	397	262	135	73	40	189	95
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	47	27	20	18	12	9	8
	55-59 ans	57	39	18	10	5	29	13
	60-64 ans	90	64	26	14	7	50	19
	65-69 ans	73	51	22	12	4	39	18
	70-74 ans	68	45	23	8	3	37	20
	50-74 ans	335	226	109	62	31	164	78
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	15	10	5	8	3	2	2
	55-59 ans	20	12	8	3	3	9	5
	60-64 ans	44	29	15	9	4	20	11
	65-69 ans	45	27	18	11	1	16	17
	70-74 ans	44	31	13	9	2	22	11
	50-74 ans	168	109	59	40	13	69	46

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,5	99,1	100,0	98,3	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,2	100,0	98,3	100,0	97,3	100,0	98,6
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	98,6	99,5	97,5	100,0	96,3	99,4	97,7
	70-74 ans	99,2	99,0	99,4	100,0	100,0	98,8	99,3
	50-74 ans	99,3	99,5	99,1	99,4	99,2	99,6	99,1
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	57,5	52,4	63,5	52,1	65,3	52,7	60,0
	55-59 ans	51,6	43,5	61,0	42,3	56,8	43,9	62,1
	60-64 ans	44,2	33,6	56,8	34,9	52,2	33,2	58,0
	65-69 ans	42,5	35,0	52,2	15,0	44,4	39,9	53,8
	70-74 ans	40,6	30,5	53,1	28,2	37,5	31,1	55,9
	50-74 ans	47,3	38,8	57,5	39,3	56,9	38,6	57,8
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	8,7	6,6	11,0	5,9	10,7	7,5	11,7
	55-59 ans	7,5	11,0	3,4	11,5	5,4	10,8	2,9
	60-64 ans	5,5	6,7	4,0	4,8	6,5	7,3	3,3
	65-69 ans	5,8	5,9	5,7	12,5	7,4	4,3	5,3
	70-74 ans	4,7	4,0	5,6	2,6	12,5	4,3	4,4
	50-74 ans	6,4	6,9	5,9	7,0	9,0	6,8	4,6
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,5	0,9	0,0	0,8	0,0	1,1	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,6	0,7	0,4	0,0	0,0	1,0	0,6
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,6	0,5	0,6	0,0	0,0	0,6	0,7
	50-74 ans	0,4	0,5	0,2	0,3	0,0	0,5	0,3
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	9,7	13,7	5,0	10,9	5,0	17,2	5,0
	55-59 ans	13,2	14,8	11,3	19,2	2,7	13,4	13,6
	60-64 ans	14,7	17,5	11,5	9,5	6,5	20,0	12,7
	65-69 ans	10,5	12,3	8,2	7,5	11,1	13,5	7,6
	70-74 ans	14,4	18,5	9,4	12,8	12,5	19,9	8,8
	50-74 ans	12,6	15,5	9,2	11,8	6,3	16,9	10,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	13,7	14,2	13,3	16,8	12,4	10,8	15,0
	55-59 ans	18,1	22,5	13,0	21,2	16,2	22,9	12,1
	60-64 ans	21,8	27,6	15,0	31,7	21,7	26,3	13,3
	65-69 ans	23,5	29,1	16,4	32,5	18,5	28,2	15,9
	70-74 ans	22,2	26,0	17,5	23,1	16,7	26,7	17,6
	50-74 ans	19,9	24,0	14,9	23,3	15,7	24,3	14,6
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,8	4,7	2,8	6,7	2,5	2,2	3,3
	55-59 ans	4,9	5,3	4,5	5,8	8,1	5,1	3,6
	60-64 ans	8,9	10,8	6,6	14,3	8,7	9,8	6,1
	65-69 ans	12,4	13,3	11,3	27,5	3,7	9,8	12,9
	70-74 ans	12,2	15,5	8,1	23,1	8,3	13,7	8,1
	50-74 ans	8,4	9,9	6,5	12,8	5,1	8,7	7,1
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,0	1,9	0,0	0,8	0,0	3,2	0,0
	55-59 ans	0,8	0,0	1,7	0,0	2,7	0,0	1,4
	60-64 ans	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,5	0,6
	65-69 ans	0,8	0,0	1,9	0,0	3,7	0,0	1,5
	70-74 ans	0,6	0,5	0,6	0,0	0,0	0,6	0,7
	50-74 ans	0,7	0,5	0,9	0,3	0,8	0,6	0,9
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,3	1,4	1,1	0,8	0,8	2,2	1,7
	55-59 ans	1,0	1,0	1,1	0,0	2,7	1,3	0,7
	60-64 ans	2,4	1,5	3,5	1,6	4,3	1,5	3,3
	65-69 ans	1,4	2,5	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0
	70-74 ans	1,7	1,5	1,9	5,1	4,2	0,6	1,5
	50-74 ans	1,6	1,6	1,7	1,6	2,0	1,5	1,5
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,5	0,9	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,8	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	2,1
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	1,1	0,5	1,9	0,0	3,7	0,6	1,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	70-74 ans	0,6	0,5	0,6	0,0	4,2	0,6	0,0	
	50-74 ans	0,6	0,4	0,8	0,6	0,8	0,3	0,8	
	50-54 ans	3,3	4,6	2,2	4,4	2,6	4,9	1,7	
	55-59 ans	4,9	7,2	3,1	9,9	2,8	6,5	3,2	
	60-64 ans	5,9	8,8	3,5	11,0	5,1	8,4	3,3	
	65-69 ans	6,4	9,5	3,8	12,4	5,7	9,0	3,4	
	70-74 ans	7,2	11,2	4,2	13,6	5,0	10,8	4,1	
	50-74 ans	5,4	8,0	3,3	7,7	3,5	8,0	3,2	
	50-74 ans **	5,4	7,8	3,2	
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,9	2,3	1,6	2,7	1,8	1,9	1,3	
	55-59 ans	2,8	4,3	1,7	5,2	2,4	4,1	1,5	
	60-64 ans	3,5	5,4	2,0	8,4	3,6	4,8	1,7	
	65-69 ans	4,4	6,6	2,5	10,0	3,6	6,1	2,3	
	70-74 ans	4,4	6,5	2,7	8,7	2,9	6,2	2,7	
	50-74 ans	3,3	4,8	2,0	5,1	2,5	4,7	1,9	
		50-74 ans **	3,3	4,7	2,0
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,7	2,1	1,3	2,4	1,5	1,7	1,1	
	55-59 ans	2,3	3,6	1,3	4,7	2,0	3,3	1,1	
	60-64 ans	2,9	4,7	1,5	5,9	2,5	4,4	1,3	
	65-69 ans	3,8	5,7	2,1	9,3	2,9	5,1	2,0	
	70-74 ans	3,7	5,6	2,2	7,8	2,2	5,3	2,3	
	50-74 ans	2,8	4,2	1,6	4,3	1,9	4,1	1,5	
		50-74 ans **	2,8	4,0	1,6
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	0,8	0,3	1,1	0,4	0,4	0,3	
	55-59 ans	0,8	1,1	0,6	1,4	1,2	1,0	0,4	
	60-64 ans	1,4	2,1	0,9	3,8	1,5	1,8	0,8	
	65-69 ans	2,3	3,0	1,7	8,5	0,7	2,1	1,9	
	70-74 ans	2,4	3,9	1,3	8,7	1,4	3,2	1,2	
	50-74 ans	1,4	2,0	0,9	2,8	0,8	1,7	0,9	
		50-74 ans **	1,4	1,9	0,9

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)