

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 04/05/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	1 728	773	955	763	933	10	22
	55-59 ans	1 500	715	785	686	701	29	84
	60-64 ans	1 022	474	548	358	330	116	218
	65-69 ans	696	320	376	172	183	148	193
	70-74 ans	469	216	253	117	124	99	129
	50-74 ans	5 415	2 498	2 917	2 096	2 271	402	646
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	110	38	72	37	70	1	2
	55-59 ans	107	51	56	50	51	1	5
	60-64 ans	75	38	37	29	24	9	13
	65-69 ans	72	33	39	24	26	9	13
	70-74 ans	53	25	28	19	20	6	8
	50-74 ans	417	185	232	159	191	26	41
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	35	11	24	11	24	0	0
	55-59 ans	49	23	26	23	25	0	1
	60-64 ans	21	11	10	10	9	1	1
	65-69 ans	18	8	10	6	7	2	3
	70-74 ans	16	5	11	4	6	1	5
	50-74 ans	139	58	81	54	71	4	10
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	75	27	48	26	46	1	2
	55-59 ans	58	28	30	27	26	1	4
	60-64 ans	54	27	27	19	15	8	12
	65-69 ans	54	25	29	18	19	7	10
	70-74 ans	37	20	17	15	14	5	3
	50-74 ans	278	127	151	105	120	22	31
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	1 653	746	907	737	887	9	20
	55-59 ans	1 442	687	755	659	675	28	80
	60-64 ans	968	447	521	339	315	108	206
	65-69 ans	642	295	347	154	164	141	183
	70-74 ans	432	196	236	102	110	94	126
	50-74 ans	5 137	2 371	2 766	1 991	2 151	380	615
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	91	44	47	44	47	0	0
	55-59 ans	93	41	52	41	48	0	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 04/05/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	48	20	28	16	17	4	11
	65-69 ans	39	17	22	8	11	9	11
	70-74 ans	32	17	15	9	13	8	2
	50-74 ans	303	139	164	118	136	21	28
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	91	44	47	44	47	0	0
	55-59 ans	93	41	52	41	48	0	4
	60-64 ans	47	20	27	16	17	4	10
	65-69 ans	39	17	22	8	11	9	11
	70-74 ans	32	17	15	9	13	8	2
	50-74 ans	302	139	163	118	136	21	27
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	43	17	26	17	26	0	0
	55-59 ans	41	18	23	18	21	0	2
	60-64 ans	28	11	17	8	11	3	6
	65-69 ans	19	7	12	3	5	4	7
	70-74 ans	14	9	5	4	3	5	2
	50-74 ans	145	62	83	50	66	12	17
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	34	14	20	14	20	0	0
	55-59 ans	35	13	22	13	20	0	2
	60-64 ans	24	10	14	7	10	3	4
	65-69 ans	15	4	11	1	5	3	6
	70-74 ans	11	7	4	2	3	5	1
	50-74 ans	119	48	71	37	58	11	13
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 04/05/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	43	17	26	17	26	0	0
	55-59 ans	41	18	23	18	21	0	2
	60-64 ans	28	11	17	8	11	3	6
	65-69 ans	19	7	12	3	5	4	7
	70-74 ans	14	9	5	4	3	5	2
	50-74 ans	145	62	83	50	66	12	17
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 04/05/2015

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	99,7	100,0	99,4	100,0	100,0	100,0	96,4
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	47,3	38,6	55,3	38,6	55,3	0,0	0,0
	55-59 ans	44,1	43,9	44,2	43,9	43,8	0,0	50,0
	60-64 ans	59,6	55,0	63,0	50,0	64,7	75,0	60,0
	65-69 ans	48,7	41,2	54,5	37,5	45,5	44,4	63,6
	70-74 ans	43,8	52,9	33,3	44,4	23,1	62,5	100,0
	50-74 ans	48,0	44,6	50,9	42,4	48,5	57,1	63,0
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	79,1	82,4	76,9	82,4	76,9	0,0	0,0
	55-59 ans	85,4	72,2	95,7	72,2	95,2	0,0	100,0
	60-64 ans	85,7	90,9	82,4	87,5	90,9	100,0	66,7
	65-69 ans	78,9	57,1	91,7	33,3	100,0	75,0	85,7
	70-74 ans	78,6	77,8	80,0	50,0	100,0	100,0	50,0
	50-74 ans	82,1	77,4	85,5	74,0	87,9	91,7	76,5

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

^{**} standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)