

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	631	336	295	240	200	96	95
	55-59 ans	644	322	322	132	98	190	224
	60-64 ans	950	510	440	204	127	306	313
	65-69 ans	903	445	458	120	100	325	358
	70-74 ans	728	391	337	96	70	295	267
	50-74 ans	3 856	2 004	1 852	792	595	1 212	1 257
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	650	344	306	242	209	102	97
	55-59 ans	685	340	345	137	108	203	237
	60-64 ans	989	525	464	208	132	317	332
	65-69 ans	945	464	481	125	105	339	376
	70-74 ans	774	415	359	105	76	310	283
	50-74 ans	4 043	2 088	1 955	817	630	1 271	1 325
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	349	171	178	119	117	52	61
	55-59 ans	331	141	190	59	55	82	135
	60-64 ans	449	192	257	76	69	116	188
	65-69 ans	408	149	259	37	56	112	203
	70-74 ans	329	138	191	28	40	110	151
	50-74 ans	1 866	791	1 075	319	337	472	738
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	37	23	14	15	11	8	3
	55-59 ans	28	14	14	9	3	5	11
	60-64 ans	51	25	26	12	9	13	17
	65-69 ans	47	26	21	4	6	22	15
	70-74 ans	30	19	11	1	4	18	7
	50-74 ans	193	107	86	41	33	66	53
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	4	4	0	3	0	1	0
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	6	3	3	0	1	3	2
	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	50-74 ans	21	13	8	3	2	10	6
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	69	42	27	30	14	12	13
	55-59 ans	81	53	28	20	9	33	19

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	110	62	48	23	11	39	37
	65-69 ans	110	67	43	16	6	51	37
	70-74 ans	83	48	35	9	7	39	28
	50-74 ans	453	272	181	98	47	174	134
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	96	56	40	46	31	10	9
	55-59 ans	96	60	36	25	12	35	24
	60-64 ans	172	118	54	50	21	68	33
	65-69 ans	150	88	62	26	12	62	50
	70-74 ans	135	93	42	34	10	59	32
	50-74 ans	649	415	234	181	86	234	148
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	21	7	14	5	13	2	1
	55-59 ans	32	20	12	11	7	9	5
	60-64 ans	61	41	20	16	8	25	12
	65-69 ans	80	50	30	19	8	31	22
	70-74 ans	65	42	23	11	5	31	18
	50-74 ans	259	160	99	62	41	98	58
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	7	4	3	4	0	0	3
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	17	8	9	6	1	2	8
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	37	25	12	13	8	12	4
	55-59 ans	54	25	29	5	11	20	18
	60-64 ans	71	49	22	16	4	33	18
	65-69 ans	70	44	26	16	5	28	21
	70-74 ans	59	33	26	10	4	23	22
	50-74 ans	291	176	115	60	32	116	83
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	19	8	11	3	9	5	2
	55-59 ans	36	17	19	4	7	13	12

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	36	16	20	5	5	11	15
	65-69 ans	37	16	21	4	6	12	15
	70-74 ans	41	23	18	7	5	16	13
	50-74 ans	169	80	89	23	32	57	57
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	166	99	67	76	45	23	22
	55-59 ans	177	113	64	45	21	68	43
	60-64 ans	283	181	102	73	32	108	70
	65-69 ans	261	156	105	43	18	113	87
	70-74 ans	219	142	77	43	17	99	60
	50-74 ans	1 106	691	415	280	133	411	282
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	96	56	40	46	31	10	9
	55-59 ans	96	60	36	25	12	35	24
	60-64 ans	172	118	54	50	21	68	33
	65-69 ans	150	88	62	26	12	62	50
	70-74 ans	135	93	42	34	10	59	32
	50-74 ans	649	415	234	181	86	234	148
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	79	46	33	38	26	8	7
	55-59 ans	77	50	27	24	9	26	18
	60-64 ans	135	93	42	41	16	52	26
	65-69 ans	126	69	57	22	12	47	45
	70-74 ans	100	70	30	30	6	40	24
	50-74 ans	517	328	189	155	69	173	120
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	21	7	14	5	13	2	1
	55-59 ans	33	20	13	11	8	9	5
	60-64 ans	61	41	20	16	8	25	12
	65-69 ans	81	51	30	20	8	31	22
	70-74 ans	65	42	23	11	5	31	18
	50-74 ans	261	161	100	63	42	98	58

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	97,2	98,0	96,4	99,2	95,7	95,0	97,9
	55-59 ans	94,3	94,7	93,9	96,4	92,5	93,6	94,5
	60-64 ans	96,3	97,1	95,4	98,1	96,2	96,5	95,1
	65-69 ans	96,4	96,3	96,4	96,8	96,2	96,2	96,5
	70-74 ans	94,7	95,4	93,9	93,2	92,1	96,1	94,3
	50-74 ans	95,8	96,3	95,3	97,3	94,9	95,7	95,4
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	53,7	49,7	58,2	49,2	56,0	51,0	62,9
	55-59 ans	48,3	41,5	55,1	43,1	50,9	40,4	57,0
	60-64 ans	45,4	36,6	55,4	36,5	52,3	36,6	56,6
	65-69 ans	43,2	32,1	53,8	29,6	53,3	33,0	54,0
	70-74 ans	42,5	33,3	53,2	26,7	52,6	35,5	53,4
	50-74 ans	46,2	37,9	55,0	39,0	53,5	37,1	55,7
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,7	6,7	4,6	6,2	5,3	7,8	3,1
	55-59 ans	4,1	4,1	4,1	6,6	2,8	2,5	4,6
	60-64 ans	5,2	4,8	5,6	5,8	6,8	4,1	5,1
	65-69 ans	5,0	5,6	4,4	3,2	5,7	6,5	4,0
	70-74 ans	3,9	4,6	3,1	1,0	5,3	5,8	2,5
	50-74 ans	4,8	5,1	4,4	5,0	5,2	5,2	4,0
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,6	1,2	0,0	1,2	0,0	1,0	0,0
	55-59 ans	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	1,0	0,8
	60-64 ans	0,2	0,0	0,4	0,0	0,8	0,0	0,3
	65-69 ans	0,6	0,6	0,6	0,0	1,0	0,9	0,5
	70-74 ans	0,6	1,0	0,3	0,0	0,0	1,3	0,4
	50-74 ans	0,5	0,6	0,4	0,4	0,3	0,8	0,5
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10,6	12,2	8,8	12,4	6,7	11,8	13,4
	55-59 ans	11,8	15,6	8,1	14,6	8,3	16,3	8,0
	60-64 ans	11,1	11,8	10,3	11,1	8,3	12,3	11,1
	65-69 ans	11,6	14,4	8,9	12,8	5,7	15,0	9,8
	70-74 ans	10,7	11,6	9,7	8,6	9,2	12,6	9,9
	50-74 ans	11,2	13,0	9,3	12,0	7,5	13,7	10,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	14,8	16,3	13,1	19,0	14,8	9,8	9,3
	55-59 ans	14,0	17,6	10,4	18,2	11,1	17,2	10,1
	60-64 ans	17,4	22,5	11,6	24,0	15,9	21,5	9,9
	65-69 ans	15,9	19,0	12,9	20,8	11,4	18,3	13,3
	70-74 ans	17,4	22,4	11,7	32,4	13,2	19,0	11,3
	50-74 ans	16,1	19,9	12,0	22,2	13,7	18,4	11,2
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,2	2,0	4,6	2,1	6,2	2,0	1,0
	55-59 ans	4,7	5,9	3,5	8,0	6,5	4,4	2,1
	60-64 ans	6,2	7,8	4,3	7,7	6,1	7,9	3,6
	65-69 ans	8,5	10,8	6,2	15,2	7,6	9,1	5,9
	70-74 ans	8,4	10,1	6,4	10,5	6,6	10,0	6,4
	50-74 ans	6,4	7,7	5,1	7,6	6,5	7,7	4,4
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,5	0,3	0,7	0,4	0,5	0,0	1,0
	55-59 ans	0,3	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,8
	60-64 ans	0,7	0,8	0,6	1,9	0,0	0,0	0,9
	65-69 ans	0,4	0,6	0,2	0,8	0,0	0,6	0,3
	70-74 ans	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4
	50-74 ans	0,4	0,4	0,5	0,7	0,2	0,2	0,6
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	5,7	7,3	3,9	5,4	3,8	11,8	4,1
	55-59 ans	7,9	7,4	8,4	3,6	10,2	9,9	7,6
	60-64 ans	7,2	9,3	4,7	7,7	3,0	10,4	5,4
	65-69 ans	7,4	9,5	5,4	12,8	4,8	8,3	5,6
	70-74 ans	7,6	8,0	7,2	9,5	5,3	7,4	7,8
	50-74 ans	7,2	8,4	5,9	7,3	5,1	9,1	6,3
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2,9	2,3	3,6	1,2	4,3	4,9	2,1
	55-59 ans	5,3	5,0	5,5	2,9	6,5	6,4	5,1
	60-64 ans	3,6	3,0	4,3	2,4	3,8	3,5	4,5
	65-69 ans	3,9	3,4	4,4	3,2	5,7	3,5	4,0
	70-74 ans	5,3	5,5	5,0	6,7	6,6	5,2	4,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	4,2	3,8	4,6	2,8	5,1	4,5	4,3
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,6	5,9	3,5	6,4	3,5	4,8	3,3
	55-59 ans	5,1	7,4	3,3	7,8	3,6	7,2	3,1
	60-64 ans	6,5	9,5	4,1	11,2	4,8	8,7	3,9
	65-69 ans	7,1	9,4	5,1	10,3	4,2	9,1	5,4
	70-74 ans	7,9	11,2	5,1	16,5	6,3	9,9	4,8
	50-74 ans	6,2	8,6	4,2	9,0	4,1	8,4	4,2
	50-74 ans **	6,1	8,3	4,1
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosités) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,7	3,3	2,1	3,9	2,4	2,1	1,4
	55-59 ans	2,8	4,0	1,8	4,3	2,0	3,7	1,8
	60-64 ans	3,9	6,2	2,2	7,7	3,1	5,5	1,8
	65-69 ans	4,1	5,3	3,0	6,2	2,8	5,0	3,1
	70-74 ans	4,9	7,4	2,8	13,1	3,7	5,9	2,6
	50-74 ans	3,6	5,2	2,4	5,8	2,7	4,8	2,2
	50-74 ans **	3,6	4,9	2,3
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,2	2,7	1,7	3,2	2,0	1,7	1,1
	55-59 ans	2,2	3,3	1,4	4,1	1,5	2,8	1,3
	60-64 ans	3,1	4,9	1,7	6,3	2,4	4,2	1,5
	65-69 ans	3,4	4,2	2,8	5,3	2,8	3,8	2,8
	70-74 ans	3,6	5,5	2,0	11,5	2,2	4,0	1,9
	50-74 ans	2,9	4,1	1,9	5,0	2,1	3,5	1,8
	50-74 ans **	2,8	3,9	1,8
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	0,4	0,7	0,4	1,0	0,4	0,2
	55-59 ans	0,9	1,3	0,7	1,9	1,4	1,0	0,4
	60-64 ans	1,4	2,2	0,8	2,5	1,2	2,0	0,7
	65-69 ans	2,2	3,1	1,5	4,8	1,9	2,5	1,4
	70-74 ans	2,3	3,3	1,5	4,2	1,8	3,1	1,4
	50-74 ans	1,5	2,0	1,0	2,0	1,3	2,0	0,9
	50-74 ans **	1,4	1,8	1,0

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)