

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

| Indicateurs sur la période 2011-2012  | Age              | Total          |               |               | Dépistage initial <sup>§</sup> |               | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |               |
|---|------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|
|   |                  | Tous sexes     | Hommes        | Femmes        | Hommes                         | Femmes        | Hommes                              | Femmes        |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans        | 32 271         | 14 587        | 17 684        | 8 701                          | 9 766         | 5 886                               | 7 918         |
|   | 55-59 ans        | 28 487         | 12 790        | 15 697        | 2 682                          | 2 760         | 10 108                              | 12 937        |
|   | 60-64 ans        | 31 542         | 14 189        | 17 353        | 2 677                          | 2 923         | 11 512                              | 14 430        |
|   | 65-69 ans        | 22 132         | 10 333        | 11 799        | 1 731                          | 1 834         | 8 602                               | 9 965         |
|   | 70-74 ans        | 18 271         | 7 946         | 10 325        | 1 147                          | 1 439         | 6 799                               | 8 886         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>132 703</b> | <b>59 845</b> | <b>72 858</b> | <b>16 938</b>                  | <b>18 722</b> | <b>42 907</b>                       | <b>54 136</b> |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)                       | 50-54 ans        | 2 848          | 1 330         | 1 518         | 848                            | 881           | 482                                 | 637           |
|   | 55-59 ans        | 2 565          | 1 166         | 1 399         | 288                            | 324           | 878                                 | 1 075         |
|   | 60-64 ans        | 2 674          | 1 165         | 1 509         | 291                            | 318           | 874                                 | 1 191         |
|   | 65-69 ans        | 2 124          | 936           | 1 188         | 220                            | 238           | 716                                 | 950           |
|   | 70-74 ans        | 1 876          | 776           | 1 100         | 152                            | 207           | 624                                 | 893           |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>12 087</b>  | <b>5 373</b>  | <b>6 714</b>  | <b>1 799</b>                   | <b>1 968</b>  | <b>3 574</b>                        | <b>4 746</b>  |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA               | 50-54 ans        | 1 929          | 894           | 1 035         | 518                            | 541           | 376                                 | 494           |
|   | 55-59 ans        | 1 867          | 861           | 1 006         | 169                            | 180           | 692                                 | 826           |
|   | 60-64 ans        | 1 998          | 874           | 1 124         | 190                            | 200           | 684                                 | 924           |
|   | 65-69 ans        | 1 591          | 689           | 902           | 130                            | 154           | 559                                 | 748           |
|   | 70-74 ans        | 1 392          | 587           | 805           | 100                            | 126           | 487                                 | 679           |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>8 777</b>   | <b>3 905</b>  | <b>4 872</b>  | <b>1 107</b>                   | <b>1 201</b>  | <b>2 798</b>                        | <b>3 671</b>  |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait                                      | 50-54 ans        | 919            | 436           | 483           | 330                            | 340           | 106                                 | 143           |
|   | 55-59 ans        | 698            | 305           | 393           | 119                            | 144           | 186                                 | 249           |
|   | 60-64 ans        | 676            | 291           | 385           | 101                            | 118           | 190                                 | 267           |
|   | 65-69 ans        | 533            | 247           | 286           | 90                             | 84            | 157                                 | 202           |
|   | 70-74 ans        | 484            | 189           | 295           | 52                             | 81            | 137                                 | 214           |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>3 310</b>   | <b>1 468</b>  | <b>1 842</b>  | <b>692</b>                     | <b>767</b>    | <b>776</b>                          | <b>1 075</b>  |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)                              | 50-54 ans        | 31 352         | 14 151        | 17 201        | 8 371                          | 9 426         | 5 780                               | 7 775         |
|   | 55-59 ans        | 27 789         | 12 485        | 15 304        | 2 563                          | 2 616         | 9 922                               | 12 688        |
|   | 60-64 ans        | 30 866         | 13 898        | 16 968        | 2 576                          | 2 805         | 11 322                              | 14 163        |
|   | 65-69 ans        | 21 599         | 10 086        | 11 513        | 1 641                          | 1 750         | 8 445                               | 9 763         |
|   | 70-74 ans        | 17 787         | 7 757         | 10 030        | 1 095                          | 1 358         | 6 662                               | 8 672         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>129 393</b> | <b>58 377</b> | <b>71 016</b> | <b>16 246</b>                  | <b>17 955</b> | <b>42 131</b>                       | <b>53 061</b> |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif  | 50-54 ans        | 782            | 410           | 372           | 246                            | 204           | 164                                 | 168           |
|   | 55-59 ans        | 882            | 475           | 407           | 125                            | 90            | 350                                 | 317           |
|   | 60-64 ans        | 964            | 509           | 455           | 123                            | 103           | 386                                 | 352           |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

| Indicateurs sur la période 2011-2012  | Age              | Total        |              |              | Dépistage initial <sup>§</sup> |            | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |              |
|---|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|
|   |                  | Tous sexes   | Hommes       | Femmes       | Hommes                         | Femmes     | Hommes                              | Femmes       |
|   | 65-69 ans        | 723          | 381          | 342          | 90                             | 59         | 291                                 | 283          |
|   | 70-74 ans        | 612          | 309          | 303          | 48                             | 47         | 261                                 | 256          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>3 963</b> | <b>2 084</b> | <b>1 879</b> | <b>632</b>                     | <b>503</b> | <b>1 452</b>                        | <b>1 376</b> |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie   | 50-54 ans        | 776          | 407          | 369          | 244                            | 202        | 163                                 | 167          |
|   | 55-59 ans        | 869          | 468          | 401          | 124                            | 87         | 344                                 | 314          |
|   | 60-64 ans        | 955          | 504          | 451          | 122                            | 102        | 382                                 | 349          |
|   | 65-69 ans        | 713          | 376          | 337          | 90                             | 59         | 286                                 | 278          |
|   | 70-74 ans        | 596          | 300          | 296          | 47                             | 46         | 253                                 | 250          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>3 909</b> | <b>2 055</b> | <b>1 854</b> | <b>627</b>                     | <b>496</b> | <b>1 428</b>                        | <b>1 358</b> |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie   | 50-54 ans        | 660          | 347          | 313          | 206                            | 173        | 141                                 | 140          |
|   | 55-59 ans        | 749          | 398          | 351          | 97                             | 70         | 301                                 | 281          |
|   | 60-64 ans        | 820          | 429          | 391          | 99                             | 84         | 330                                 | 307          |
|   | 65-69 ans        | 611          | 319          | 292          | 71                             | 48         | 248                                 | 244          |
|   | 70-74 ans        | 525          | 261          | 264          | 37                             | 38         | 224                                 | 226          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>3 365</b> | <b>1 754</b> | <b>1 611</b> | <b>510</b>                     | <b>413</b> | <b>1 244</b>                        | <b>1 198</b> |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète  | 50-54 ans        | 652          | 343          | 309          | 202                            | 171        | 141                                 | 138          |
|   | 55-59 ans        | 736          | 390          | 346          | 95                             | 69         | 295                                 | 277          |
|   | 60-64 ans        | 810          | 424          | 386          | 97                             | 83         | 327                                 | 303          |
|   | 65-69 ans        | 596          | 312          | 284          | 69                             | 48         | 243                                 | 236          |
|   | 70-74 ans        | 518          | 260          | 258          | 37                             | 38         | 223                                 | 220          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>3 312</b> | <b>1 729</b> | <b>1 583</b> | <b>500</b>                     | <b>409</b> | <b>1 229</b>                        | <b>1 174</b> |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)                  | 50-54 ans        | 1            | 1            | 0            | 1                              | 0          | 0                                   | 0            |
|   | 55-59 ans        | 0            | 0            | 0            | 0                              | 0          | 0                                   | 0            |
|   | 60-64 ans        | 0            | 0            | 0            | 0                              | 0          | 0                                   | 0            |
|   | 65-69 ans        | 0            | 0            | 0            | 0                              | 0          | 0                                   | 0            |
|   | 70-74 ans        | 1            | 0            | 1            | 0                              | 0          | 0                                   | 1            |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>2</b>     | <b>1</b>     | <b>1</b>     | <b>1</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                            | <b>1</b>     |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | 50-54 ans        | 0            | 0            | 0            | 0                              | 0          | 0                                   | 0            |
|   | 55-59 ans        | 0            | 0            | 0            | 0                              | 0          | 0                                   | 0            |
|   | 60-64 ans        | 0            | 0            | 0            | 0                              | 0          | 0                                   | 0            |
|   | 65-69 ans        | 0            | 0            | 0            | 0                              | 0          | 0                                   | 0            |
|   | 70-74 ans        | 1            | 0            | 1            | 0                              | 0          | 0                                   | 1            |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>1</b>     | <b>0</b>     | <b>1</b>     | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                            | <b>1</b>     |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

| Indicateurs sur la période 2011-2012   | Age              | Total        |              |              | Dépistage initial <sup>§</sup> |            | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |              |
|--|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|
|  |                  | Tous sexes   | Hommes       | Femmes       | Hommes                         | Femmes     | Hommes                              | Femmes       |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)                       | 50-54 ans        | 659          | 346          | 313          | 205                            | 173        | 141                                 | 140          |
|  | 55-59 ans        | 746          | 397          | 349          | 97                             | 70         | 300                                 | 279          |
|  | 60-64 ans        | 816          | 427          | 389          | 98                             | 84         | 329                                 | 305          |
|  | 65-69 ans        | 607          | 317          | 290          | 70                             | 48         | 247                                 | 242          |
|  | 70-74 ans        | 520          | 259          | 261          | 37                             | 38         | 222                                 | 223          |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>3 348</b> | <b>1 746</b> | <b>1 602</b> | <b>507</b>                     | <b>413</b> | <b>1 239</b>                        | <b>1 189</b> |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique                   | 50-54 ans        | 1            | 1            | 0            | 1                              | 0          | 0                                   | 0            |
|  | 55-59 ans        | 3            | 1            | 2            | 0                              | 0          | 1                                   | 2            |
|  | 60-64 ans        | 4            | 2            | 2            | 1                              | 0          | 1                                   | 2            |
|  | 65-69 ans        | 4            | 2            | 2            | 1                              | 0          | 1                                   | 2            |
|  | 70-74 ans        | 5            | 2            | 3            | 0                              | 0          | 2                                   | 3            |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>17</b>    | <b>8</b>     | <b>9</b>     | <b>3</b>                       | <b>0</b>   | <b>5</b>                            | <b>9</b>     |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie) | 50-54 ans        | 1            | 0            | 1            | 0                              | 0          | 0                                   | 1            |
|  | 55-59 ans        | 1            | 1            | 0            | 0                              | 0          | 1                                   | 0            |
|  | 60-64 ans        | 4            | 4            | 0            | 1                              | 0          | 3                                   | 0            |
|  | 65-69 ans        | 7            | 2            | 5            | 0                              | 0          | 2                                   | 5            |
|  | 70-74 ans        | 10           | 7            | 3            | 0                              | 1          | 7                                   | 2            |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>23</b>    | <b>14</b>    | <b>9</b>     | <b>1</b>                       | <b>1</b>   | <b>13</b>                           | <b>8</b>     |

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

| Indicateurs sur la période 2011-2012   | Age              | Total       |             |             | Dépistage initial <sup>§</sup> |             | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |             |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
|  |                  | Tous sexes  | Hommes      | Femmes      | Hommes                         | Femmes      | Hommes                              | Femmes      |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)         | 50-54 ans        | 8,8         | 9,1         | 8,6         | 9,7                            | 9,0         | 8,2                                 | 8,0         |
|  | 55-59 ans        | 9,0         | 9,1         | 8,9         | 10,7                           | 11,7        | 8,7                                 | 8,3         |
|  | 60-64 ans        | 8,5         | 8,2         | 8,7         | 10,9                           | 10,9        | 7,6                                 | 8,3         |
|  | 65-69 ans        | 9,6         | 9,1         | 10,1        | 12,7                           | 13,0        | 8,3                                 | 9,5         |
|  | 70-74 ans        | 10,3        | 9,8         | 10,7        | 13,3                           | 14,4        | 9,2                                 | 10,0        |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>9,1</b>  | <b>9,0</b>  | <b>9,2</b>  | <b>10,6</b>                    | <b>10,5</b> | <b>8,3</b>                          | <b>8,8</b>  |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%) | 50-54 ans        | 2,8         | 3,0         | 2,7         | 3,8                            | 3,5         | 1,8                                 | 1,8         |
|  | 55-59 ans        | 2,5         | 2,4         | 2,5         | 4,4                            | 5,2         | 1,8                                 | 1,9         |
|  | 60-64 ans        | 2,1         | 2,1         | 2,2         | 3,8                            | 4,0         | 1,7                                 | 1,9         |
|  | 65-69 ans        | 2,4         | 2,4         | 2,4         | 5,2                            | 4,6         | 1,8                                 | 2,0         |
|  | 70-74 ans        | 2,6         | 2,4         | 2,9         | 4,5                            | 5,6         | 2,0                                 | 2,4         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>2,5</b>  | <b>2,5</b>  | <b>2,5</b>  | <b>4,1</b>                     | <b>4,1</b>  | <b>1,8</b>                          | <b>2,0</b>  |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA                    | 50-54 ans        | 67,7        | 67,2        | 68,2        | 61,1                           | 61,4        | 78,0                                | 77,6        |
|  | 55-59 ans        | 72,8        | 73,8        | 71,9        | 58,7                           | 55,6        | 78,8                                | 76,8        |
|  | 60-64 ans        | 74,7        | 75,0        | 74,5        | 65,3                           | 62,9        | 78,3                                | 77,6        |
|  | 65-69 ans        | 74,9        | 73,6        | 75,9        | 59,1                           | 64,7        | 78,1                                | 78,7        |
|  | 70-74 ans        | 74,2        | 75,6        | 73,2        | 65,8                           | 60,9        | 78,0                                | 76,0        |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>72,6</b> | <b>72,7</b> | <b>72,6</b> | <b>61,5</b>                    | <b>61,0</b> | <b>78,3</b>                         | <b>77,3</b> |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)                   | 50-54 ans        | 2,5         | 2,9         | 2,2         | 2,9                            | 2,2         | 2,8                                 | 2,2         |
|  | 55-59 ans        | 3,2         | 3,8         | 2,7         | 4,9                            | 3,4         | 3,5                                 | 2,5         |
|  | 60-64 ans        | 3,1         | 3,7         | 2,7         | 4,8                            | 3,7         | 3,4                                 | 2,5         |
|  | 65-69 ans        | 3,3         | 3,8         | 3,0         | 5,5                            | 3,4         | 3,4                                 | 2,9         |
|  | 70-74 ans        | 3,4         | 4,0         | 3,0         | 4,4                            | 3,5         | 3,9                                 | 3,0         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>3,1</b>  | <b>3,6</b>  | <b>2,6</b>  | <b>3,9</b>                     | <b>2,8</b>  | <b>3,4</b>                          | <b>2,6</b>  |
| <b>50-74 ans **</b>  | <b>3,1</b>       | <b>3,6</b>  | <b>2,6</b>  | .           | .                              | .           | .                                   |             |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie                            | 50-54 ans        | 99,2        | 99,3        | 99,2        | 99,2                           | 99,0        | 99,4                                | 99,4        |
|  | 55-59 ans        | 98,5        | 98,5        | 98,5        | 99,2                           | 96,7        | 98,3                                | 99,1        |
|  | 60-64 ans        | 99,1        | 99,0        | 99,1        | 99,2                           | 99,0        | 99,0                                | 99,1        |
|  | 65-69 ans        | 98,6        | 98,7        | 98,5        | 100,0                          | 100,0       | 98,3                                | 98,2        |
|  | 70-74 ans        | 97,4        | 97,1        | 97,7        | 97,9                           | 97,9        | 96,9                                | 97,7        |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

| Indicateurs sur la période 2011-2012  | Age              | Total       |             |             | Dépistage initial <sup>§</sup> |             | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |             |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
|   |                  | Tous sexes  | Hommes      | Femmes      | Hommes                         | Femmes      | Hommes                              | Femmes      |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>98,6</b> | <b>98,6</b> | <b>98,7</b> | <b>99,2</b>                    | <b>98,6</b> | <b>98,3</b>                         | <b>98,7</b> |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans        | 85,1        | 85,3        | 84,8        | 84,4                           | 85,6        | 86,5                                | 83,8        |
|   | 55-59 ans        | 86,2        | 85,0        | 87,5        | 78,2                           | 80,5        | 87,5                                | 89,5        |
|   | 60-64 ans        | 85,9        | 85,1        | 86,7        | 81,1                           | 82,4        | 86,4                                | 88,0        |
|   | 65-69 ans        | 85,7        | 84,8        | 86,6        | 78,9                           | 81,4        | 86,7                                | 87,8        |
|   | 70-74 ans        | 88,1        | 87,0        | 89,2        | 78,7                           | 82,6        | 88,5                                | 90,4        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>86,1</b> | <b>85,4</b> | <b>86,9</b> | <b>81,3</b>                    | <b>83,3</b> | <b>87,1</b>                         | <b>88,2</b> |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète  | 50-54 ans        | 98,8        | 98,8        | 98,7        | 98,1                           | 98,8        | 100,0                               | 98,6        |
|   | 55-59 ans        | 98,3        | 98,0        | 98,6        | 97,9                           | 98,6        | 98,0                                | 98,6        |
|   | 60-64 ans        | 98,8        | 98,8        | 98,7        | 98,0                           | 98,8        | 99,1                                | 98,7        |
|   | 65-69 ans        | 97,5        | 97,8        | 97,3        | 97,2                           | 100,0       | 98,0                                | 96,7        |
|   | 70-74 ans        | 98,7        | 99,6        | 97,7        | 100,0                          | 100,0       | 99,6                                | 97,3        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>98,4</b> | <b>98,6</b> | <b>98,3</b> | <b>98,0</b>                    | <b>99,0</b> | <b>98,8</b>                         | <b>98,0</b> |

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

<sup>\*\*</sup> standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)