Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012			Total		Dépist	age initial	Dépistages	Subséquents
·	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel	50.54	10007	1075	5.450	4400	0004	7.5	4504
qu'en soit le résultat)	50-54 ans	10327	4875	5452	4130	3861	745	1591
	55-59 ans	10540	4429	6111	2525	2151	1904	3960
	60-64 ans	12891	5423	7468	2421	2299	3002	5169
	65-69 ans	10691	4590	6101	1591	1571	2999	4530
	70-74 ans	7930	3551	4379	1120	1135	2431	3244
	50-74 ans	52379	22868	29511	11787	11017	11081	18494
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	601	305	296	271	242	34	54
	55-59 ans	630	273	357	190	158	83	199
	60-64 ans	750	326	424	208	178	118	246
	65-69 ans	715	305	410	169	156	136	254
	70-74 ans	623	250	373	110	116	140	257
	50-74 ans	3319	1459	1860	948	850	511	1010
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un								
test NA	50-54 ans	300	156	144	131	110	25	34
	55-59 ans	367	159	208	97	66	62	142
	60-64 ans	439	198	241	108	89	90	152
	65-69 ans	414	174	240	85	76	89	164
	70-74 ans	360	151	209	54	43	97	166
	50-74 ans	1880	838	1042	475	384	363	658
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	301	149	152	140	132	9	20
	55-59 ans	263	114	149	93	92	21	57
	60-64 ans	311	128	183	100	89	28	94
	65-69 ans	301	131	170	84	80	47	90
	70-74 ans	263	99	164	56	73	43	91
	50-74 ans	1439	621	818	473	466	148	352
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	10026	4726	5300	3990	3729	736	1571
	55-59 ans	10277	4315	5962	2432	2059	1883	3903
	60-64 ans	12580	5295	7285	2321	2210	2974	5075
	65-69 ans	10390	4459	5931	1507	1491	2952	4440

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012			Total		Dépist	age initial	Dépistages	Subséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	7667	3452	4215	1064	1062	2388	3153
	50-74 ans	50940	22247	28693	11314	10551	10933	18142
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	267	131	136	112	103	19	33
	55-59 ans	274	125	149	73	57	52	92
	60-64 ans	373	196	177	104	56	92	121
	65-69 ans	346	161	185	58	53	103	132
	70-74 ans	299	157	142	59	44	98	98
	50-74 ans	1559	770	789	406	313	364	476
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	267	131	136	112	103	19	33
	55-59 ans	273	125	148	73	57	52	91
	60-64 ans	372	196	176	104	56	92	120
	65-69 ans	343	161	182	58	53	103	129
	70-74 ans	296	155	141	58	44	97	97
	50-74 ans	1551	768	783	405	313	363	470
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	174	82	92	69	63	13	29
	55-59 ans	191	85	106	45	33	40	73
	60-64 ans	280	150	130	80	36	70	94
	65-69 ans	255	114	141	32	34	82	107
	70-74 ans	218	113	105	42	36	71	69
	50-74 ans	1118	544	574	268	202	276	372
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	160	78	82	66	57	12	25
	55-59 ans	181	82	99	43	33	39	66
	60-64 ans	253	133	120	70	34	63	86
	65-69 ans	228	103	125	30	30	73	95
	70-74 ans	193	102	91	39	33	63	58
	50-74 ans	1015	498	517	248	187	250	330
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie) 50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012			Total		Dépist	age initial	Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	3	1	2	1	2	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	5	2	3	2	3	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de	50.54							
plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	174	82	92	69	63	13	29
	55-59 ans	191	85	106	45	33	40	73
	60-64 ans	280	150	130	80	36	70	94
	65-69 ans	252	113	139	32	33	81	106
	70-74 ans	215	113	102	42	35	71	67
	50-74 ans	1112	543	569	268	200	275	369
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	3	0	3	0	1	0	2
	50-74 ans	6	1	5	0	2	1	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique								
autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	4	1	3	1	0	0	3

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012			Total		Dépist	age initial	Dépistages	Subséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
	50-74 ans	10	4	6	2	1	2	5
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	173	82	91	69	62	13	29
	55-59 ans	191	85	106	45	33	40	73
	60-64 ans	278	150	128	80	36	70	92
	65-69 ans	250	111	139	31	33	80	106
	70-74 ans	210	110	100	41	35	69	65
	50-74 ans	1102	538	564	266	199	272	365
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	174	82	92	69	63	13	29
	55-59 ans	192	85	107	45	34	40	73
	60-64 ans	282	150	132	80	36	70	96
	65-69 ans	259	115	144	33	34	82	110
	70-74 ans	221	116	105	43	36	73	69
	50-74 ans	1128	548	580	270	203	278	377
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	94	43	51	34	37	9	14
	55-59 ans	91	33	58	16	16	17	42
	60-64 ans	157	69	88	34	28	35	60
	65-69 ans	121	37	84	9	17	28	67
	70-74 ans	99	39	60	11	18	28	42
	50-74 ans	562	221	341	104	116	117	225
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10	50-54 ans	8	4	4	3	3	1	1
mm	50-54 ans	O	4	4	J	J	1	1
	55-59 ans	10	5	5	4	2	1	3
	60-64 ans	10	3	7	3	1	0	6
	65-69 ans	15	5	10	0	5	5	5
	70-74 ans	4	3	1	0	1	3	0

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012			Total		Dépist	age initial	Dépistages	Subséquents
·	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	47	20	27	10	12	10	15
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
Superieure ou egale à 10 mm	50-54 ans	I .	I	U	I	U	U	U
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15	7	8	6	4	1	4
	55-59 ans	29	19	10	8	4	11	6
	60-64 ans	25	16	9	9	1	7	8
	65-69 ans	31	19	12	9	3	10	9
	70-74 ans	26	15	11	4	5	11	6
	50-74 ans	126	76	50	36	17	40	33
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	33	19	14	17	9	2	5
autre) ayant detecte au moins un adenome avance	50-54 ans	33	19	14	17	9	2	3
	55-59 ans	29	17	12	9	3	8	9
	60-64 ans	56	42	14	23	4	19	10
	65-69 ans	48	25	23	4	5	21	18
	70-74 ans	44	31	13	15	8	16	5
	50-74 ans	210	134	76	68	29	66	47
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	7	2	5	2	5	0	0
	55-59 ans	7	3	4	3	2	0	2
	60-64 ans	10	6	4	5	1	1	3
	65-69 ans	19	12	7	6	3	6	4

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012			Total		Dépista	age initial	Dépistages	Subséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	19	12	7	5	2	7	5
	50-74 ans	62	35	27	21	13	14	14
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non								
adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	6	3	3	1	0	2	3
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie,								
résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	9	4	5	4	3	0	2
	55-59 ans	19	6	13	3	5	3	8
	60-64 ans	12	6	6	3	1	3	5
	65-69 ans	16	10	6	3	1	7	5
	70-74 ans	17	9	8	6	2	3	6
	50-74 ans	73	35	38	19	12	16	26
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou	30-74 alls	73	33	36	19	12	10	20
autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	8	6	2	1	0	5	2
	50-74 ans	14	8	6	2	1	6	5
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	48	26	22	23	13	3	9
	55-59 ans	58	36	22	17	7	19	15
	60-64 ans	81	58	23	32	5	26	18
	65-69 ans	79	44	35	13	8	31	27

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012			Total		Dépist	age initial	Dépistages	Subséquents
·	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	70	46	24	19	13	27	11
	50-74 ans	336	210	126	104	46	106	80
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé								
détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une			40		4-			_
dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux)	50-54 ans	33	19	14	17	9	2	5
	55-59 ans	29	17	12	9	3	8	9
	60-64 ans	56	42	14	23	4	19	10
	65-69 ans	48	25	23	4	5	21	18
	70-74 ans	44	31	13	15	8	16	5
	50-74 ans	210	134	76	68	29	66	47
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé	50.54	00	47	40	4.5	0		
détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	29	17	12	15	8	2	4
	55-59 ans	20	14	6	9	1	5	5
	60-64 ans	43	31	12	18	2	13	10
	65-69 ans	40	20	20	4	5	16	15
	70-74 ans	30	21	9	13	5	8	4
	50-74 ans	162	103	59	59	21	44	38
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	7	2	5	2	5	0	0
	55-59 ans	7	3	4	3	2	0	2
	60-64 ans	10	6	4	5	1	1	3
	65-69 ans	19	12	7	6	3	6	4
	70-74 ans	19	12	7	5	2	7	5
	50-74 ans	62	35	27	21	13	14	14
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers				_		_		
du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	7	2	5	2	5	0	0
	55-59 ans	7	3	4	3	2	0	2
	60-64 ans	10	6	4	5	1	1	3
	65-69 ans	19	12	7	6	3	6	4
	70-74 ans	19	12	7	5	2	7	5
	50-74 ans	62	35	27	21	13	14	14
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	6	1	5	1	5	0	0

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012			Total		Dépist	age initial	Dépistages	Subséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	6	2	4	2	2	0	2
	60-64 ans	10	6	4	5	1	1	3
	65-69 ans	14	9	5	5	3	4	2
	70-74 ans	17	10	7	5	2	5	5
	50-74 ans	53	28	25	18	13	10	12
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu								
(stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	8	7	1	3	0	4	1
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM								_
connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	7	6	1	3	0	3	1
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012			Total		Dépista	age initial	Dépistages	Subséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
The mane as personnes processinant an earlies as claus (11111)	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	2	0	0	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
·	55-59 ans	3	1	2	1	1	0	1
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	6	4	2	1	1	3	1
	70-74 ans	6	5	1	1	0	4	1
	50-74 ans	19	12	7	5	4	7	3
A40- Perdus de vue	50-54 ans	46	27	19	27	18	0	1
	55-59 ans	43	23	20	17	13	6	7
	60-64 ans	49	21	28	13	13	8	15
	65-69 ans	47	24	23	15	11	9	12
	70-74 ans	48	20	28	9	5	11	23

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012			Total			ge initial	Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	233	115	118	81	60	34	58

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 30 - Gard

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012			Total		Dépist	age initial	Dépistages subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les								
personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,8	6,3	5,4	6,6	6,3	4,6	3,4
	55-59 ans	6	6,2	5,8	7,5	7,3	4,4	5
	60-64 ans	5,8	6	5,7	8,6	7,7	3,9	4,8
	65-69 ans	6,7	6,6	6,7	10,6	9,9	4,5	5,6
	70-74 ans	7,9	7	8,5	9,8	10,2	5,8	7,9
	50-74 ans	6,3	6,4	6,3	8	7,7	4,6	5,5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysal	ble							
sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,9	3,1	2,8	3,4	3,4	1,2	1,3
	55-59 ans	2,5	2,6	2,4	3,7	4,3	1,1	1,4
	60-64 ans	2,4	2,4	2,5	4,1	3,9	0,9	1,8
	65-69 ans	2,8	2,9	2,8	5,3	5,1	1,6	2
	70-74 ans	3,3	2,8	3,7	5	6,4	1,8	2,8
	50-74 ans	2,7	2,7	2,8	4	4,2	1,3	1,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite	e à							
un test NA	50-54 ans	49,9	51,1	48,6	48.3	45,5	73,5	63
	55-59 ans	58,3	58,2	58,3	51,1	41,8	74,7	71,4
	60-64 ans	58,5	60,7	56,8	51,9	50	76,3	61,8
	65-69 ans	57,9	57	58,5	50,3	48,7	65,4	64,6
	70-74 ans	57,8	60,4	56	49,1	37,1	69.3	64,6
	50-74 ans	56,6	57,4	56	50,1	45,2	71	65,1
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test		,-	,-		,-	,-		
analysable (%)	50-54 ans	2,7	2,8	2,6	2,8	2,8	2,6	2,1
	55-59 ans	2,7	2,9	2,5	3	2,8	2,8	2,4
	60-64 ans	3	3,7	2,4	4,5	2,5	3,1	2,4
	65-69 ans	3,3	3,6	3,1	3,8	3,6	3,5	3
	70-74 ans	3,9	4,5	3,4	5,5	4,1	4,1	3,1
	50-74 ans	3,1	3,5	2,7	3,6	3	3,3	2,6
	50-74 ans **		3,4	2,7		-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la	00 7 1 0110		0, 1	_,.		•	•	<u> </u>
coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
Joioscopic	55-59 ans	99,6	100	99,3	100	100	100	98,9
	60-64 ans	99,7	100	99,4	100	100	100	99,2
	65-69 ans	99,1	100	98,4	100	100	100	97,7
	70-74 ans	99	98,7	99,3	98,3	100	99	99
	50-74 ans	99.5	99,7	99,2	99,8	100	99.7	98,7
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parm		JJ,J	33,1	33,2	33,0	100	33,1	30,1
es personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	65,2	62,6	67.6	61,6	61,2	68,4	87.9
es personines enginies à la conoscopie)	50-54 ans 55-59 ans	65,2 70	68	71,6	61,6	57,9	76.9	80,2
	60-64 ans	75,3	76.5	73,9	76,9	64,3	76,9 76,1	78,3
	65-69 ans	74,3	70,8 72,9	77,5 74,5	55,2	64,2	79,6 73,2	82,9
	70-74 ans	73,6			72,4	81,8		71,1
	50-74 ans	72,1	70,8	73,3	66,2	64,5	76	79,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 30 - Gard

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012			Total		Dépist	age initial	Dépistages	s subséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	92	95,1	89,1	95,7	90,5	92,3	86,2
	55-59 ans	94,8	96,5	93,4	95,6	100	97,5	90,4
	60-64 ans	90,4	88,7	92,3	87,5	94,4	90	91,5
	65-69 ans	89,4	90,4	88,7	93,8	88,2	89	88,8
	70-74 ans	88,5	90,3	86,7	92,9	91,7	88,7	84,1
	50-74 ans	90,8	91,5	90,1	92,5	92,6	90,6	88,7
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	1
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
	50-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	55-59 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	60-64 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	65-69 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	70-74 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	50-74 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	76	85	68	86	78	81	46
	55-59 ans	70	68	71	64	103	74	57
	60-64 ans	66	63	71	68	71	57	70
	65-69 ans	79	81	77	92	113	76	66
	70-74 ans	64	63	65	69	71	59	61
	50-74 ans	71	71	71	75	85	67	63
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	51 (34-76)	54 (39-89.5)	45 (34-70)	47 (34-89)	52.5 (34-72)	69 (56-90)	36 (28-65)
	55-59 ans	51 (34-75)	51 (35-75)	51 (34-75)	51 (43-72)	58 (42-101)	55 (31-83)	45.5 (33-71)
	60-64 ans	48 (36-72)	48.5 (33-72)	48 (37-71)	51 (35-73)	46.5 (36.5-71)	44 (31-67)	50 (37-71)
	65-69 ans	52 (37-84)	51 (38-90.5)	53.5 (35-82)	49 (35-120)	65 (48-101)	51 (39-88)	52 (33-70)
	70-74 ans	49 (36-71)	47 (35-68)	53 (36-76.5)	50.5 (35-68)	56 (41-90)	47 (34-65)	50.5 (36-74)
	50-74 ans	51 (36-75)	50 (36-75)	51 (35-76)	50 (35-75)	56 (39-89)	51 (36-74)	48 (34-71)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	17,2	20,6	14	24,1	17,5	0	3
Ŭ I	55-59 ans	15,7	18,4	13,4	23,3	22,8	11,5	7,6
	60-64 ans	13,1	10,7	15,8	12,5	23,2	8,7	12,4
	65-69 ans	13,6	14,9	12,4	25,9	20,8	8,7	9,1
	70-74 ans	16,1	12,7	19,7	15,3	11,4	11,2	23,5
	50-74 ans	14,9	14,9	15	20	19,2	9,3	12,2
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,4	100	98,9	100	98,4	100	100
20	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,3	100	98,5	100	100	100	97,9
	65-69 ans	98	97,4	98.6	96.9	97,1	97,6	99,1
	70-74 ans	96,3	97,3	95,2	97,6	97,2	97,2	94,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 30 - Gard

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012		Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
·	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	98,6	98,9	98,3	99,3	98,5	98,6	98,1
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)							
dont le résultat est normal	50-54 ans	54	52,4	55,4	49,3	58,7	69,2	48,3
	55-59 ans	47,4	38,8	54,2	35,6	47,1	42,5	57,5
	60-64 ans	55,7	46	66,7	42,5	77,8	50	62,5
	65-69 ans	46,7	32,2	58,3	27,3	50	34,1	60,9
	70-74 ans	44,8	33,6	57,1	25,6	50	38,4	60,9
	50-74 ans	49,8	40,3	58,8	38,5	57,1	42,1	59,7
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)							
ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	4,6	4,9	4,3	4,3	4,8	7,7	3,4
	55-59 ans	5,2	5,9	4,7	8,9	5,9	2,5	4,1
	60-64 ans	3,5	2	5,3	3,8	2,8	0	6,3
	65-69 ans	5,8	4,3	6,9	0	14,7	6,1	4,5
	70-74 ans	1,8	2,6	1	0	2,8	4,1	0
	50-74 ans	4,2	3,6	4,7	3,7	5,9	3,6	4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)							
ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,6	1,2	0	1,4	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0,2	0	0,4	0	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)		•					
ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	8,6	8,5	8,7	8.7	6,3	7,7	13,8
	55-59 ans	15,1	22,4	9,3	17,8	11,8	27,5	8,2
	60-64 ans	8,9	10,7	6,8	11,3	2,8	10	8,3
	65-69 ans	12	16,5	8,3	27,3	8,8	12,2	8,2
	70-74 ans	11,8	12,9	10,5	9,3	13,9	15,1	8,7
	50-74 ans	11,2	13,9	8,6	13,3	8,4	14,4	8,8
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)	,	-,-	.,-	-,-	-,	,	-,-
ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	19	23,2	15,2	24,6	14,3	15,4	17,2
	55-59 ans	15,1	20	11,2	20	8,8	20	12,3
	60-64 ans	19,9	28	10,6	28,8	11,1	27,1	10,4
	65-69 ans	18,5	21,7	16	12,1	14,7	25,6	16,4
	70-74 ans	19,9	26,7	12,4	34,9	22,2	21,9	7,2
	50-74 ans	18,6	24,5	13,1	25,2	14,3	23,7	12,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre		. 5,0	_ 1,0			. 1,0		,0
ayant détecté un cancer	50-54 ans	4	2,4	5,4	2,9	7,9	0	0
ayant detects un cancer	55-59 ans	3,6	3,5	3,7	6,7	5,9	0	2,7
	60-64 ans	3,5	4	3	6,3	2,8	1,4	3,1
	65-69 ans	7,3	10,4	4,9	18,2	8,8	7,3	3,6
	70-74 ans	8,6	10,4	6,7	11,6	5,6	9,6	7,2
	50-74 ans	5,5	6,4	4,7	7,8	6,4	5	3,7

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012		Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
200 B								
2008- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)	50.54	0.0	0	4.4			0	0.4
ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,6	0	1,1	0	0	0	3,4
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,7	0,7	0,8	1,3	0	0	1
	65-69 ans	0,8	1,7	0	0	0	2,4	0
	70-74 ans	0,5	0	1	0	0	0	1,4
200 Deurscantege de nerconnec quant qui un evemen disancetic (coloccenie qui autre)	50-74 ans	0,5	0,5	0,5	0,4	0	0,7	0,8
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non								
disponibles)	50-54 ans	5,2	4,9	5,4	5,8	4,8	0	6,9
	55-59 ans	9,9	7,1	12,1	6,7	14,7	7,5	11
	60-64 ans	4,3	4	4,5	3,8	2,8	4,3	5,2
	65-69 ans	6,2	8,7	4,2	9,1	2,9	8,5	4,5
	70-74 ans	7,7	7,8	7,6	14	5,6	4,1	8,7
	50-74 ans	6,5	6,4	6,6	7	5,9	5,8	6,9
210- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)	50.54.555	0.0	0	4.4	0	4.0	0	0
dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,6	0	1,1	0	1,6	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,7	0	1,5	0	0	0	2,1
	65-69 ans	1,2	1,7	0,7	3	0	1,2	0,9
	70-74 ans	3,6	5,2	1,9	2,3	0	6,8	2,9
	50-74 ans	1,2	1,5	1	0,7	0,5	2,2	1,3
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,8	5,5	4,2	5,8	3,5	4,1	5,7
	55-59 ans	5,6	8,3	3,7	7	3,4	10,1	3,8
	60-64 ans	6,4	11	3,2	13,8	2,3	8,7	3,5
	65-69 ans	7,6	9,9	5,9	8,6	5,4	10,5	6,1
	70-74 ans	9,1	13,3	5,7	17,9	12,2	11,3	3,5
	50-74 ans	6,6	9,4	4,4	9,2	4,4	9,7	4,4
	50-74 ans **	6,6	9,1	4,3			-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou olus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux) pour 1000								
personnes dépistées	50-54 ans	3,3	4	2,6	4,3	2,4	2,7	3,2
	55-59 ans	2,8	3,9	2	3,7	1,5	4,2	2,3
	60-64 ans	4,5	7,9	1,9	9,9	1,8	6,4	2
	65-69 ans	4,6	5,6	3,9	2,7	3,4	7,1	4,1
	70-74 ans	5,7	9	3,1	14,1	7,5	6,7	1,6
	50-74 ans	4,1	6	2,6	6	2,7	6	2,6
	50-74 ans **	4,1	5,7	2,6			-	
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou								
olus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,9	3,6	2,3	3,8	2,1	2,7	2,5
side, pedi 1990 percentico depictoro	55-59 ans	1,9	3,2	1	3.7	0.5	2.7	1.3