

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 67 - Bas-Rhin

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	24748	11827	12921	7368	7999	4459	4922
	55-59 ans	25050	11630	13420	2630	2858	9000	10562
	60-64 ans	24016	11181	12835	2320	2505	8861	10330
	65-69 ans	16322	7579	8743	1400	1699	6179	7044
	70-74 ans	14872	6772	8100	1259	1441	5513	6659
	50-74 ans	105008	48989	56019	14977	16502	34012	39517
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1413	708	705	476	469	232	236
	55-59 ans	1448	671	777	203	237	468	540
	60-64 ans	1439	663	776	200	221	463	555
	65-69 ans	1072	484	588	122	172	362	416
	70-74 ans	1066	472	594	139	160	333	434
	50-74 ans	6438	2998	3440	1140	1259	1858	2181
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	932	471	461	295	282	176	179
	55-59 ans	957	447	510	113	123	334	387
	60-64 ans	1007	458	549	101	123	357	426
	65-69 ans	747	324	423	64	95	260	328
	70-74 ans	738	317	421	74	86	243	335
	50-74 ans	4381	2017	2364	647	709	1370	1655
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	481	237	244	181	187	56	57
	55-59 ans	491	224	267	90	114	134	153
	60-64 ans	432	205	227	99	98	106	129
	65-69 ans	325	160	165	58	77	102	88
	70-74 ans	328	155	173	65	74	90	99
	50-74 ans	2057	981	1076	493	550	488	526
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	24267	11590	12677	7187	7812	4403	4865
	55-59 ans	24559	11406	13153	2540	2744	8866	10409
	60-64 ans	23584	10976	12608	2221	2407	8755	10201
	65-69 ans	15997	7419	8578	1342	1622	6077	6956
	70-74 ans	14544	6617	7927	1194	1367	5423	6560

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 67 - Bas-Rhin

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	102951	48008	54943	14484	15952	33524	38991
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	416	243	173	150	113	93	60
	55-59 ans	478	278	200	75	56	203	144
	60-64 ans	495	280	215	63	43	217	172
	65-69 ans	380	221	159	55	41	166	118
	70-74 ans	387	185	202	40	38	145	164
	50-74 ans	2156	1207	949	383	291	824	658
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	410	239	171	147	111	92	60
	55-59 ans	467	273	194	74	54	199	140
	60-64 ans	481	274	207	62	40	212	167
	65-69 ans	370	217	153	53	40	164	113
	70-74 ans	373	177	196	37	37	140	159
	50-74 ans	2101	1180	921	373	282	807	639
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	379	223	156	136	102	87	54
	55-59 ans	432	250	182	61	51	189	131
	60-64 ans	452	253	199	56	37	197	162
	65-69 ans	348	204	144	47	34	157	110
	70-74 ans	341	158	183	34	34	124	149
	50-74 ans	1952	1088	864	334	258	754	606
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	374	221	153	134	100	87	53
	55-59 ans	421	243	178	58	49	185	129
	60-64 ans	438	246	192	53	33	193	159
	65-69 ans	335	196	139	44	34	152	105
	70-74 ans	329	150	179	32	33	118	146
	50-74 ans	1897	1056	841	321	249	735	592
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	6	3	3	1	1	2	2
	55-59 ans	8	7	1	1	1	6	0
	60-64 ans	6	4	2	2	0	2	2
	65-69 ans	7	5	2	3	0	2	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 67 - Bas-Rhin

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	9	6	3	1	1	5	2
	50-74 ans	36	25	11	8	3	17	8
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	2	0	2	0	0	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	50-74 ans	6	3	3	1	1	2	2
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	378	223	155	136	101	87	54
	55-59 ans	427	248	179	60	49	188	130
	60-64 ans	447	251	196	54	35	197	161
	65-69 ans	346	204	142	47	34	157	108
	70-74 ans	340	157	183	33	34	124	149
	50-74 ans	1938	1083	855	330	253	753	602
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	5	2	3	1	2	1	1
	60-64 ans	5	2	3	2	2	0	1
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	14	5	9	4	5	1	4
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	3	0	3	0	2	0	1
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	8	3	5	0	3	3	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	379	223	156	136	102	87	54

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 67 - Bas-Rhin

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	432	250	182	61	51	189	131
	60-64 ans	452	253	199	56	37	197	162
	65-69 ans	348	204	144	47	34	157	110
	70-74 ans	341	158	183	34	34	124	149
	50-74 ans	1952	1088	864	334	258	754	606
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	380	224	156	136	102	88	54
	55-59 ans	435	250	185	61	53	189	132
	60-64 ans	455	254	201	56	38	198	163
	65-69 ans	348	204	144	47	34	157	110
	70-74 ans	342	159	183	34	34	125	149
	50-74 ans	1960	1091	869	334	261	757	608
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	212	109	103	61	70	48	33
	55-59 ans	223	97	126	21	37	76	89
	60-64 ans	204	88	116	18	22	70	94
	65-69 ans	147	65	82	18	24	47	58
	70-74 ans	147	49	98	12	13	37	85
	50-74 ans	933	408	525	130	166	278	359
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	35	20	15	16	10	4	5
	55-59 ans	26	17	9	6	2	11	7
	60-64 ans	26	18	8	4	2	14	6
	65-69 ans	14	10	4	2	1	8	3
	70-74 ans	14	4	10	1	2	3	8
	50-74 ans	115	69	46	29	17	40	29
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 67 - Bas-Rhin

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	42	29	13	14	7	15	6
	55-59 ans	68	54	14	11	3	43	11
	60-64 ans	80	52	28	8	1	44	27
	65-69 ans	49	29	20	4	1	25	19
	70-74 ans	51	32	19	5	3	27	16
	50-74 ans	290	196	94	42	15	154	79
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	64	47	17	28	9	19	8
	55-59 ans	76	58	18	15	7	43	11
	60-64 ans	83	58	25	17	7	41	18
	65-69 ans	93	68	25	12	5	56	20
	70-74 ans	75	37	38	8	11	29	27
	50-74 ans	391	268	123	80	39	188	84
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	16	10	6	9	4	1	2
	55-59 ans	28	17	11	6	2	11	9
	60-64 ans	37	25	12	5	2	20	10
	65-69 ans	35	27	8	10	3	17	5
	70-74 ans	48	33	15	8	4	25	11
	50-74 ans	164	112	52	38	15	74	37
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	9	8	1	7	1	1	0
	55-59 ans	11	5	6	1	1	4	5
	60-64 ans	14	10	4	2	2	8	2
	65-69 ans	8	4	4	1	0	3	4
	70-74 ans	4	1	3	0	1	1	2
	50-74 ans	46	28	18	11	5	17	13

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 67 - Bas-Rhin

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	7	2	5	2	1	0	4
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	14	6	8	3	3	3	5
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	106	76	30	42	16	34	14
	55-59 ans	144	112	32	26	10	86	22
	60-64 ans	163	110	53	25	8	85	45
	65-69 ans	142	97	45	16	6	81	39
	70-74 ans	126	69	57	13	14	56	43
	50-74 ans	681	464	217	122	54	342	163
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	64	47	17	28	9	19	8
	55-59 ans	76	58	18	15	7	43	11
	60-64 ans	83	58	25	17	7	41	18
	65-69 ans	93	68	25	12	5	56	20
	70-74 ans	75	37	38	8	11	29	27
	50-74 ans	391	268	123	80	39	188	84
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	58	43	15	26	9	17	6
	55-59 ans	68	51	17	13	7	38	10
	60-64 ans	72	52	20	17	6	35	14

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 67 - Bas-Rhin

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	85	60	25	11	5	49	20
	70-74 ans	63	29	34	6	9	23	25
	50-74 ans	346	235	111	73	36	162	75
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	16	10	6	9	4	1	2
	55-59 ans	28	17	11	6	2	11	9
	60-64 ans	37	25	12	5	2	20	10
	65-69 ans	35	27	8	10	3	17	5
	70-74 ans	48	33	15	8	4	25	11
	50-74 ans	164	112	52	38	15	74	37
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	10	6	4	5	2	1	2
	55-59 ans	26	15	11	5	2	10	9
	60-64 ans	33	23	10	5	2	18	8
	65-69 ans	32	24	8	9	3	15	5
	70-74 ans	43	28	15	8	4	20	11
	50-74 ans	144	96	48	32	13	64	35
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	4	1	1	1	3	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	9	5	4	4	2	1	2
	55-59 ans	26	15	11	5	2	10	9
	60-64 ans	31	22	9	5	1	17	8
	65-69 ans	30	22	8	9	3	13	5
	70-74 ans	43	28	15	8	4	20	11
	50-74 ans	139	92	47	31	12	61	35
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	7	4	3	3	2	1	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 67 - Bas-Rhin

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	19	10	9	5	1	5	8
	60-64 ans	19	13	6	2	1	11	5
	65-69 ans	23	18	5	8	2	10	3
	70-74 ans	35	23	12	7	3	16	9
	50-74 ans	103	68	35	25	9	43	26
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	7	5	2	0	1	5	1
	60-64 ans	12	9	3	3	0	6	3
	65-69 ans	7	4	3	1	1	3	2
	70-74 ans	8	5	3	1	1	4	2
	50-74 ans	36	24	12	6	3	18	9
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	5	2	3	1	2	1	1
	55-59 ans	8	6	2	4	1	2	1
	60-64 ans	9	7	2	1	0	6	2
	65-69 ans	10	9	1	3	1	6	0
	70-74 ans	17	10	7	2	3	8	4
	50-74 ans	49	34	15	11	7	23	8
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	5	2	3	0	0	2	3
	60-64 ans	4	2	2	0	1	2	1
	65-69 ans	4	2	2	2	1	0	1
	70-74 ans	7	4	3	2	0	2	3
	50-74 ans	21	11	10	5	2	6	8
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	6	2	4	1	0	1	4
	60-64 ans	5	4	1	1	0	3	1
	65-69 ans	4	2	2	1	0	1	2
	70-74 ans	9	7	2	2	0	5	2
	50-74 ans	24	15	9	5	0	10	9
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 67 - Bas-Rhin

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	5	5	0	2	0	3	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	9	8	1	4	0	4	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	9	5	4	4	2	1	2
	55-59 ans	26	15	11	5	2	10	9
	60-64 ans	31	22	9	5	1	17	8
	65-69 ans	32	24	8	9	3	15	5
	70-74 ans	42	27	15	7	4	20	11
	50-74 ans	140	93	47	30	12	63	35
A40- Perdus de vue	50-54 ans	15	10	5	8	4	2	1
	55-59 ans	15	10	5	6	1	4	4
	60-64 ans	19	13	6	3	3	10	3
	65-69 ans	5	3	2	2	2	1	0
	70-74 ans	11	7	4	2	1	5	3
	50-74 ans	65	43	22	21	11	22	11

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 67 - Bas-Rhin

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,7	6	5,5	6,5	5,9	5,2	4,8
	55-59 ans	5,8	5,8	5,8	7,7	8,3	5,2	5,1
	60-64 ans	6	5,9	6	8,6	8,8	5,2	5,4
	65-69 ans	6,6	6,4	6,7	8,7	10,1	5,9	5,9
	70-74 ans	7,2	7	7,3	11	11,1	6	6,5
	50-74 ans	6,1	6,1	6,1	7,6	7,6	5,5	5,5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,9	2	1,9	2,5	2,3	1,3	1,2
	55-59 ans	2	1,9	2	3,4	4	1,5	1,4
	60-64 ans	1,8	1,8	1,8	4,3	3,9	1,2	1,2
	65-69 ans	2	2,1	1,9	4,1	4,5	1,7	1,2
	70-74 ans	2,2	2,3	2,1	5,2	5,1	1,6	1,5
	50-74 ans	2	2	1,9	3,3	3,3	1,4	1,3
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	66	66,5	65,4	62	60,1	75,9	75,8
	55-59 ans	66,1	66,6	65,6	55,7	51,9	71,4	71,7
	60-64 ans	70	69,1	70,7	50,5	55,7	77,1	76,8
	65-69 ans	69,7	66,9	71,9	52,5	55,2	71,8	78,8
	70-74 ans	69,2	67,2	70,9	53,2	53,8	73	77,2
	50-74 ans	68	67,3	68,7	56,8	56,3	73,7	75,9
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,7	2,1	1,4	2,1	1,4	2,1	1,2
	55-59 ans	1,9	2,4	1,5	3	2	2,3	1,4
	60-64 ans	2,1	2,6	1,7	2,8	1,8	2,5	1,7
	65-69 ans	2,4	3	1,9	4,1	2,5	2,7	1,7
	70-74 ans	2,7	2,8	2,5	3,4	2,8	2,7	2,5
	50-74 ans	2,1	2,5	1,7	2,6	1,8	2,5	1,7
50-74 ans **	2,1	2,5	1,7	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,6	98,4	98,8	98	98,2	98,9	100
	55-59 ans	97,7	98,2	97	98,7	96,4	98	97,2
	60-64 ans	97,2	97,9	96,3	98,4	93	97,7	97,1
	65-69 ans	97,4	98,2	96,2	96,4	97,6	98,8	95,8
	70-74 ans	96,4	95,7	97	92,5	97,4	96,6	97
	50-74 ans	97,4	97,8	97	97,4	96,9	97,9	97,1
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	92,4	93,3	91,2	92,5	91,9	94,6	90
	55-59 ans	92,5	91,6	93,8	82,4	94,4	95	93,6
	60-64 ans	94	92,3	96,1	90,3	92,5	92,9	97
	65-69 ans	94,1	94	94,1	88,7	85	95,7	97,3
	70-74 ans	91,4	89,3	93,4	91,9	91,9	88,6	93,7
	50-74 ans	92,9	92,2	93,8	89,5	91,5	93,4	94,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 67 - Bas-Rhin

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,7	99,1	98,1	98,5	98	100	98,1
	55-59 ans	97,5	97,2	97,8	95,1	96,1	97,9	98,5
	60-64 ans	96,9	97,2	96,5	94,6	89,2	98	98,1
	65-69 ans	96,3	96,1	96,5	93,6	100	96,8	95,5
	70-74 ans	96,5	94,9	97,8	94,1	97,1	95,2	98
	50-74 ans	97,2	97,1	97,3	96,1	96,5	97,5	97,7
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	97	97	96	94	94	102	98
	55-59 ans	75	85	62	103	64	79	61
	60-64 ans	77	85	65	82	58	86	67
	65-69 ans	65	66	64	81	86	61	57
	70-74 ans	74	68	79	57	111	72	72
	50-74 ans	78	82	73	88	84	79	68
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	57 (37-95)	62 (40-99)	56 (35-86)	61 (41-101)	62 (36-93)	62 (39-93)	50 (34-82)
	55-59 ans	53 (36-77)	56 (37-81)	50 (35-70)	56 (33-104)	45 (26-69)	56 (38-81)	52 (36-70)
	60-64 ans	51.5 (35-82.5)	54 (36-86)	49 (35-74)	56.5 (35-80)	49 (36-62)	54 (37-90)	49 (35-76)
	65-69 ans	52 (34-74.5)	52.5 (36.5-72)	51.5 (31-78)	51 (32-88)	53.5 (36-79)	53 (39-71)	49 (29-77)
	70-74 ans	50 (35-71)	51 (37-73)	49 (34-71)	49 (33-81)	44.5 (33-75)	51 (37.5-72.5)	50 (35-71)
	50-74 ans	53 (36-80)	55 (37-82.5)	50 (34-76)	57 (37-92)	50 (34-83)	54 (38-80)	50 (34-73)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	3,6	4,1	2,9	5,3	3,5	2,2	1,7
	55-59 ans	3,1	3,6	2,5	8	1,8	2	2,8
	60-64 ans	3,8	4,6	2,8	4,8	7	4,6	1,7
	65-69 ans	1,3	1,4	1,3	3,6	4,9	0,6	0
	70-74 ans	2,8	3,8	2	5	2,6	3,4	1,8
	50-74 ans	3	3,6	2,3	5,5	3,8	2,7	1,7
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 67 - Bas-Rhin

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	55,8	48,7	66	44,9	68,6	54,5	61,1
	55-59 ans	51,3	38,8	68,1	34,4	69,8	40,2	67,4
	60-64 ans	44,8	34,6	57,7	32,1	57,9	35,4	57,7
	65-69 ans	42,2	31,9	56,9	38,3	70,6	29,9	52,7
	70-74 ans	43	30,8	53,6	35,3	38,2	29,6	57
	50-74 ans	47,6	37,4	60,4	38,9	63,6	36,7	59
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	9,2	8,9	9,6	11,8	9,8	4,5	9,3
	55-59 ans	6	6,8	4,9	9,8	3,8	5,8	5,3
	60-64 ans	5,7	7,1	4	7,1	5,3	7,1	3,7
	65-69 ans	4	4,9	2,8	4,3	2,9	5,1	2,7
	70-74 ans	4,1	2,5	5,5	2,9	5,9	2,4	5,4
	50-74 ans	5,9	6,3	5,3	8,7	6,5	5,3	4,8
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,2	0,4	0	0	0	0,5	0
	60-64 ans	0,4	0,4	0,5	0	0	0,5	0,6
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,3	0,6	0	0	0	0,8	0
	50-74 ans	0,2	0,3	0,1	0	0	0,4	0,2
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11,1	12,9	8,3	10,3	6,9	17	11,1
	55-59 ans	15,6	21,6	7,6	18	5,7	22,8	8,3
	60-64 ans	17,6	20,5	13,9	14,3	2,6	22,2	16,6
	65-69 ans	14,1	14,2	13,9	8,5	2,9	15,9	17,3
	70-74 ans	14,9	20,1	10,4	14,7	8,8	21,6	10,7
	50-74 ans	14,8	18	10,8	12,6	5,7	20,3	13
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	16,8	21	10,9	20,6	8,8	21,6	14,8
	55-59 ans	17,5	23,2	9,7	24,6	13,2	22,8	8,3
	60-64 ans	18,2	22,8	12,4	30,4	18,4	20,7	11
	65-69 ans	26,7	33,3	17,4	25,5	14,7	35,7	18,2
	70-74 ans	21,9	23,3	20,8	23,5	32,4	23,2	18,1
	50-74 ans	19,9	24,6	14,2	24	14,9	24,8	13,8
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,2	4,5	3,8	6,6	3,9	1,1	3,7
	55-59 ans	6,4	6,8	5,9	9,8	3,8	5,8	6,8
	60-64 ans	8,1	9,8	6	8,9	5,3	10,1	6,1
	65-69 ans	10,1	13,2	5,6	21,3	8,8	10,8	4,5
	70-74 ans	14	20,8	8,2	23,5	11,8	20	7,4
	50-74 ans	8,4	10,3	6	11,4	5,7	9,8	6,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 67 - Bas-Rhin

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,4	3,6	0,6	5,1	1	1,1	0
	55-59 ans	2,5	2	3,2	1,6	1,9	2,1	3,8
	60-64 ans	3,1	3,9	2	3,6	5,3	4	1,2
	65-69 ans	2,3	2	2,8	2,1	0	1,9	3,6
	70-74 ans	1,2	0,6	1,6	0	2,9	0,8	1,3
	50-74 ans	2,3	2,6	2,1	3,3	1,9	2,2	2,1
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,3	0	0,6	0	1	0	0
	55-59 ans	0,5	0,4	0,5	1,6	1,9	0	0
	60-64 ans	1,5	0,8	2,5	3,6	2,6	0	2,5
	65-69 ans	0,6	0,5	0,7	0	0	0,6	0,9
	70-74 ans	0,6	1,3	0	0	0	1,6	0
	50-74 ans	0,7	0,5	0,9	0,9	1,1	0,4	0,8
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,2	0	0,5	0	2,6	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0	0,1	0	0,4	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,4	6,6	2,4	5,8	2	7,7	2,9
	55-59 ans	5,9	9,8	2,4	10,2	3,6	9,7	2,1
	60-64 ans	6,9	10	4,2	11,3	3,3	9,7	4,4
	65-69 ans	8,9	13,1	5,2	11,9	3,7	13,3	5,6
	70-74 ans	8,7	10,4	7,2	10,9	10,2	10,3	6,6
	50-74 ans	6,6	9,7	3,9	8,4	3,4	10,2	4,2
50-74 ans **	6,7	9,6	3,9	
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,6	4,1	1,3	3,9	1,2	4,3	1,6
	55-59 ans	3,1	5,1	1,4	5,9	2,6	4,8	1,1
	60-64 ans	3,5	5,3	2	7,7	2,9	4,7	1,8
	65-69 ans	5,8	9,2	2,9	8,9	3,1	9,2	2,9
	70-74 ans	5,2	5,6	4,8	6,7	8	5,3	4,1
	50-74 ans	3,8	5,6	2,2	5,5	2,4	5,6	2,2
50-74 ans **	3,8	5,5	2,2	
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,4	3,7	1,2	3,6	1,2	3,9	1,2
	55-59 ans	2,8	4,5	1,3	5,1	2,6	4,3	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 67 - Bas-Rhin

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3,1	4,7	1,6	7,7	2,5	4	1,4
	65-69 ans	5,3	8,1	2,9	8,2	3,1	8,1	2,9
	70-74 ans	4,3	4,4	4,3	5	6,6	4,2	3,8
	50-74 ans	3,4	4,9	2	5	2,3	4,8	1,9
	50-74 ans **	3,4	4,9	2
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	0,9	0,5	1,3	0,5	0,2	0,4
	55-59 ans	1,1	1,5	0,8	2,4	0,7	1,2	0,9
	60-64 ans	1,6	2,3	1	2,3	0,8	2,3	1
	65-69 ans	2,2	3,6	0,9	7,5	1,8	2,8	0,7
	70-74 ans	3,3	5	1,9	6,7	2,9	4,6	1,7
	50-74 ans	1,6	2,3	0,9	2,6	0,9	2,2	0,9
	50-74 ans **	1,6	2,3	0,9
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	10	16,7	0	20	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	6,1	4,3	10	0	50	5,6	0
	65-69 ans	6,3	8,3	0	0	0	13,3	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3,5	4,2	2,1	3,1	7,7	4,7	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009