

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 59 - Nord

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Effectifs sur la période 2009-2010

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	35241	15878	19363	9128	10777	6750	8586
	55-59 ans	36067	15632	20435	2983	3713	12649	16722
	60-64 ans	35467	15721	19746	2280	2912	13441	16834
	65-69 ans	21772	9715	12057	1180	1512	8535	10545
	70-74 ans	21779	9295	12484	973	1385	8322	11099
	50-74 ans	150326	66241	84085	16544	20299	49697	63786
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	2836	1275	1561	856	1032	419	529
	55-59 ans	2472	1027	1445	288	375	739	1070
	60-64 ans	2377	974	1403	236	337	738	1066
	65-69 ans	1626	649	977	135	196	514	781
	70-74 ans	1904	731	1173	130	199	601	974
	50-74 ans	11215	4656	6559	1645	2139	3011	4420
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1821	816	1005	505	609	311	396
	55-59 ans	1665	692	973	151	184	541	789
	60-64 ans	1607	648	959	117	181	531	778
	65-69 ans	1135	459	676	73	112	386	564
	70-74 ans	1282	510	772	60	104	450	668
	50-74 ans	7510	3125	4385	906	1190	2219	3195
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	1015	459	556	351	423	108	133
	55-59 ans	807	335	472	137	191	198	281
	60-64 ans	770	326	444	119	156	207	288
	65-69 ans	491	190	301	62	84	128	217
	70-74 ans	622	221	401	70	95	151	306
	50-74 ans	3705	1531	2174	739	949	792	1225
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	34226	15419	18807	8777	10354	6642	8453
	55-59 ans	35260	15297	19963	2846	3522	12451	16441
	60-64 ans	34697	15395	19302	2161	2756	13234	16546
	65-69 ans	21281	9525	11756	1118	1428	8407	10328
	70-74 ans	21157	9074	12083	903	1290	8171	10793
	50-74 ans	146621	64710	81911	15805	19350	48905	62561
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	771	410	361	248	220	162	141
	55-59 ans	855	449	406	105	85	344	321
	60-64 ans	942	483	459	96	92	387	367
	65-69 ans	647	342	305	56	41	286	264
	70-74 ans	666	340	326	53	34	287	292
	50-74 ans	3881	2024	1857	558	472	1466	1385
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	770	409	361	247	220	162	141
	55-59 ans	850	448	402	105	85	343	317
	60-64 ans	941	483	458	96	92	387	366
	65-69 ans	646	342	304	56	40	286	264
	70-74 ans	657	337	320	53	33	284	287
	50-74 ans	3864	2019	1845	557	470	1462	1375
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	582	310	272	180	163	130	109
	55-59 ans	657	342	315	74	59	268	256
	60-64 ans	753	389	364	70	73	319	291
	65-69 ans	531	281	250	44	32	237	218
	70-74 ans	473	234	239	34	23	200	216
	50-74 ans	2996	1556	1440	402	350	1154	1090
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	574	306	268	179	162	127	106
	55-59 ans	644	335	309	74	58	261	251
	60-64 ans	742	383	359	69	72	314	287
	65-69 ans	520	274	246	42	31	232	215
	70-74 ans	453	229	224	34	21	195	203

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 59 - Nord

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	50-74 ans	2933	1527	1406	398	344	1129	1062
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	3	1	2	1	1	0	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	3	1	2	1	1	0	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)								
	50-54 ans	579	309	270	180	162	129	108
	55-59 ans	654	340	314	74	59	266	255
	60-64 ans	750	388	362	70	73	318	289
	65-69 ans	529	280	249	44	32	236	217
	70-74 ans	465	233	232	34	23	199	209
	50-74 ans	2977	1550	1427	402	349	1148	1078
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique								
	50-54 ans	3	1	2	0	1	1	1
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	8	1	7	0	0	1	7
	50-74 ans	19	6	13	0	1	6	12
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	5	1	4	0	0	1	4
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	9	3	6	0	1	3	5
	50-74 ans	17	5	12	1	2	4	10
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu								
	50-54 ans	580	310	270	180	162	130	108
	55-59 ans	657	342	315	74	59	268	256
	60-64 ans	753	389	364	70	73	319	291
	65-69 ans	529	281	248	44	32	237	216
	70-74 ans	471	234	237	34	23	200	214
	50-74 ans	2990	1556	1434	402	349	1154	1085
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)								
	50-54 ans	583	311	272	181	163	130	109
	55-59 ans	662	343	319	74	59	269	260
	60-64 ans	754	389	365	70	73	319	292
	65-69 ans	532	281	251	44	33	237	218
	70-74 ans	482	237	245	34	24	203	221
	50-74 ans	3013	1561	1452	403	352	1158	1100
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
	50-54 ans	298	138	160	71	96	67	64
	55-59 ans	360	149	211	28	32	121	179
	60-64 ans	382	173	209	30	36	143	173
	65-69 ans	263	121	142	12	13	109	129
	70-74 ans	225	84	141	9	8	75	133
	50-74 ans	1528	665	863	150	185	515	678
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	13	7	6	2	2	5	4
	55-59 ans	13	9	4	1	0	8	4
	60-64 ans	11	3	8	0	4	3	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 59 - Nord

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	8	5	3	2	1	3	2
	70-74 ans	10	3	7	0	0	3	7
	50-74 ans	55	27	28	5	7	22	21
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	46	23	23	14	14	9	9
	55-59 ans	41	18	23	4	2	14	21
	60-64 ans	43	23	20	6	4	17	16
	65-69 ans	30	15	15	1	3	14	12
	70-74 ans	18	8	10	1	1	7	9
	50-74 ans	178	87	91	26	24	61	67
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	73	51	22	34	12	17	10
	55-59 ans	86	60	26	12	8	48	18
	60-64 ans	100	60	40	8	7	52	33
	65-69 ans	72	40	32	9	4	31	28
	70-74 ans	74	46	28	5	0	41	28
	50-74 ans	405	257	148	68	31	189	117
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	83	50	33	33	22	17	11
	55-59 ans	98	66	32	15	9	51	23
	60-64 ans	110	64	46	11	12	53	34
	65-69 ans	84	55	29	9	5	46	24
	70-74 ans	74	48	26	5	6	43	20
	50-74 ans	449	283	166	73	54	210	112
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	37	21	16	15	8	6	8
	55-59 ans	37	26	11	11	5	15	6
	60-64 ans	68	41	27	8	9	33	18
	65-69 ans	35	23	12	8	4	15	8
	70-74 ans	47	28	19	10	6	18	13
	50-74 ans	224	139	85	52	32	87	53
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	9	6	3	3	0	3	3
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	30	20	10	11	8	9	2
	55-59 ans	24	12	12	2	3	10	9
	60-64 ans	39	24	15	6	1	18	14
	65-69 ans	38	22	16	3	3	19	13
	70-74 ans	31	19	12	4	3	15	9
	50-74 ans	162	97	65	26	18	71	47
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	0	3	0	1	0	2
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	156	101	55	67	34	34	21
	55-59 ans	184	126	58	27	17	99	41
	60-64 ans	210	124	86	19	19	105	67
	65-69 ans	156	95	61	18	9	77	52
	70-74 ans	148	94	54	10	6	84	48
	50-74 ans	854	540	314	141	85	399	229
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	83	50	33	33	22	17	11

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 59 - Nord

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	98	66	32	15	9	51	23
	60-64 ans	110	64	46	11	12	53	34
	65-69 ans	84	55	29	9	5	46	24
	70-74 ans	74	48	26	5	6	43	20
	50-74 ans	449	283	166	73	54	210	112
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	37	21	16	15	8	6	8
	55-59 ans	37	26	11	11	5	15	6
	60-64 ans	68	41	27	8	9	33	18
	65-69 ans	35	23	12	8	4	15	8
	70-74 ans	47	28	19	10	6	18	13
	50-74 ans	224	139	85	52	32	87	53
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	35	21	14	15	6	6	8
	55-59 ans	34	24	10	10	5	14	5
	60-64 ans	64	37	27	8	9	29	18
	65-69 ans	34	22	12	7	4	15	8
	70-74 ans	42	25	17	10	5	15	12
	50-74 ans	209	129	80	50	29	79	51
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	4	3	1	2	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	10	7	3	4	0	3	3
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	33	20	13	14	6	6	7
	55-59 ans	31	22	9	9	5	13	4
	60-64 ans	60	34	26	6	9	28	17
	65-69 ans	34	22	12	7	4	15	8
	70-74 ans	41	24	17	10	5	14	12
	50-74 ans	199	122	77	46	29	76	48
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	25	16	9	11	5	5	4
	55-59 ans	25	17	8	7	5	10	3
	60-64 ans	43	25	18	3	8	22	10
	65-69 ans	23	14	9	6	4	8	5
	70-74 ans	31	18	13	10	3	8	10
	50-74 ans	147	90	57	37	25	53	32
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	8	4	4	3	1	1	3
	55-59 ans	7	5	2	2	0	3	2
	60-64 ans	17	9	8	3	1	6	7
	65-69 ans	11	8	3	1	0	7	3
	70-74 ans	10	6	4	0	2	6	2
	50-74 ans	53	32	21	9	4	23	17
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	12	8	4	6	1	2	3
	55-59 ans	9	7	2	3	1	4	1
	60-64 ans	20	12	8	2	3	10	5
	65-69 ans	12	9	3	4	1	5	2
	70-74 ans	13	8	5	4	2	4	3
	50-74 ans	66	44	22	19	8	25	14
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	4	3	1	2	0	1	1
	55-59 ans	3	2	1	0	1	2	0
	60-64 ans	9	8	1	1	1	7	0
	65-69 ans	5	3	2	1	1	2	1
	70-74 ans	8	3	5	3	1	0	4
	50-74 ans	29	19	10	7	4	12	6
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	7	4	3	2	3	2	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 59 - Nord

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	10	5	5	1	3	4	2
	60-64 ans	11	4	7	0	2	4	5
	65-69 ans	4	1	3	0	2	1	1
	70-74 ans	7	4	3	1	0	3	3
	50-74 ans	39	18	21	4	10	14	11
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	3	3	0	3	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	0	2	1	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	3	3	0	2	0	1	0
	50-74 ans	13	9	4	7	3	2	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	34	21	13	15	6	6	7
	55-59 ans	31	21	10	8	5	13	5
	60-64 ans	64	37	27	8	9	29	18
	65-69 ans	34	22	12	7	4	15	8
	70-74 ans	42	25	17	10	5	15	12
	50-74 ans	205	126	79	48	29	78	50
A40- Perdus de vue	50-54 ans	136	70	66	48	44	22	22
	55-59 ans	134	78	56	23	17	55	39
	60-64 ans	122	60	62	21	17	39	45
	65-69 ans	84	43	41	9	5	34	36
	70-74 ans	136	78	58	16	7	62	51
	50-74 ans	612	329	283	117	90	212	193

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 59 - Nord

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8	8	8,1	9,4	9,6	6,2	6,2	
	55-59 ans	6,9	6,6	7,1	9,7	10,1	5,8	6,4	
	60-64 ans	6,7	6,2	7,1	10,4	11,6	5,5	6,3	
	65-69 ans	7,5	6,7	8,1	11,4	13	6	7,4	
	70-74 ans	8,7	7,9	9,4	13,4	14,4	7,2	8,8	
	50-74 ans	7,5	7	7,8	9,9	10,5	6,1	6,9	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,9	2,9	2,9	3,8	3,9	1,6	1,5	
	55-59 ans	2,2	2,1	2,3	4,6	5,1	1,6	1,7	
	60-64 ans	2,2	2,1	2,2	5,2	5,4	1,5	1,7	
	65-69 ans	2,3	2	2,5	5,3	5,6	1,5	2,1	
	70-74 ans	2,9	2,4	3,2	7,2	6,9	1,8	2,8	
	50-74 ans	2,5	2,3	2,6	4,5	4,7	1,6	1,9	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	64,2	64	64,4	59	59	74,2	74,9	
	55-59 ans	67,4	67,4	67,3	52,4	49,1	73,2	73,7	
	60-64 ans	67,6	66,5	68,4	49,6	53,7	72	73	
	65-69 ans	69,8	70,7	69,2	54,1	57,1	75,1	72,2	
	70-74 ans	67,3	69,8	65,8	46,2	52,3	74,9	68,6	
	50-74 ans	67	67,1	66,9	55,1	55,6	73,7	72,3	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,3	2,7	1,9	2,8	2,1	2,4	1,7	
	55-59 ans	2,4	2,9	2	3,7	2,4	2,8	2	
	60-64 ans	2,7	3,1	2,4	4,4	3,3	2,9	2,2	
	65-69 ans	3	3,6	2,6	5	2,9	3,4	2,6	
	70-74 ans	3,1	3,7	2,7	5,9	2,6	3,5	2,7	
	50-74 ans	2,6	3,1	2,3	3,5	2,4	3	2,2	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,9	99,8	100	99,6	100	100	100	
	55-59 ans	99,4	99,8	99	100	100	99,7	98,8	
	60-64 ans	99,9	100	99,8	100	100	100	99,7	
	65-69 ans	99,8	100	99,7	100	97,6	100	100	
	70-74 ans	98,6	99,1	98,2	100	97,1	99	98,3	
	50-74 ans	99,6	99,8	99,4	99,8	99,6	99,7	99,3	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	75,6	75,8	75,3	72,9	74,1	80,2	77,3	
	55-59 ans	77,3	76,3	78,4	70,5	69,4	78,1	80,8	
	60-64 ans	80	80,5	79,5	72,9	79,3	82,4	79,5	
	65-69 ans	82,2	82,2	82,2	78,6	80	82,9	82,6	
	70-74 ans	72	69,4	74,7	64,2	69,7	70,4	75,3	
	50-74 ans	77,5	77,1	78	72,2	74,5	78,9	79,3	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,6	98,7	98,5	99,4	99,4	97,7	97,2	
	55-59 ans	98	98	98,1	100	98,3	97,4	98	
	60-64 ans	98,5	98,5	98,6	98,6	98,6	98,4	98,6	
	65-69 ans	97,9	97,5	98,4	95,5	96,9	97,9	98,6	
	70-74 ans	95,8	97,9	93,7	100	91,3	97,5	94	
	50-74 ans	97,9	98,1	97,6	99	98,3	97,8	97,4	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1	
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1	
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1	
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	1	
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1	
	50-74 ans	1	1	1	1	1	1	1	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	80	83	77	82	87	85	63	
	55-59 ans	70	76	63	88	72	73	61	
	60-64 ans	71	70	72	82	82	67	69	
	65-69 ans	68	68	69	75	59	67	70	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 59 - Nord

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	69	67	71	73	77	66	70
	50-74 ans	72	73	70	81	80	70	67
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	17,6	17,1	18,3	19,4	20	13,6	15,6
	55-59 ans	15,7	17,4	13,8	21,9	20	16	12,1
	60-64 ans	13	12,4	13,5	21,9	18,5	10,1	12,3
	65-69 ans	13	12,6	13,4	16,1	12,2	11,9	13,6
	70-74 ans	20,4	22,9	17,8	30,2	20,6	21,6	17,5
	50-74 ans	15,8	16,3	15,2	21	19,1	14,5	13,9
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,7	100	99,3	100	99,4	100	99,1
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99,6	100	99,2	100	100	100	99,1
	70-74 ans	99,6	100	99,2	100	100	100	99,1
	50-74 ans	99,8	100	99,6	100	99,7	100	99,5
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	51,1	44,4	58,8	39,2	58,9	51,5	58,7
	55-59 ans	54,4	43,4	66,1	37,8	54,2	45	68,8
	60-64 ans	50,7	44,5	57,3	42,9	49,3	44,8	59,2
	65-69 ans	49,4	43,1	56,6	27,3	39,4	46	59,2
	70-74 ans	46,7	35,4	57,6	26,5	33,3	36,9	60,2
	50-74 ans	50,7	42,6	59,4	37,2	52,6	44,5	61,6
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	2,2	2,3	2,2	1,1	1,2	3,8	3,7
	55-59 ans	2	2,6	1,3	1,4	0	3	1,5
	60-64 ans	1,5	0,8	2,2	0	5,5	0,9	1,4
	65-69 ans	1,5	1,8	1,2	4,5	3	1,3	0,9
	70-74 ans	2,1	1,3	2,9	0	0	1,5	3,2
	50-74 ans	1,8	1,7	1,9	1,2	2	1,9	1,9
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	7,9	7,4	8,5	7,7	8,6	6,9	8,3
	55-59 ans	6,2	5,2	7,2	5,4	3,4	5,2	8,1
	60-64 ans	5,7	5,9	5,5	8,6	5,5	5,3	5,5
	65-69 ans	5,6	5,3	6	2,3	9,1	5,9	5,5
	70-74 ans	3,7	3,4	4,1	2,9	4,2	3,4	4,1
	50-74 ans	5,9	5,6	6,3	6,5	6,8	5,3	6,1
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,5	16,4	8,1	18,8	7,4	13,1	9,2
	55-59 ans	13	17,5	8,2	16,2	13,6	17,8	6,9
	60-64 ans	13,3	15,4	11	11,4	9,6	16,3	11,3
	65-69 ans	13,5	14,2	12,7	20,5	12,1	13,1	12,8
	70-74 ans	15,4	19,4	11,4	14,7	0	20,2	12,7
	50-74 ans	13,4	16,5	10,2	16,9	8,8	16,3	10,6
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	14,2	16,1	12,1	18,2	13,5	13,1	10,1
	55-59 ans	14,8	19,2	10	20,3	15,3	19	8,8
	60-64 ans	14,6	16,5	12,6	15,7	16,4	16,6	11,6
	65-69 ans	15,8	19,6	11,6	20,5	15,2	19,4	11
	70-74 ans	15,4	20,3	10,6	14,7	25	21,2	9
	50-74 ans	14,9	18,1	11,4	18,1	15,3	18,1	10,2
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	6,3	6,8	5,9	8,3	4,9	4,6	7,3
	55-59 ans	5,6	7,6	3,4	14,9	8,5	5,6	2,3
	60-64 ans	9	10,5	7,4	11,4	12,3	10,3	6,2
	65-69 ans	6,6	8,2	4,8	18,2	12,1	6,3	3,7
	70-74 ans	9,8	11,8	7,8	29,4	25	8,9	5,9
	50-74 ans	7,4	8,9	5,9	12,9	9,1	7,5	4,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 59 - Nord

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,3	0,3	0,4	0,6	0	0	0,9
	55-59 ans	0,5	0,9	0	1,4	0	0,7	0
	60-64 ans	0,1	0,3	0	1,4	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,6	0,4	0,8	0	0	0,5	0,9
	50-74 ans	0,3	0,4	0,2	0,7	0	0,3	0,3
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	5,1	6,4	3,7	6,1	4,9	6,9	1,8
	55-59 ans	3,6	3,5	3,8	2,7	5,1	3,7	3,5
	60-64 ans	5,2	6,2	4,1	8,6	1,4	5,6	4,8
	65-69 ans	7,1	7,8	6,4	6,8	9,1	8	6
	70-74 ans	6,4	8	4,9	11,8	12,5	7,4	4,1
	50-74 ans	5,4	6,2	4,5	6,5	5,1	6,1	4,3
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,2	0	0,4	0	0,6	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,4	0	0,8	0	0	0	0,9
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0	0,2	0	0,3	0	0,2
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,6	6,6	2,9	7,6	3,3	5,1	2,5
	55-59 ans	5,2	8,2	2,9	9,5	4,8	8	2,5
	60-64 ans	6,1	8,1	4,5	8,8	6,9	7,9	4
	65-69 ans	7,3	10	5,2	16,1	6,3	9,2	5
	70-74 ans	7	10,4	4,5	11,1	4,7	10,3	4,4
	50-74 ans	5,8	8,3	3,8	8,9	4,4	8,2	3,7
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-74 ans **	6	8,3	3,8
	50-54 ans	2,4	3,2	1,8	3,8	2,1	2,6	1,3
	55-59 ans	2,8	4,3	1,6	5,3	2,6	4,1	1,4
	60-64 ans	3,2	4,2	2,4	5,1	4,4	4	2,1
	65-69 ans	3,9	5,8	2,5	8,1	3,5	5,5	2,3
	70-74 ans	3,5	5,3	2,2	5,5	4,7	5,3	1,9
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-74 ans	3,1	4,4	2	4,6	2,8	4,3	1,8
	50-74 ans **	3,1	4,4	2
	50-54 ans	1,1	1,4	0,9	1,7	0,8	0,9	0,9
	55-59 ans	1	1,7	0,6	3,9	1,4	1,2	0,4
	60-64 ans	2	2,7	1,4	3,7	3,3	2,5	1,1
	65-69 ans	1,6	2,4	1	7,2	2,8	1,8	0,8
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	70-74 ans	2,2	3,1	1,6	11,1	4,7	2,2	1,2
	50-74 ans	1,5	2,1	1	3,3	1,7	1,8	0,8
	50-74 ans **	1,5	2,1	1
	50-54 ans	5,7	4,8	7,1	6,7	0	0	12,5
	55-59 ans	8,8	8,3	10	10	0	7,1	20
	60-64 ans	6,3	8,1	3,7	25	0	3,4	5,6
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
70-74 ans	2,4	4	0	0	0	6,7	0	
50-74 ans	4,8	5,4	3,8	8	0	3,8	5,9	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des