

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 12 - Aveyron

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Effectifs sur la période 2009-2010

| | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans | 5000 | 2357 | 2643 | 2347 | 2626 | 10 | 17 |
| | 55-59 ans | 5370 | 2387 | 2983 | 2358 | 2955 | 29 | 28 |
| | 60-64 ans | 5630 | 2594 | 3036 | 2558 | 2993 | 36 | 43 |
| | 65-69 ans | 4085 | 1836 | 2249 | 1804 | 2218 | 32 | 31 |
| | 70-74 ans | 4185 | 1832 | 2353 | 1802 | 2317 | 30 | 36 |
| | 50-74 ans | 24270 | 11006 | 13264 | 10869 | 13109 | 137 | 155 |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) | 50-54 ans | 177 | 92 | 85 | 91 | 85 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 170 | 76 | 94 | 76 | 94 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 198 | 96 | 102 | 96 | 102 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 175 | 78 | 97 | 77 | 97 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 182 | 73 | 109 | 73 | 108 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 902 | 415 | 487 | 413 | 486 | 2 | 1 |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 123 | 69 | 54 | 69 | 54 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 118 | 57 | 61 | 57 | 61 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 155 | 71 | 84 | 71 | 84 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 127 | 55 | 72 | 54 | 72 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 125 | 47 | 78 | 47 | 77 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 648 | 299 | 349 | 298 | 348 | 1 | 1 |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait | 50-54 ans | 54 | 23 | 31 | 22 | 31 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 52 | 19 | 33 | 19 | 33 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 43 | 25 | 18 | 25 | 18 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 48 | 23 | 25 | 23 | 25 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 57 | 26 | 31 | 26 | 31 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 254 | 116 | 138 | 115 | 138 | 1 | 0 |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable) | 50-54 ans | 4946 | 2334 | 2612 | 2325 | 2595 | 9 | 17 |
| | 55-59 ans | 5318 | 2368 | 2950 | 2339 | 2922 | 29 | 28 |
| | 60-64 ans | 5587 | 2569 | 3018 | 2533 | 2975 | 36 | 43 |
| | 65-69 ans | 4037 | 1813 | 2224 | 1781 | 2193 | 32 | 31 |
| | 70-74 ans | 4128 | 1806 | 2322 | 1776 | 2286 | 30 | 36 |
| | 50-74 ans | 24016 | 10890 | 13126 | 10754 | 12971 | 136 | 155 |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif | 50-54 ans | 81 | 50 | 31 | 50 | 31 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 85 | 42 | 43 | 42 | 43 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 99 | 43 | 56 | 42 | 55 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 100 | 52 | 48 | 49 | 48 | 3 | 0 |
| | 70-74 ans | 116 | 65 | 51 | 64 | 49 | 1 | 2 |
| | 50-74 ans | 481 | 252 | 229 | 247 | 226 | 5 | 3 |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie | 50-54 ans | 81 | 50 | 31 | 50 | 31 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 85 | 42 | 43 | 42 | 43 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 98 | 43 | 55 | 42 | 54 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 100 | 52 | 48 | 49 | 48 | 3 | 0 |
| | 70-74 ans | 115 | 65 | 50 | 64 | 48 | 1 | 2 |
| | 50-74 ans | 479 | 252 | 227 | 247 | 224 | 5 | 3 |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie | 50-54 ans | 58 | 36 | 22 | 36 | 22 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 75 | 34 | 41 | 34 | 41 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 91 | 41 | 50 | 40 | 49 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 82 | 40 | 42 | 37 | 42 | 3 | 0 |
| | 70-74 ans | 94 | 52 | 42 | 51 | 40 | 1 | 2 |
| | 50-74 ans | 400 | 203 | 197 | 198 | 194 | 5 | 3 |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète | 50-54 ans | 56 | 34 | 22 | 34 | 22 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 74 | 33 | 41 | 33 | 41 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 90 | 40 | 50 | 39 | 49 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 79 | 40 | 39 | 37 | 39 | 3 | 0 |
| | 70-74 ans | 92 | 50 | 42 | 49 | 40 | 1 | 2 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 12 - Aveyron

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

| | 50-74 ans | 391 | 197 | 194 | 192 | 191 | 5 | 3 |
|---|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie) | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens) | 50-74 ans | 58 | 36 | 22 | 36 | 22 | 0 | 0 |
| | 50-54 ans | 58 | 36 | 22 | 36 | 22 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 75 | 34 | 41 | 34 | 41 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 91 | 41 | 50 | 40 | 49 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 79 | 40 | 39 | 37 | 39 | 3 | 0 |
| | 70-74 ans | 93 | 51 | 42 | 50 | 40 | 1 | 2 |
| | 50-74 ans | 396 | 202 | 194 | 197 | 191 | 5 | 3 |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie) | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu | 50-74 ans | 57 | 35 | 22 | 35 | 22 | 0 | 0 |
| | 50-54 ans | 57 | 35 | 22 | 35 | 22 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 75 | 34 | 41 | 34 | 41 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 91 | 41 | 50 | 40 | 49 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 80 | 40 | 40 | 37 | 40 | 3 | 0 |
| | 70-74 ans | 93 | 51 | 42 | 50 | 40 | 1 | 2 |
| | 50-74 ans | 396 | 201 | 195 | 196 | 192 | 5 | 3 |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) | 50-74 ans | 58 | 36 | 22 | 36 | 22 | 0 | 0 |
| | 50-54 ans | 58 | 36 | 22 | 36 | 22 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 75 | 34 | 41 | 34 | 41 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 91 | 41 | 50 | 40 | 49 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 82 | 40 | 42 | 37 | 42 | 3 | 0 |
| | 70-74 ans | 94 | 52 | 42 | 51 | 40 | 1 | 2 |
| | 50-74 ans | 400 | 203 | 197 | 198 | 194 | 5 | 3 |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-74 ans | 26 | 15 | 11 | 15 | 11 | 0 | 0 |
| | 50-54 ans | 26 | 15 | 11 | 15 | 11 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 35 | 11 | 24 | 11 | 24 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 42 | 12 | 30 | 12 | 29 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 34 | 14 | 20 | 13 | 20 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 32 | 14 | 18 | 14 | 17 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 169 | 66 | 103 | 65 | 101 | 1 | 2 |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm | 50-74 ans | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| | 50-54 ans | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 12 - Aveyron

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

| | | | | | | | | |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| | 65-69 ans | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm | 50-54 ans | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 30 | 9 | 21 | 8 | 21 | 1 | 0 |
| A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 9 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 10 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 10 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 11 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 47 | 25 | 22 | 23 | 21 | 2 | 1 |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 15 | 11 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 17 | 11 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 19 | 10 | 9 | 9 | 9 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 25 | 18 | 7 | 18 | 7 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 83 | 56 | 27 | 55 | 27 | 1 | 0 |
| A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal | 50-54 ans | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 9 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 34 | 24 | 10 | 24 | 10 | 0 | 0 |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 19 | 11 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté | 50-54 ans | 14 | 10 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 24 | 14 | 10 | 14 | 10 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 27 | 17 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 29 | 16 | 13 | 14 | 13 | 2 | 0 |
| | 70-74 ans | 36 | 24 | 12 | 24 | 11 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 130 | 81 | 49 | 78 | 48 | 3 | 1 |
| A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté | 50-54 ans | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 12 - Aveyron

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

| | | | | | | | | |
|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| | 55-59 ans | 15 | 11 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 17 | 11 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 19 | 10 | 9 | 9 | 9 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 25 | 18 | 7 | 18 | 7 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 83 | 56 | 27 | 55 | 27 | 1 | 0 |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté | 50-54 ans | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 36 | 24 | 12 | 24 | 12 | 0 | 0 |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire) | 50-54 ans | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 34 | 22 | 12 | 22 | 12 | 0 | 0 |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu | 50-54 ans | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 12 | 8 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus) | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 22 | 14 | 8 | 14 | 8 | 0 | 0 |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 12 | 8 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 12 - Aveyron

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 24 | 15 | 9 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| A40- Perdus de vue | 50-54 ans | 21 | 13 | 8 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 16 | 10 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 19 | 11 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 67 | 40 | 27 | 40 | 27 | 0 | 0 | 0 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 12 - Aveyron

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

| Indicateurs sur la période 2009-2010 | | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------|------------------------|--------|
| | | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%) | 50-54 ans | 3,5 | 3,9 | 3,2 | 3,9 | 3,2 | 10 | 0 | |
| | 55-59 ans | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 0 | 0 | |
| | 60-64 ans | 3,5 | 3,7 | 3,4 | 3,8 | 3,4 | 0 | 0 | |
| | 65-69 ans | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 3,1 | 0 | |
| | 70-74 ans | 4,3 | 4 | 4,6 | 4,1 | 4,7 | 0 | 2,8 | |
| | 50-74 ans | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 1,5 | 0,6 | |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%) | 50-54 ans | 1,1 | 1 | 1,2 | 0,9 | 1,2 | 10 | 0 | |
| | 55-59 ans | 1 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 1,1 | 0 | 0 | |
| | 60-64 ans | 0,8 | 1 | 0,6 | 1 | 0,6 | 0 | 0 | |
| | 65-69 ans | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 0 | 0 | |
| | 70-74 ans | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 0 | 0 | |
| | 50-74 ans | 1 | 1,1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 0,7 | 0 | |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 69,5 | 75 | 63,5 | 75,8 | 63,5 | 0 | 0 | |
| | 55-59 ans | 69,4 | 75 | 64,9 | 75 | 64,9 | 0 | 0 | |
| | 60-64 ans | 78,3 | 74 | 82,4 | 74 | 82,4 | 0 | 0 | |
| | 65-69 ans | 72,6 | 70,5 | 74,2 | 70,1 | 74,2 | 100 | 0 | |
| | 70-74 ans | 68,7 | 64,4 | 71,6 | 64,4 | 71,3 | 0 | 100 | |
| | 50-74 ans | 71,8 | 72 | 71,7 | 72,2 | 71,6 | 50 | 100 | |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%) | 50-54 ans | 1,6 | 2,1 | 1,2 | 2,2 | 1,2 | 0 | 0 | |
| | 55-59 ans | 1,6 | 1,8 | 1,5 | 1,8 | 1,5 | 0 | 0 | |
| | 60-64 ans | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 2,8 | 2,3 | |
| | 65-69 ans | 2,5 | 2,9 | 2,2 | 2,8 | 2,2 | 9,4 | 0 | |
| | 70-74 ans | 2,8 | 3,6 | 2,2 | 3,6 | 2,1 | 3,3 | 5,6 | |
| | 50-74 ans | 2 | 2,3 | 1,7 | 2,3 | 1,7 | 3,7 | 1,9 | |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie | 50-54 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
| | 55-59 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
| | 60-64 ans | 99 | 100 | 98,2 | 100 | 98,2 | 100 | 100 | |
| | 65-69 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| | 70-74 ans | 99,1 | 100 | 98 | 100 | 98 | 100 | 100 | |
| | 50-74 ans | 99,6 | 100 | 99,1 | 100 | 99,1 | 100 | 100 | |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans | 71,6 | 72 | 71 | 72 | 71 | 0 | 0 | |
| | 55-59 ans | 88,2 | 81 | 95,3 | 81 | 95,3 | 0 | 0 | |
| | 60-64 ans | 92,9 | 95,3 | 90,9 | 95,2 | 90,7 | 100 | 100 | |
| | 65-69 ans | 82 | 76,9 | 87,5 | 75,5 | 87,5 | 100 | 0 | |
| | 70-74 ans | 81,7 | 80 | 84 | 79,7 | 83,3 | 100 | 100 | |
| | 50-74 ans | 83,5 | 80,6 | 86,8 | 80,2 | 86,6 | 100 | 100 | |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète | 50-54 ans | 96,6 | 94,4 | 100 | 94,4 | 100 | 0 | 0 | |
| | 55-59 ans | 98,7 | 97,1 | 100 | 97,1 | 100 | 0 | 0 | |
| | 60-64 ans | 98,9 | 97,6 | 100 | 97,5 | 100 | 100 | 100 | |
| | 65-69 ans | 96,3 | 100 | 92,9 | 100 | 92,9 | 100 | 0 | |
| | 70-74 ans | 97,9 | 96,2 | 100 | 96,1 | 100 | 100 | 100 | |
| | 50-74 ans | 97,8 | 97 | 98,5 | 97 | 98,5 | 100 | 100 | |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| | 70-74 ans | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| | 50-74 ans | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 70 | 69 | 71 | 69 | 71 | 0 | 0 | |
| | 55-59 ans | 72 | 66 | 76 | 66 | 76 | 0 | 0 | |
| | 60-64 ans | 74 | 74 | 75 | 74 | 76 | 56 | 27 | |
| | 65-69 ans | 83 | 66 | 99 | 68 | 99 | 38 | 0 | |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 12 - Aveyron

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

| | | | | | | | | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | 70-74 ans | 75 | 64 | 88 | 65 | 90 | 33 | 49 |
| | 50-74 ans | 75 | 68 | 83 | 68 | 83 | 41 | 42 |
| C03- Pourcentage de perdus de vue | 50-54 ans | 25,9 | 26 | 25,8 | 26 | 25,8 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 8,2 | 14,3 | 2,3 | 14,3 | 2,3 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 4 | 0 | 7,1 | 0 | 7,3 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 16 | 19,2 | 12,5 | 20,4 | 12,5 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 16,4 | 16,9 | 15,7 | 17,2 | 16,3 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 13,9 | 15,9 | 11,8 | 16,2 | 11,9 | 0 | 0 |
| D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 98,3 | 97,2 | 100 | 97,2 | 100 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 65-69 ans | 97,6 | 100 | 95,2 | 100 | 95,2 | 100 | 0 |
| | 70-74 ans | 98,9 | 98,1 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 |
| | 50-74 ans | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 44,8 | 41,7 | 50 | 41,7 | 50 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 46,7 | 32,4 | 58,5 | 32,4 | 58,5 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 46,2 | 29,3 | 60 | 30 | 59,2 | 0 | 100 |
| | 65-69 ans | 41,5 | 35 | 47,6 | 35,1 | 47,6 | 33,3 | 0 |
| | 70-74 ans | 34 | 26,9 | 42,9 | 27,5 | 42,5 | 0 | 50 |
| | 50-74 ans | 42,3 | 32,5 | 52,3 | 32,8 | 52,1 | 20 | 66,7 |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm | 50-54 ans | 5,2 | 2,8 | 9,1 | 2,8 | 9,1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1,3 | 2,9 | 0 | 2,9 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1,1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 4,9 | 5 | 4,8 | 5,4 | 4,8 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 3,2 | 5,8 | 0 | 5,9 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 3 | 3,4 | 2,5 | 3,5 | 2,6 | 0 | 0 |
| D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm | 50-54 ans | 17,2 | 13,9 | 22,7 | 13,9 | 22,7 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 10,7 | 5,9 | 14,6 | 5,9 | 14,6 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 5,5 | 2,4 | 8 | 2,5 | 8,2 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1,2 | 0 | 2,4 | 0 | 2,4 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 6,4 | 1,9 | 11,9 | 0 | 12,5 | 100 | 0 |
| | 50-74 ans | 7,5 | 4,4 | 10,7 | 4 | 10,8 | 20 | 0 |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 12,1 | 11,1 | 13,6 | 11,1 | 13,6 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 12 | 8,8 | 14,6 | 8,8 | 14,6 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 11 | 14,6 | 8 | 12,5 | 8,2 | 100 | 0 |
| | 65-69 ans | 12,2 | 15 | 9,5 | 13,5 | 9,5 | 33,3 | 0 |
| | 70-74 ans | 11,7 | 11,5 | 11,9 | 11,8 | 10 | 0 | 50 |
| | 50-74 ans | 11,8 | 12,3 | 11,2 | 11,6 | 10,8 | 40 | 33,3 |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 12,1 | 16,7 | 4,5 | 16,7 | 4,5 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 20 | 32,4 | 9,8 | 32,4 | 9,8 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 18,7 | 26,8 | 12 | 27,5 | 12,2 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 23,2 | 25 | 21,4 | 24,3 | 21,4 | 33,3 | 0 |
| | 70-74 ans | 26,6 | 34,6 | 16,7 | 35,3 | 17,5 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 20,8 | 27,6 | 13,7 | 27,8 | 13,9 | 20 | 0 |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer | 50-54 ans | 5,2 | 8,3 | 0 | 8,3 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 5,3 | 11,8 | 0 | 11,8 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 9,9 | 14,6 | 6 | 15 | 6,1 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 12,2 | 15 | 9,5 | 16,2 | 9,5 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 8,5 | 9,6 | 7,1 | 9,8 | 7,5 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 8,5 | 11,8 | 5,1 | 12,1 | 5,2 | 0 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 12 - Aveyron

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

| | | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1,3 | 2,9 | 0 | 2,9 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2,2 | 2,4 | 2 | 2,5 | 2 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 2,1 | 3,8 | 0 | 3,9 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1,3 | 2 | 0,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1,3 | 2 | 0,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 1,7 | 2,8 | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2,7 | 2,9 | 2,4 | 2,9 | 2,4 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 5,5 | 9,8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 4,9 | 5 | 4,8 | 5,4 | 4,8 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 7,4 | 5,8 | 9,5 | 5,9 | 10 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 4,8 | 5,4 | 4,1 | 5,6 | 4,1 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 4,8 | 5,4 | 4,1 | 5,6 | 4,1 | 0 | 0 |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 1,7 | 2,8 | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0,3 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0,3 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 2,8 | 4,3 | 1,5 | 4,3 | 1,5 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 4,5 | 5,9 | 3,4 | 6 | 3,4 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 4,8 | 6,6 | 3,3 | 6,3 | 3,4 | 27,8 | 0 |
| | 65-69 ans | 7,2 | 8,8 | 5,8 | 7,9 | 5,9 | 62,5 | 0 |
| | 70-74 ans | 8,7 | 13,3 | 5,2 | 13,5 | 4,8 | 0 | 27,8 |
| | 50-74 ans | 5,4 | 7,4 | 3,7 | 7,3 | 3,7 | 22,1 | 6,5 |
| | 50-74 ans ** | 5,2 | 7,1 | 3,6 | 7,3 | 3,7 | 22,1 | 6,5 |
| D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 1,4 | 2,6 | 0,4 | 2,6 | 0,4 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2,8 | 4,6 | 1,4 | 4,7 | 1,4 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 3 | 4,3 | 2 | 4,3 | 2 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 4,7 | 5,5 | 4 | 5,1 | 4,1 | 31,3 | 0 |
| | 70-74 ans | 6,1 | 10 | 3 | 10,1 | 3,1 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 3,5 | 5,1 | 2,1 | 5,1 | 2,1 | 7,4 | 0 |
| | 50-74 ans ** | 3,3 | 4,9 | 1,9 | 5,1 | 2,1 | 7,4 | 0 |
| D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 0,6 | 1,3 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0,8 | 1,7 | 0 | 1,7 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1,8 | 2,3 | 1,3 | 2,4 | 1,3 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 2,5 | 3,3 | 1,8 | 3,4 | 1,8 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 2,2 | 2,8 | 1,7 | 2,8 | 1,7 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1,5 | 2,2 | 0,9 | 2,2 | 0,9 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans ** | 1,4 | 2,1 | 0,8 | 2,2 | 0,9 | 0 | 0 |
| E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu | 50-54 ans | 66,7 | 66,7 | 0 | 66,7 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 22,2 | 20 | 25 | 20 | 25 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 20 | 16,7 | 25 | 16,7 | 25 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 35,3 | 36,4 | 33,3 | 36,4 | 33,3 | 0 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des