

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 18 - Cher

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Effectifs sur la période 2009-2010

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	8096	3655	4441	2638	2904	1017	1537
	55-59 ans	7716	3400	4316	1413	1499	1987	2817
	60-64 ans	8552	3902	4650	1298	1240	2604	3410
	65-69 ans	5820	2642	3178	747	808	1895	2370
	70-74 ans	5538	2492	3046	677	778	1815	2268
	50-74 ans	35722	16091	19631	6773	7229	9318	12402
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	343	142	201	98	133	44	68
	55-59 ans	361	166	195	62	66	104	129
	60-64 ans	395	190	205	77	52	113	153
	65-69 ans	289	126	163	39	48	87	115
	70-74 ans	310	136	174	39	49	97	125
	50-74 ans	1698	760	938	315	348	445	590
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	206	81	125	56	70	25	55
	55-59 ans	254	123	131	39	28	84	103
	60-64 ans	268	126	142	46	28	80	114
	65-69 ans	200	81	119	21	27	60	92
	70-74 ans	217	98	119	22	25	76	94
	50-74 ans	1145	509	636	184	178	325	458
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	137	61	76	42	63	19	13
	55-59 ans	107	43	64	23	38	20	26
	60-64 ans	127	64	63	31	24	33	39
	65-69 ans	89	45	44	18	21	27	23
	70-74 ans	93	38	55	17	24	21	31
	50-74 ans	553	251	302	131	170	120	132
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	7959	3594	4365	2596	2841	998	1524
	55-59 ans	7609	3357	4252	1390	1461	1967	2791
	60-64 ans	8425	3838	4587	1267	1216	2571	3371
	65-69 ans	5731	2597	3134	729	787	1868	2347
	70-74 ans	5445	2454	2991	660	754	1794	2237
	50-74 ans	35169	15840	19329	6642	7059	9198	12270
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	239	124	115	92	65	32	50
	55-59 ans	261	148	113	63	35	85	78
	60-64 ans	321	179	142	60	37	119	105
	65-69 ans	221	125	96	31	21	94	75
	70-74 ans	252	138	114	48	30	90	84
	50-74 ans	1294	714	580	294	188	420	392
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	239	124	115	92	65	32	50
	55-59 ans	260	148	112	63	34	85	78
	60-64 ans	319	179	140	60	36	119	104
	65-69 ans	221	125	96	31	21	94	75
	70-74 ans	252	138	114	48	30	90	84
	50-74 ans	1291	714	577	294	186	420	391
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	207	106	101	75	55	31	46
	55-59 ans	224	124	100	47	29	77	71
	60-64 ans	292	164	128	49	31	115	97
	65-69 ans	199	113	86	25	18	88	68
	70-74 ans	231	128	103	44	25	84	78
	50-74 ans	1153	635	518	240	158	395	360
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	207	106	101	75	55	31	46
	55-59 ans	222	124	98	47	28	77	70
	60-64 ans	288	164	124	49	29	115	95
	65-69 ans	197	112	85	25	17	87	68
	70-74 ans	225	127	98	44	24	83	74

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 18 - Cher

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	50-74 ans	1139	633	506	240	153	393	353
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)								
	50-54 ans	207	106	101	75	55	31	46
	55-59 ans	222	124	98	47	28	77	70
	60-64 ans	291	164	127	49	30	115	97
	65-69 ans	198	113	85	25	17	88	68
	70-74 ans	229	128	101	44	25	84	76
	50-74 ans	1147	635	512	240	155	395	357
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	6	0	6	0	3	0	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	0	4	0	2	0	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu								
	50-54 ans	207	106	101	75	55	31	46
	55-59 ans	221	123	98	46	28	77	70
	60-64 ans	290	163	127	48	30	115	97
	65-69 ans	198	113	85	25	17	88	68
	70-74 ans	227	127	100	44	24	83	76
	50-74 ans	1143	632	511	238	154	394	357
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)								
	50-54 ans	207	106	101	75	55	31	46
	55-59 ans	225	124	101	47	30	77	71
	60-64 ans	294	164	130	49	32	115	98
	65-69 ans	199	113	86	25	18	88	68
	70-74 ans	232	128	104	44	25	84	79
	50-74 ans	1157	635	522	240	160	395	362
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
	50-54 ans	100	46	54	36	30	10	24
	55-59 ans	116	49	67	17	22	32	45
	60-64 ans	93	37	56	10	15	27	41
	65-69 ans	72	26	46	3	13	23	33
	70-74 ans	88	42	46	20	12	22	34
	50-74 ans	469	200	269	86	92	114	177
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	24	16	8	9	4	7	4
	55-59 ans	18	9	9	2	0	7	9
	60-64 ans	42	21	21	3	3	18	18

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 18 - Cher

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	20	10	10	3	3	7	7
	70-74 ans	16	11	5	3	0	8	5
	50-74 ans	120	67	53	20	10	47	43
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	11	4	7	2	4	2	3
	55-59 ans	7	3	4	1	0	2	4
	60-64 ans	9	7	2	5	1	2	1
	65-69 ans	4	2	2	1	0	1	2
	70-74 ans	3	3	0	2	0	1	0
	50-74 ans	34	19	15	11	5	8	10
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	31	18	13	12	6	6	7
	55-59 ans	34	25	9	10	2	15	7
	60-64 ans	44	22	22	8	9	14	13
	65-69 ans	30	21	9	3	1	18	8
	70-74 ans	34	20	14	7	5	13	9
	50-74 ans	173	106	67	40	23	66	44
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	33	20	13	14	8	6	5
	55-59 ans	36	29	7	11	4	18	3
	60-64 ans	77	58	19	16	3	42	16
	65-69 ans	53	38	15	9	1	29	14
	70-74 ans	62	39	23	6	6	33	17
	50-74 ans	261	184	77	56	22	128	55
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	10	7	3	5	2	2	1
	60-64 ans	18	13	5	4	1	9	4
	65-69 ans	16	13	3	5	0	8	3
	70-74 ans	22	9	13	4	1	5	12
	50-74 ans	70	44	26	20	6	24	20
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	3	0	3	0	0	0	3
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	8	2	6	0	0	2	6
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	7	4	3	2	0	2	3
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	5	3	2	2	0	1	2
	50-74 ans	17	10	7	5	1	5	6
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	50-74 ans	5	3	2	2	1	1	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	64	38	26	26	14	12	12
	55-59 ans	70	54	16	21	6	33	10
	60-64 ans	121	80	41	24	12	56	29
	65-69 ans	83	59	24	12	2	47	22
	70-74 ans	96	59	37	13	11	46	26
	50-74 ans	434	290	144	96	45	194	99
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	33	20	13	14	8	6	5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 18 - Cher

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	36	29	7	11	4	18	3
	60-64 ans	77	58	19	16	3	42	16
	65-69 ans	53	38	15	9	1	29	14
	70-74 ans	62	39	23	6	6	33	17
	50-74 ans	261	184	77	56	22	128	55
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	10	7	3	5	2	2	1
	60-64 ans	18	13	5	4	1	9	4
	65-69 ans	16	13	3	5	0	8	3
	70-74 ans	22	9	13	4	1	5	12
	50-74 ans	70	44	26	20	6	24	20
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	10	7	3	5	2	2	1
	60-64 ans	16	11	5	3	1	8	4
	65-69 ans	16	13	3	5	0	8	3
	70-74 ans	21	8	13	3	1	5	12
	50-74 ans	67	41	26	18	6	23	20
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	4	3	1	1	0	2	1
	65-69 ans	5	4	1	2	0	2	1
	70-74 ans	9	4	5	1	1	3	4
	50-74 ans	22	13	9	6	2	7	7
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	8	6	2	4	2	2	0
	60-64 ans	12	8	4	2	1	6	3
	65-69 ans	11	9	2	3	0	6	2
	70-74 ans	12	4	8	2	0	2	8
	50-74 ans	45	28	17	12	4	16	13
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	4	2	2	1	2	1	0
	60-64 ans	9	6	3	2	1	4	2
	65-69 ans	6	5	1	2	0	3	1
	70-74 ans	10	4	6	2	0	2	6
	50-74 ans	31	18	13	8	4	10	9
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	4	0	3	0	1	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	5	4	1	1	0	3	1
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	14	10	4	4	0	6	4
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	5	4	1	2	0	2	1
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	6	1	5	1	0	0	5
	50-74 ans	17	9	8	5	1	4	7
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 18 - Cher

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	1	0
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0	0
	50-74 ans	6	3	3	0	2	3	1	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	6	4	2	2	1	2	1	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0	0
	55-59 ans	8	7	1	5	1	2	0	0
	60-64 ans	13	9	4	3	1	6	3	3
	65-69 ans	12	9	3	4	0	5	3	3
	70-74 ans	13	6	7	3	0	3	7	7
	50-74 ans	49	32	17	16	4	16	13	13
A40- Perdus de vue	50-54 ans	19	12	7	12	5	0	2	2
	55-59 ans	23	17	6	13	4	4	2	2
	60-64 ans	11	7	4	6	3	1	1	1
	65-69 ans	11	6	5	4	2	2	3	3
	70-74 ans	10	5	5	3	4	2	1	1
	50-74 ans	74	47	27	38	18	9	9	9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 18 - Cher

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,2	3,9	4,5	3,7	4,6	4,3	4,4	
	55-59 ans	4,7	4,9	4,5	4,4	4,4	5,2	4,6	
	60-64 ans	4,6	4,9	4,4	5,9	4,2	4,3	4,5	
	65-69 ans	5	4,8	5,1	5,2	5,9	4,6	4,9	
	70-74 ans	5,6	5,5	5,7	5,8	6,3	5,3	5,5	
	50-74 ans	4,8	4,7	4,8	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,7	1,7	1,7	1,6	2,2	1,9	0,8	
	55-59 ans	1,4	1,3	1,5	1,6	2,5	1	0,9	
	60-64 ans	1,5	1,6	1,4	2,4	1,9	1,3	1,1	
	65-69 ans	1,5	1,7	1,4	2,4	2,6	1,4	1	
	70-74 ans	1,7	1,5	1,8	2,5	3,1	1,2	1,4	
	50-74 ans	1,5	1,6	1,5	1,9	2,4	1,3	1,1	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	60,1	57	62,2	57,1	52,6	56,8	80,9	
	55-59 ans	70,4	74,1	67,2	62,9	42,4	80,8	79,8	
	60-64 ans	67,8	66,3	69,3	59,7	53,8	70,8	74,5	
	65-69 ans	69,2	64,3	73	53,8	56,3	69	80	
	70-74 ans	70	72,1	68,4	56,4	51	78,4	75,2	
	50-74 ans	67,4	67	67,8	58,4	51,1	73	77,6	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3	3,5	2,6	3,5	2,3	3,2	3,3	
	55-59 ans	3,4	4,4	2,7	4,5	2,4	4,3	2,8	
	60-64 ans	3,8	4,7	3,1	4,7	3	4,6	3,1	
	65-69 ans	3,9	4,8	3,1	4,3	2,7	5	3,2	
	70-74 ans	4,6	5,6	3,8	7,3	4	5	3,8	
	50-74 ans	3,7	4,5	3	4,4	2,7	4,6	3,2	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	55-59 ans	99,6	100	99,1	100	97,1	100	100	
	60-64 ans	99,4	100	98,6	100	97,3	100	99	
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	50-74 ans	99,8	100	99,5	100	98,9	100	99,7	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	86,6	85,5	87,8	81,5	84,6	96,9	92	
	55-59 ans	86,2	83,8	89,3	74,6	85,3	90,6	91	
	60-64 ans	91,5	91,6	91,4	81,7	86,1	96,6	93,3	
	65-69 ans	90	90,4	89,6	80,6	85,7	93,6	90,7	
	70-74 ans	91,7	92,8	90,4	91,7	83,3	93,3	92,9	
	50-74 ans	89,3	88,9	89,8	81,6	84,9	94	92,1	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	55-59 ans	99,1	100	98	100	96,6	100	98,6	
	60-64 ans	98,6	100	96,9	100	93,5	100	97,9	
	65-69 ans	99	99,1	98,8	100	94,4	98,9	100	
	70-74 ans	97,4	99,2	95,1	100	96	98,8	94,9	
	50-74 ans	98,8	99,7	97,7	100	96,8	99,5	98,1	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	0	1	0	0	0	
	60-64 ans	0	0	0	0	1	0	0	
	65-69 ans	0	1	0	1	0	0	0	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	115	129	100	149	105	79	93	
	55-59 ans	121	122	118	145	199	109	85	
	60-64 ans	99	105	91	130	82	95	93	
	65-69 ans	96	103	88	101	77	103	91	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 18 - Cher

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	99	107	89	124	94	99	87
	50-74 ans	106	112	97	135	113	99	90
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	7,9	9,7	6,1	13	7,7	0	4
	55-59 ans	8,8	11,5	5,3	20,6	11,4	4,7	2,6
	60-64 ans	3,4	3,9	2,8	10	8,1	0,8	1
	65-69 ans	5	4,8	5,2	12,9	9,5	2,1	4
	70-74 ans	4	3,6	4,4	6,3	13,3	2,2	1,2
	50-74 ans	5,7	6,6	4,7	12,9	9,6	2,1	2,3
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	98,7	99,2	98	97,9	96,6	100	98,6
	60-64 ans	99,3	99,4	99,2	98	96,8	100	100
	65-69 ans	99,5	100	98,8	100	94,4	100	100
	70-74 ans	98,3	99,2	97,1	100	96	98,8	97,4
	50-74 ans	99,1	99,5	98,6	99,2	97,5	99,7	99,2
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	48,3	43,4	53,5	48	54,5	32,3	52,2
	55-59 ans	51,6	39,5	66,3	36,2	73,3	41,6	63,4
	60-64 ans	31,6	22,6	43,1	20,4	46,9	23,5	41,8
	65-69 ans	36,2	23	53,5	12	72,2	26,1	48,5
	70-74 ans	37,9	32,8	44,2	45,5	48	26,2	43
	50-74 ans	40,5	31,5	51,5	35,8	57,5	28,9	48,9
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	11,6	15,1	7,9	12	7,3	22,6	8,7
	55-59 ans	8	7,3	8,9	4,3	0	9,1	12,7
	60-64 ans	14,3	12,8	16,2	6,1	9,4	15,7	18,4
	65-69 ans	10,1	8,8	11,6	12	16,7	8	10,3
	70-74 ans	6,9	8,6	4,8	6,8	0	9,5	6,3
	50-74 ans	10,4	10,6	10,2	8,3	6,3	11,9	11,9
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	5,3	3,8	6,9	2,7	7,3	6,5	6,5
	55-59 ans	3,1	2,4	4	2,1	0	2,6	5,6
	60-64 ans	3,1	4,3	1,5	10,2	3,1	1,7	1
	65-69 ans	2	1,8	2,3	4	0	1,1	2,9
	70-74 ans	1,3	2,3	0	4,5	0	1,2	0
	50-74 ans	2,9	3	2,9	4,6	3,1	2	2,8
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15	17	12,9	16	10,9	19,4	15,2
	55-59 ans	15,1	20,2	8,9	21,3	6,7	19,5	9,9
	60-64 ans	15	13,4	16,9	16,3	28,1	12,2	13,3
	65-69 ans	15,1	18,6	10,5	12	5,6	20,5	11,8
	70-74 ans	14,7	15,6	13,5	15,9	20	15,5	11,4
	50-74 ans	15	16,7	12,8	16,7	14,4	16,7	12,2
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	15,9	18,9	12,9	18,7	14,5	19,4	10,9
	55-59 ans	16	23,4	6,9	23,4	13,3	23,4	4,2
	60-64 ans	26,2	35,4	14,6	32,7	9,4	36,5	16,3
	65-69 ans	26,6	33,6	17,4	36	5,6	33	20,6
	70-74 ans	26,7	30,5	22,1	13,6	24	39,3	21,5
	50-74 ans	22,6	29	14,8	23,3	13,8	32,4	15,2
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	1,9	1,9	2	2,7	3,6	0	0
	55-59 ans	4,4	5,6	3	10,6	6,7	2,6	1,4
	60-64 ans	6,1	7,9	3,8	8,2	3,1	7,8	4,1
	65-69 ans	8	11,5	3,5	20	0	9,1	4,4
	70-74 ans	9,5	7	12,5	9,1	4	6	15,2
	50-74 ans	6,1	6,9	5	8,3	3,8	6,1	5,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 18 - Cher

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,4	0	3	0	0	0	6,5
	55-59 ans	0,9	0,8	1	0	0	1,3	1,4
	60-64 ans	1	0,6	1,5	0	0	0,9	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,7	0,3	1,1	0	0	0,5	1,7
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,5	0	1	0	1,8	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2,4	2,4	2,3	4,1	0	1,7	3,1
	65-69 ans	2	2,7	1,2	4	0	2,3	1,5
	70-74 ans	2,2	2,3	1,9	4,5	0	1,2	2,5
	50-74 ans	1,5	1,6	1,3	2,1	0,6	1,3	1,7
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,9	0,8	1	2,1	0	0	1,4
	60-64 ans	0,3	0,6	0	2	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,9	0,8	1	0	4	1,2	0
	50-74 ans	0,4	0,5	0,4	0,8	0,6	0,3	0,3
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8	10,6	6	10	4,9	12	7,9
	55-59 ans	9,2	16,1	3,8	15,1	4,1	16,8	3,6
	60-64 ans	14,4	20,8	8,9	18,9	9,9	21,8	8,6
	65-69 ans	14,5	22,7	7,7	16,5	2,5	25,2	9,4
	70-74 ans	17,6	24	12,4	19,7	14,6	25,6	11,6
	50-74 ans	12,3	18,3	7,4	14,5	6,4	21,1	8,1
	50-74 ans **	12,3	17,8	7,3
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,1	5,6	3	5,4	2,8	6	3,3
	55-59 ans	4,7	8,6	1,6	7,9	2,7	9,2	1,1
	60-64 ans	9,1	15,1	4,1	12,6	2,5	16,3	4,7
	65-69 ans	9,2	14,6	4,8	12,3	1,3	15,5	6
	70-74 ans	11,4	15,9	7,7	9,1	8	18,4	7,6
	50-74 ans	7,4	11,6	4	8,4	3,1	13,9	4,5
	50-74 ans **	7,4	11,1	3,9
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	0,6	0,5	0,8	0,7	0	0
	55-59 ans	1,3	2,1	0,7	3,6	1,4	1	0,4
	60-64 ans	2,1	3,4	1,1	3,2	0,8	3,5	1,2
	65-69 ans	2,8	5	1	6,9	0	4,3	1,3
	70-74 ans	4	3,7	4,3	6,1	1,3	2,8	5,4
	50-74 ans	2	2,8	1,3	3	0,8	2,6	1,6
	50-74 ans **	1,9	2,6	1,3
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	50	50	50	50	50	0	0
	55-59 ans	20	14,3	33,3	20	0	0	100
	60-64 ans	25	27,3	20	33,3	0	25	25
	65-69 ans	31,3	30,8	33,3	40	0	25	33,3
	70-74 ans	42,9	50	38,5	33,3	100	60	33,3
	50-74 ans	32,8	31,7	34,6	33,3	33,3	30,4	35

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des